

LVDOVICI 2 SEPTALII MEDIOLANENSIS.

Animaduerſionum, & cautio-
num Medicarum.

Libri ſeptem.

*Quorum materiam ſequens pagina
indicabit.*



NEAPOLI;

Apud Lazarum Scorigium. 1627.

Superiorum permiſſu.

FDIV OCIV I

11.1.1977

Black. 11.1.1977

Black. 11.1.1977

Black. 11.1.1977

Black. 11.1.1977

Black. 11.1.1977

Black. 11.1.1977

Black. 11.1.1977

Black. 11.1.1977

Excellenti

D. I V L I O C Æ S A R I

BARICELLO A S. MARCO,

CIVI BENEVENTANO,

Medico, & Philosopho Clarissimo.



*A*M diū, ob multa in me
collata beneficia Excell.
Iuli Cesar, aliquod mea
deuotionis argumentum,
in animi grati signum
ostendere debebam. At va-
rijs implicito negotijs, varijsque interrupto
curis in nostra Typographia, optatis meis,
pro mea obseruantia demonstranda, haud
unquam licuit satisfacere. Ad praesens; im-
primendi in Typis nostris, medicas animad-
ueriones Ludouici Septalij viri de Republi-
ca bene meriti, accessit occasio. Quia autem
eas patrono indigere cognoui, qui à calum-
nijs, & Zoili loquacitate vindicaret; proin-
de nomini tuo clarissimo illas dicare consti-
tui. Iure autem, tum ob magna in me non
solum officia, sed etiam merita, nam, & in
ijs dicandis monumentum mea gratitudinis
tibi aperiēbam: tum atq; ob virtutum tua-

rum debitum. Scio enim quantum non solum
in Medicina, & Philosophia præcellis: verum
atque in multis alijs scientijs. Testantur hoc
Typi nostri, qui, libros tuos de Hydronosa
natura, Opuscula de lacte, sero, & butyro,
& Hortulum Genialem impressere. Te-
stantur hoc Vltramontani, qui tua miscella-
nea sub Hortuli Genialis nomine iterum Ty-
pis mandarunt. Scio quanto desiderio scho-
lia à te composita eidem, & alias doctas lu-
cubrationes, quas promissisti expectent. Scio
quanto cum decore, & laude medicinam fa-
cis. Scio quantum lætitiæ languentes ex tua
præsentia desumant, & quantam ex præsti-
dijs tuis sentiant utilitatem. Qua re iure fa-
ctum existimo Septalij Cautiones, ut insignē
patronum obtinerent, & meam cognoscere
beneuolentiam, tibi dicasse. Accipe igitur. Ex-
cell. Iuli Caesar hoc munusculum à Lazaro
tuo amatissimo: tibiq; persuadeas nihil mihi
carius, nihilq; iucundius succedere posse: quā
tibi viro doctissimo inseruire. Vale, & Typis
nostris continuò fauete. Neapoli mense
May 1627.

Dominationi tuæ addictissimus seruus,

Lazarus Scorriggius.

Præfatio ad Lectorem:



Via videbam fore, vt hic labor meus incurreret in varios sermones eorum, qui, vel instituti rationem auerent cognoscere, vel fortassè cognitam improbarent; vtri-

que hominum generi satisfacere primum omnium in animo habeo. Cum ab iuuenilibus annis ad hosce iam exactæ ætatis terminos, ita medicam hanc facitauissem artem, vt simul alias homine libero dignas artes affectarer. & colerem, expostulauere mecum amici homines, quòd in omni litterarum genere plùs aliquatò viderer ponere laboris, ac studij, quàm in hac ipsa facultate, vnde nominis, ac vitæ splendor nobis petitur vniuersus. Quippe aiebāt nostros in Hippocratem, & in Aristotelis problemata commentarios, itemque de næuorum varietate commentarium, quamuis ad ipsos medicinæ fontes haud dubiè pertinerent, non tamen attingere consuetudinem, & vsum artis, & æquū esse, vt quadraginta annorum, quot fermè contriuimus in hoc medico negotio, fructus aliquis ad publicam vtilitatem extaret. Insta omnino, & plena sensus humanissimi visa est querela, fecimusque libentè, vt animum, & cogitationem a nostris oblectamentis ad commune beneficium auocaremus. Verum enimuero, eum attenta meditatione mecum ipse confide-

rarem, ecquis in tantâ librorum varietate vacuus locus industriæ meæ relictus foret, itâ reperiëbam, omnia, quæcunque vel scientiæ peruestigatione, vel differendi subtilitate tradenda essent, explicasse magnos viros, quorum nec vincere, nec æquare gloriam possem. Itâ novâ cura sollicitabat animum meum, & haud sanè mediocriter angebar. Nam neque placebat actum agendo tempus conterere, neque certando cum excellentibus ingenijs, mereri reprehensionem, & cauillos, & rectè monentibus atque cohortantibus amicis, animus erat satisfacere. In hac fluctuantis animi solitudine diù multùmque volutatus animaduerti tandè, locis alijs omnibus occupatis cum vacare, qui veluti mores artis, & quotidianam disciplinam contineret. Nam etsi partem hanc ipsam attingere permulti; veriùs tamen attingere, quàm ad plenum sunt executi; Et plerumque itâ variant opinionibus, atque sententijs, vt haud fermè vera ratio possit extricari. Quamobrem vel inchoata perficièdo, vel colligendo dispersa, vel contraria conciliando, vel omnia complectendo via quadam, & ratione, videbar aliquid cõferre posse vicissim arti, quæ nobis, & vitæ dignitatem, & commoda rei familiaris, & gratiâ, & amicos, & vitam denique ipsam confert, velut æmula fortunæ, certè diuinæ opis administra. Cæterum sciant, quorum in manus hæc nostra cura peruenerit, summam esse voti, vt

vergente iam ætate, patriæ profusus extremis
conatu, cætera concupiscere, vel sequi desitum
mibi esse. Sciant item, quamvis certissimæ,
hæc sit, & simplicissima experimentorum dis-
ciplina, quam tandiu tractando calamitates
humani corporis in ipso præsertim valetudi-
nario Mediolanensi theatro morborum om-
nium hausimus, haud tamen pugnaciter nos
defendere quicquam, & affirmare. Sententiam
meam expono, inde sœdum inceptu sœdum
exitu quod vitet, sumat iuventus, quæ pro die
nunc primum ad publicæ valetudinis curam.

...
...
...
...
...

Primus animadversiones & cautiones conti-
net, quæ ad medicum pertinent, quatenus
modicus est, & probem loca esse poterit.
Secundus eas, quæ in recta victus ratione po-
tissimum in acutis occurrunt.
Tertius eas, quæ ad pharmaceuticum nego-
tium pertinent.
Quartus eas, quæ in sanguinis missione obue-
niunt.
Quintus eas, quæ in curandis febribus obser-
uari debent.
Sextus in ijs versatur, quæ ad morbos parti-
culares à capite ad membra naturalia per-
tinent.
Septimus eas comprahendit, quæ in reliquis
morbis obseruanda sunt.

LEONARDUS VATICANUS
L V D O V I C I
S E P T A L I I
M E D I O L A N E N S I S .

ANIMADVERSIONVM,
& cautionum Medicarum ,
Liber Primus , conti-
nenseas .

*Quæ ad Medicum pertinent , quatenus Medicus est ,
qui Probamꝝ loco esse poterit .*



1. MEDICVS pietatis , & religionis Medicus
maxime sit cultor , atque ad ean- pietatis
dem ægros conetur reuocare , cultor .

2. Habitu corporis in omnibus Sanitatem
sanitatem præferat , quantum præferas
peculiaris eius natura concesserit : putant enim
plerique hominum , si qui minus feliciter corpus
dispositum habeant , eos neq; alijs consulere pos-
se. Hipp. lib. de medico, nam aiunt, curet primum
se, & tunc me illi dabo .

3. Caueant igitur medici, ne se valetudinarios
prædicent, & si quando periodicis morbis ten- Nō sit va-
tangur , cur illos euitare nequeant , ostendant ; letudina-
quomodo autem facile illos euincant , etiam do- rius .
ceant .

4. Sit studiosus externæ munditiæ manibus po- Studiosus
tissimum , vnguibus, capillis, & barba. Ex Hipp. munditiæ
lib. de Medico .

5. Caueat

2. LVDOVICI SEPTALII MEDIOL.

Non exce-
dat in ea.

Vestitu de-
corus.

5 Caueat tamen excessum, ne in molliem ca-
dat, neue excrementorum alui, lotij, & excrementi
per tussim conspectum auersari credatur.

6 Vestitu vtatur decoro, Hipp. lib. de Medico.
caueat ne in suspitione ampullosi artificis cadat, &
sophista, quem depingit suis coloribus, Hipp. lib.
de decenti ornatu his verbis: ij. n. conuentu facto
ambinosa, & quæstiosa sua professione decipien-
tes, in vrbiū circulis versantur. Quos ex vestitu, &
cæteris ornamentis quis cognoscere poterit. Quin
etiam quò sumptuosius ornati fuerint, eò maiore
odio auersandi, & ab eis, qui eos circumspexerint,
fugiendi. Ex usu autem fuerit contrarium in his
spectare, quibus non in est exquisitus, neq; curio-
sus ornatus, qui se se & eultus venustato, & fruga-
litate non tam ad superfluam curiositatem, quàm
ad optimam existimationem, prudentiam, & ani-
mi moderationem comparant. Cum. n. illi do-
ctrina sibi auctoritatē comparare nequeant, splen-
dore auri, vestiu cultu Medico, ac seruorū græge
eū comparatē student, quos ridens Aristophanes
in Nebul. loco vocat *σπαγιδου χαρτοκομῆται*,
quòd digitos ad vngues vsque anulis ornent.

In odori-
bus qua-
lis.

7 Odoratis vtatur, caueat tamen, ne morbi in-
de concitentur: sæpe. n. moscum, & similia redo-
lentes hytericas mulieres enecant: sint igitur tem-
perata omnia.

Medicus
in omni-
bus præ-
stans qua-
lis.

8 Qualis esse debeat Medicus in omnibus præ-
stans, non alijs verbis quàm Hipp. describendus
videtur lib. de decenti ornatu. In reliquo vitæ
cultu minimè sint diffuentes, aut superflui, idest
honesti in omnibus, studēs, dicto, nec facto suas
actiones ultra, quàm decet, iactantes, sed cum can-
dore, veritate, & integritate, seposita omni simu-
latione

latione sincerè omnia representaates, in hominū concursibus graues; ad respondendū, & docendū faciles, & appositū, aduersus altercantes graues, & prò veritate constantes; in similiū amicitijs cōtra-hendis prospicientes, cū omnibus humani, fami-liares, & affabiles; in seditiosis cōtentionibus taci-urni, eosq; audiāt patienter; & in respōdendo, si effugere nō possint, modesti, & quasi cogitabundi prudētèr respōdeant, errores aliorū itā corrigant, vt nō reprehensionē, sed veritatem ob oculos sibi præfixisse ostendant: In occasione prudentèr cap-tanda, & cognoscenda oculati; In victu frugales, & paucis contenti; liberales sint, non sordidi, aut pe-taces. Patientes sint in occasione expectanda, neq; sinant se aut egri, aut assistentiū præcibus, aut im-portunis verbis vinci, aut ad medicamentū antè tēpus dandū, aut ad solidiores cibos, vinumq; cō-cedendū: Non sint taciturni, neq; loquaces, sed in ea re moderationē seruēt; promptitudinē tamē, data occasione, ad ratiocinandū ostendant, nihil sine demonstratione proferentes: non barbarè, aut popularitèr loquantur, sed cum assistētibus, & ægro elegantèr, & purè, cū medicis latinè. Rectè sciant persuadere, nā Plato Primo de legibus vult, vt primum doceat, & persuadeat Medicus, quid sit ægro faciendum, & non priùs imperet, ita prò-prius parebit, quare dicebat Arist. parebo lubens, si vera hæc, quæ dicis, esse demonstraueris: Hono-res per se contemnant ambitione carentes; sed ob virtutem, cuius comes est gloria, prò ipso etiam honore certent, virtutem tamèn certa ratione stabilitam libentèr admittant, ne opinionis suæ ni-mium studiosus videantur.

9 Caucant maxime, ne inani gloria, aut nimio
sui

Nō inani gloria, aut sui amore tentetur, illa. n. quod nesciunt discere præpudore renuunt, ne infetiam cum rubore prodant: per alium verò eò peruenisse se persuadent sibi, quò pergendum erat.

Nullius sit sectæ. 10 Ne se alicuius sectæ, tãquã micipiũ, addicãt; nec iurèt in alicuius auctoris sententiam, sed nudã tantũ sectentur veritatem; illiq; soli subscribant.

Qualis in congressibus. 11 Medicorum congressus, & consultationes libentèr admittant, illud observantes, vt in ijs superflua omnia deuitent, nihil ad pompam proponant, contradicendi studio non ducantur; sed cum solum sibi finem præfigant, vt morbum euincant, ac pristinam restituant sanitatem.

Consultationes fiãt seclusis arbitris, cur. 12 Congressu shi, & plurium Medicorum cõsultationes seclusis arbitris fiant, neq; affines, & domestici admittantur; liberiũ. n. sic proferuntur sententiæ, atq; facta à primo Medico, si quando correctione indigent, corrigi libere possunt finè nota ignorantia, quæ si firmis rationibus erunt firmata, facile à Medico admittentur: quæ si palã, & domesticis audientibus proponantur, ab eodẽ mordicus defendentur, etiam si falsum defendere se cognouerit, ne si mors subsequatur, illius causa in eum referatur. Vndè perpetua dissidia inter Medicos oriuntur, quod antiqui Patres nostri in hac nostra vrbe, & nostro Collegio observantes, lege cauerunt, ne consultationes medicæ publicè haberentur; vnde etiam tanta concordia inter Medicos magnæ huius vrbis semper perseuerauit; vt inter tã multos vix vnum reperiãs, qui alium ad medicas consultationes non admittat.

Siluã medicamẽtorũ ad manũ habeat. 13 Siluam medicamentorum præstantissimorum ad morborum genus quodcunq; promptam ad manus habeãt; ne ingruẽte morbo, ac inducias

non

non faciente, veluti in salo hæere videantur.

14 Vt selectiora quædam, & experta, sapiùsq; experientia confirmata habere eos conuenit, ita illa in arcanis ita habere non decet, vt etiam alijs communia non faciant.

15 Sit re, & opere Medicus, nō fama, aut nomine tātū; quod vt assequatur his omnibus præditū esse oportet, de quibus Hipp. lib. de lege. Nā excoli optimè debēt hominū ingenia, si ad pfectionē in hac facultate peruenire debeāt. Qualis. n. in terris nascētū est cultura, talis etiā medicinæ cognitio: indigemus igitur natura, doctrina, loco ad discēdū accommodato, institutione à puero, industria, & tēpore: Natura nostra veluti ager est, dogmata vero docētū veluti semina sūt: Institutio à puero respōdet opportuno tēpori, quo semina terræ cōmitti debēt: Locus studijs aptus est veluti ambiens aer, à quo terræ nascentibus nutrimentū accedit; Industria, & studium cultura est: Tempus tandem hæc omnia confirmat, vt perfectē nutriantur.

16 Exercitationem medicam sub docto, & perito viro facere non dedignetur, neque erubescat difficilia quæq; perscrutari, atq; de obscuris interrogare: sic per aliquod temporis interuallum in magnis vrbibus se se exerceat, non statim in vilibus opidis stipendio constituto, quod plerique faciunt, ad medicinam faciendam se se accingat.

17 Modestia quadam accinctus agrotantium domos ingrediatur, qualibet .n. hora virgines, matronæ occurrunt: vt continentiam omnibus in rebus & habere, & repræsentare teneatur.

18 Cum imperitis, & mulierculis de morborū causis, aut prædijs adhibendis non agat; sed necessaria solum proponat: solēt. n. imperiti Medici, vt &

Secreta re media nō habeat, sed cōmuniceret.

Quomodo excolendus.

Exerceat se sub perito Medico.

Modeste domos ingrediatur.

Cū mulierculis, & imperitis de re b⁹ Medici nō differat

vt & gratiam apud multos, aucupentur, hoc me-
dio mulieres, & imperitos seducere, quasi illas
multi facientes, vt si quandò morbis tententur,
eos ad curationem accersant.

Gratis ali-
quādo cu-
randum.

Mercedē
prompte
accipiat.

19 Gratis aliquandò medendum tùm paupe-
ribus, tùm veris amicis, ne aut sordidi animi, aut
minus grati notam subire cogantur.

20 Neq; tamē velim Medicos mercedē, aut da-
tā non recipere, aut oblatā quasi auersari, aut ex-
hibitā quasi cū rubore, aut veluti furtim excipere:
si. n. promptē mercedē recipere viderit, sibi æger
persuadebit medicū illius curationē libetèr suscep-
turū; neq; quippiā eorū ommissurū, quæ pro sani-
tate introducenda fuerint peragenda. Mercede
autē non recepta, aut dubitabit toto animo cura-
tionē non suscepisse, aut certe dignū illū ea non
se cognoscere, vnde contēptus, & existimationis
non leuis iactura. Sunt. n. qui hac ratione multorū
curationes aucupentur; quibus cum expectatiōi
præmium non postmodum correspondeat, aut
molestiā, & onus illud sinē fructu sustinere cogū-
tur; aut mulitantes, & in angiportu de ingrati ani-
mi vitio conquerentes quasi ridiculi, amissis labo-
ribus, & laborū præmijs, deferuntur, aut etiam ex-
ploduntur, alijs in illorum locum electis.

De merce-
de non pa-
ciscatur.

21 Impium est, magno morbo vrgēte, de mer-
cede pacisci: vt. n. in nobili hac arte semper hoc
indignum videtur, itā vrgente morbo, impium:
ocasio. n. mædendi sæpe euolat, dum de mercede
æger deliberat; huius. n. opportunitatis momenta
redire nequeunt: & ea elapsa, inclinatio fit ad mor-
tem, aut ad deterius.

Ingratos i
necessita-
tibus non
deferat.

22 At ne etiam, si quem ingratum futurum ar-
bitretur in periculis deferat: satius. n. semper fuit
ingratos

ingratos et futuros humanitate seruare, quā inhumane ob ingratitudinis metū deferere: & melius multo est à morbo eualescentibus exprobrare, quā calamitosè affectos deferere. Hipp. in præceptionibus.

23 Ne immoderatè, aut immodestè nimia cū iactantia nimium polliceatur, nimia. n. ante curationē pollicitatio excusationem post curam requirit.

24 Nec ratione in curandis morbis solū nitatur, nec vsu, aut nuda experientia: Claudicat. n. Medicus alterutro horum crure destitutus. Ratio igitur ab experientia incipiat, & in eam etiam desinat: Experientia autem ducem habeat rationem, & in eam denique terminetur, vtra enim per se indigens, altera alterius auxilio eget.

25 Non inhumana seueritate vbiq; vtatur, sed secundum conditionem hominum se gubernet, nonnunquam gratis cūret, vel ob gratitudinis memoriam, vel præsentem estimationem, ne auaritiæ notam incurrat. Quod si occasio exercendæ liberalitatis se se obtulerit, vel peregrino, vel egeno omnino succurrat: Si. n. adfuerit benignitas, adert etiam artificio comparatus arti amor: Ad eo ut quidam ægri, etiam si sentiant morbum suum calamitosum esse, samen propter Medici benignitatem, sibi persuadeant se ad sanitatem redire posse: Hipp. in præceptionibus.

26 Pro laborantium varia natura, & conditione in congressibus, & sermonibus cōferendis orationē instituat, & materiā sibi deligat: alio. n. modo cum viro philosopho est disserendum, & alio cum aulico: diuersa est ratio alloquēdi puellā virginem, & matronam grauem: cum bibace aliquid de vino loquetur, de frigida, & limpidæ aquæ delicijs cum abstemio; & sic in singulis.

Nō sit iactantus, & nimis pollicitator. Doctrina, & vsu polleat.

Non sit seuerus.

In sermonibus varius, pro ægrorum varietate.

LEONARDUS SEPTALIS

MEDIOLANENSIS,

ANIMADVERSIONVM,

& cautionum Medicearum,

Liber Secundus continens eas.

*Quae in recta victus ratione, potissimum
in acutis occurrunt.*

Victus in
acutis tenuis, cur.

Victus vir-
tute per se
debili aug-
gendus est in
forma; si
vi morbi
solū quan-
titate.

In virium
imbecillitate
cibus parū
& raro si
per aggraua-
tionē: si per
resolutionē
parum
& saepe.

Quamuis acuta febre laborantibus victus tenuis conueniat, pro varietate acutiei immutandus, ut & materia concoquenda natura magis possit vacare, atque morbo & symptomatibus conflictata, cibo etiam & crassiori, & pluri oppressa non succumbat; virtute tamen debili per se ipsam existente, & non vi morbi; aut forma victus per unum gradum, aut saltem quantitas erit augenda. Si verò vi morbi debilis reddatur, ut aliquo modo quantitas augeri potest, ita nunquam forma victus erit immutanda.

2. In virium imbecillitate alia sit ratio victus in quantitate, si per resolutionem fiat, & alia, si per aggrauationem: in hac enim parum, & raro; in illa parum, & saepe cibus offerendus est.

3. Victus forma, & quantitas licet ab Hippocrate & Medicis

Medicis præscribatur definita pro cõditione morbi, & virtutis; cautio tamen maxima adhibenda est respectu naturalis temperamenti: cū alios ad ingediā minus idoneos videamus, alios jejuniō ne tantillū quidem debilitari: quare augendam in illis quantitatem dicimus, quin & formę gradum aliquando immutandum, vt in calidis, & calidis, & siccis obferuamus; in quibus nisi id fiat, & acuumtur magis febres, aduruntur humores, & exhauriuntur spiritus; vnde in animi deliquia, syncope, & marasmo deniq; terminantur ægri.

4. Cautio etiā adhibēda est in victu instituendo, qualis sit corporis habitudo, an mollis, laxa, poris peruijs; an solidior, torosa, & durior, in illa. n. quātitas erit cibi augenda, in hac potius minuenda.

5. Habenda etiam maximē est ratio ventricoli: Si. n. vegetus sit calore, & multo sēsu præditus aliquantō plus illi erit concedendum: si ad cõctionē iners, & calore destitutus, subtrahendum de quantitāte erit.

6. Viris, quā mulieribus; iracundis, & robustis, quā pusilli animi homuncionibus, plus semper est concedendum.

7. In ætatibus, vt pueris, & adolescentibus plura sunt concedenda tum ob distensionem nimiam, & ob caloris robur, & ob teneram, mollemq; substantiā compagē, tum quod perenni quodam corporis motu, agitati faciliē exhauriuntur; itā senibus liberius etiam ieiunium potest imperari. Caue tamen ne inter senes decrepitos collocaueris: hi. n. cum virium imbecillitate sententur, ac spirituum paucitate, vt paucō cibo sunt reficiendi, ne paucus calor à multo suffocetur, itā sapē cibandi ne consueuantur. Primo Aphor. 14.

et pueri
victus im
mutandus
ratione tē
perament
torum.

victus im
mutandus
rōc habet
corporis.
victus im
mutandus
rōc dispo
sitionis vē
triculi.

Cibi quāti
tas mūlti
da respo
ctu sexus.
Pueris &
adolescēti
bus plus ci
bi cōcedē
dum quā
senibus.
Decrepitis
parum, &
sæpe.

laboret, quod Amic. l. 4. Tract. 2. cap. 8. decibat. fo-
bicit. in generali agens confirmavit.

Obſervandū autem, prædicta nob perpetuā
habere veritatē, neq; ratione corporū, neq; ratione
temporū anni; aliquam. dātur corpore, quorū na-
turalis caliditas ad eū eſt imbecillis, et à frigidityte
hyemis facile evincatur, calore vero æſtatis quaſi
foueaturs alia etiā ſine oculta quadā, & nobis inco-
gnita propietate in aliquibus dictorum temporū
anni; in robore vitiū, aut imbecillitate propor-
tione non reſpondent diſpoſitionibus ex anni tē-
poribus præſentibus: aliquos enim videas æſtate
robutiones reddi, quā in hyeme; & alios fortiores
Autumno, quā Vere. In his in ratione victus inſti-
tuenda poſſibiū reſpectu quantitatis ad, quod pro-
xime dictū eſt, non verit. ſervandū ad in quantita-
te continui, tum in diſcretā: Et hyeme pauciora,
ſed ſepiās, æſtate plura, ſed rariūſe ſunt conceden-
da; & anni tēporē, ſi naturalē non ſervauerint na-
turam, victum inſtituendum oſtendent pro ratio-
ne temporis, cuius naturam induerunt.

Forma enī victus pro regionum: varia-
re; & ſolitorum conſuetudine aliquo modo eſt im-
mutanda; & quidem eadem ſervata proportionē
per gradus, et in quantitate, varianda ratione tem-
porum obſervandū diximus. Vnde laudandus
Auer. 7. collecta afferens in ſua regione, nempe in
Hiſpaniæ parte calidiori tenuiſſimam dietam eſſe,
aut cremorem pordei, aut panem, aut inciſum, aut
friatum ex aqua coctum, cum antiquis, & Gal. po-
tiſſimū eſſet, aut quiniſmoda quatrigena inedia,
aut ad ſumum melieratum, ſic tamen vt victus
forma ſolum per gradum vnum immutetur, non
autem tranſitus fiat non à gradu ad gradum, ſed à

Hyeme
quādo mi-
nus nutriē-
dum.

ſibi xiv
xv
xvi
xvii
xviii

xix
xx
xxi
xxii
xxiii

Victus ſer-
uā in acu-
tis variā-
dā pro va-
rietate re-
gionis.

12 LVDOVIGI SEPTALII MEDIOL.

tenuit ad medium, & aliquando etiam, ut dicantur, postea, etiam ad plenum, quasi Petronii sectatores quod in multis Italiae nobilissimis Urbibus, & apud Hispanos, & Gallos passim fieri obseruamus. Pro varianda vero hac victus ratione respectu regionum etiam iuxta præcepta Hipp. legendus est pulcherri-
mus eius liber de aere, aquis, locis, qui etiam lucu-
lensis commentariis à nobis est illustratus.

**Vitæ insti-
tutum mutat
formā vi-
ctus in a-
ctus.**

13. Ex vitæ instituto, ex arte etiam, quam exer-
cent, desumenda erit Medico, & forma quando-
que victus, & quantitas, eaque utraque mutanda,
prout magis, minuscque, & laboribus solidiores
partes colligantur, & humores, spiritusque exha-
runtur.

**Victus mu-
tandus ex
anteacta
vita.**

14. In quantitate etiam præstribenda anteactæ
vitæ rationem habere non parui momenti est. Si
lautè altus sit, si plura ingesserit, subtrahenda erit
quantitas: si uero ieiunauerit, & pauca, eaque con-
coctu facillima assumpserit, per aliquod temporis
interuallum quantitas erit augenda, aut formæ
gradus.

**Morbus cu-
ignotatur
attentius
dū quomodo
do, & cur.**

15. Cum à morbi longitudine, aut breuitate, di-
stātiaque status morbi maxime desumatur & forma
victus, & aliqua ex parte quantitas, ut virtutis, ad
quam omnis victus ratio, maxime habeatur ratio,
optimè consultum Medicis, & agris censemus, quod ab
Antico constitutum est. Cum ignora ægri-
tudinem subtilia regimen: id. n. in morbis à ma-
teria pendentibus omnino intelligendum est: bre-
ui. n. illo temporis interuallo materia non auge-
tur, nec virtus distrahitur à proprio fungendo
munere agendi in materiā: interim. n. suis se signis
morbis, & materia faciens morbum facile ostendet.

16. Ut verissimum est Medicorum illud præce-
ptum,

ptu, & cōmune tā diuturnis morbis, quā acutis; In statu tenuiori victu vtendum esse, quā in principio; quoniam tamen sēpe numero euenit ob ingluuiem in aliquibus Ciuitatibus ventriculos primis statim diebus, qui principio debentur, crudis humoribus esse refertos, in iisdem etiam tenuiori victu, quā per principium liceret, vti, & aliquandō etiam tenuiori, quā in statu, cū & inedia, aliquandō omnimoda conueniat, oportere cēsendum est. Celsus lib. 2. cap. 16. dicebat initia morborum primum famem, sitimq; desiderant.

17 Laudāda illorum est distinctio in tenui, aut crasso victu instituēdo in acutis, & diuturnis morbis; quōd in febribus acutis tenuior esse debet data eadem breuitate, quā in alijs acutis morbis; quōd in illis magis coctioni incumbendū sit, q̄ vir tute, ac maiora subsint symptomata: in diuturnis autem febribus minū tenuitē alendum est; quā in alijs diuturnis morbis, quōd in illis maior, quā in his fiat virium exolutio, & propterea etiam magis in febribus virtuti est prospiciendū.

18 Cū Hipp. aphoristica sentētiā quā maximē vniuersales esse soleant, ea itidem, quā lib. 1. posita est numero octaua, qua asseritur, Cū morbus in suo vigore cōstiterit, tenuissimo victu vtēdū est, vt vniuersalis sit, omnibusq; morbis cōueniat, de statu intelligēda erit, qui ex magnitudine symptomatū sumitur: sic. n. tā vera erit in morbis non seruātibus materiā ad vnā criticā expulsiōē, quā in seruātibus, secus quā cōmuniter Medici crediderint, qui Aphor. illū solū verū esse cēfuerūt in morbis seruantibus materiā ad vnā criticā expulsiōē, de statu arbitantes Hipp. loqui, qui à coctione desumitur: in quo obseruauit Hipp. primo de

In principio cur tenuiss. aliquando cibandū.

Acutis in febribus tenuius cibandum quā in alijs acutis.

Tenuiss. victu vtēdū in statu sēper 1. aph. 8. verissimū de statu penēs symptomata.

24 LVDOVICI SEPTALII MEDIOL.

victu acut. 22. in morbo non ferente materiam ad
vna critica expulsionē, vt in Pleuritide, in statu pe-
nēs coctionē plenius nutriēdū statuisse, quod si sta-
tū penēs magnitudinē symptomatū etiā in ijs mor-
bis sumamus, vt in Pleuritide, etiā tenuissimō victu
vtitur eodē li. ex. 21. cū os amare scit, & siccus mor-
bus est, tenuius erit alendū: tunc enim etiā si sit princi-
piū, aut augmentū penēs coctionem; in statu ta-
men penēs symptomata constitutus est morbus.

Tenuis. vi
ctu licet v-
tendum in
pautis pe-
nitentes in
febres sūt
exicipiēz.

29 Quamuis verissima Hipp. sententia 1. Aph.
7. tenuissima diætā vtendum esse, vbi morbus per-
acutus est, & extremos habet labores, exhiuendū
tamen ab his omnino erunt febres pestilentes, in
quibus quauis summa sint symptomata, & citis-
simē ad statum perueniatur, quod vires in eis sta-
tim quasi collabascunt, lauius, & vberius est nu-
triendum ipso etiā vigoris tempore, vt abundē
demonstrauimus in nostro libro de Peste.

Victus for-
mā in acu-
tis quæ do-
ceat, vt
pautis v-
tendum in
pautis v-
tendum in
pautis v-
tendum in
pautis v-
tendum in
pautis v-
tendum in

20 Ad formam victus instituendam, puta an te-
nuissimo, an tenui, an mediocri, an omnimoda in
aia, an solo potu, an sorbitionibus, an ferculis,
puta tota ptisana, pane conciso, aut phritō ex iu-
re, quamuis virtus primum locum sibi vindicet
Gal. teste 9. Meth. med. cap. 11. & 13. & 1. de rat.
vict. in acut. 44. quod cū morbus sui ablationem
solum indicet, virtus verò sui custodiam, hæc po-
tissimum victus formam ostendet, morbi tamen
dispositio etiā ad hoc cōcurrit, nam prima Aph.
6. dicebat, vbi morbus peracutus est, & statim ex-
tremos habet labores, extrēmē tenuissimo victu
vtendū est; per labores accessiones, & symptomata
intelligens, quæ morbi dispositionem constituunt,
vt & colligi potest ex Aphor. seq. & primo acut.
42. 43. 44. & 2. acut. 36. vbi ad formam victus inue-
stigandam

figandam, dicit necessariam esse cognitionem, & roboris, & dispositionis morbi, & 3. agur, 64. & iure quidem merito; quis n. nesciat ex longis, grauibufq; accessionibus, grauibufq; symptomatis formam victus tenuioresci indicari, ne natura tunc in resistendo causam morbificam, & symptomatibus decens ad conuequendum cibum distrahat? Verum nec virtus sola sufficit, neque illi coniuncta morbi dispositio, nisi ijs distantia status præcognitionem adiungamus; nam, ex constitutione morbi, & virium robore, solam portionem in præfenti conuenientem esse cognouerimus, perfecte tamen hoc scire, non licet, citrà status præcognitionem, an cibo illo in posterum sufficere valeat, citrà virtutis incommodum. Ob id Hipp. postquam morborum dispositionem recensuisset, subiunxit, Coniicere autem oportet ægotantem, si sufficiat, cum victu perdurare, donec morbus consistat, & ob id Hipp. in consideratione virtutis, status meminit. A morbi igitur dispositione victus formam eliciemus; deinde ægotantis virtutem inspicimus, deinde status distantiam coniiciemus; demum æstimabimus, an eo victu, quem morbi constitutio indicat, victus ægotantis ad statum citrà magnū virium incommodum durare queat, inquam sententiam genuisse Gal. videmus prima Aphor. 12.

21. Cum in victus institutione illud maxime sit apud & antiquos patres nostros, & recentiores controuersum, cum difficili admodum negotio, & forma victus, & quantitas determinata perscribi possit, ad quam partem præster declinet, ut minus ledamus, an ad ampliores, an ad tenuiores, ob locos Hipp. controuersos Aph. 3. & 2. de rat. vict. in 2. 37. & alios, in ea difficultate has adhibeat

Errores in tenui victu pualēte indicatione virtutis, sunt deteriores si in defectu.

cautiones Medicus: Cum à virtute primò illa dicatur institui, & per se p adiectione, secundario, & per accidens à morbo per subtractionem; Si Medico in victus ratione instituenda, tum in forma, tum in quantitate, viribus nò multum validis, nec morbo multum contraindicante, contingat aliquantisper à recta victus ratione deflectere, satius multo est paulò pleniori vi victu, & ad satius, vt aiunt plenioris accedere, quàm ad tenuiorem prevalente indicatione virtutis, quæ regulam etià exemplo confirmavit Gal. 1. acut. 44. Quemadmodum è contrà, contraindicatione morbi subtrahendi prævalente, & viribus validis, cæteris etià morbum adiuuantibus, præstabit omninò ad tenuiorem deflectere, ac si quando errando à recto illo tramite recedat, minus peccabit, si ad latus tenuioris accedat, sic. n. ratio dicat, prævalente, eo quod subtrahendum esse indicat, morbo, quod ibidem Gal. affirmavit.

Prævalente morbo sunt deteriores si in excessu.

Errores in forma victus pari indicatione à virtute, & morbo existente sunt pares

22. Obseruandum autem, si pars indicatio à virtute, & contraindicatione à morbo in victus forma instituenda, æquale omnino esse peccatum, si per vnum etiam solum gradum à recta deflectamus tum supra, tum infra; si nempe, aut plenior, aut tenuior instituiatur victus, secus quàm censuerint hactenus interpretes omnes, quorum alij vni, alij alteri sententiæ sunt addicti: Hipp. lib. de veteri medicina id ostendit eorum opinionem refellens, qui asseruerunt tutius esse, si quis aberrat, deflectere ad tenuiorem, quàm ad plenior, loquitur verò de forma victus, vt eius verba ostendunt, cum inquit. Si quidem igitur simpliciter, velut aliqui putant, quæ fortiora sunt, nocerent, quæ debiliora prodescent, facilis sane res erat: Multum. n. de securo detrudere oportebat, vt ad debilissimū

deduce-

deduceretur. Nunc autem nō minus delictum, nec minus lædit hominē, si pauciora, & defectuosiora, quā satis est, assumat: fames .n. magnā potentiā in naturā hominis habet, & sanandi, & debilitandi, & occidendi: multa autē etiam alia mala diuersa quidē ab ijs, quæ ex repletionē sunt, non minus autē graua inanitionis sunt. Quamobrē multo variegatior est, & maiorem diligentiam requirit, oportet .n. modū aliquē coniectari: Modū autem neq; pōtius, neq; nūmerū aliquem, ad quē referas, cognoscere: Certitudine .n. exactā non reperies aliā, quā corporis sensum: Quapropter valdē operosum est, itā exactē condiscere, vt parū in alterutrā partē delinquas, quāquā ego etiā eū medicū vehementer laudare, qui parū delinquat; Certitudinē .n. exactā rarō videre contingit. Mox cōparat malos medicos malis nāuiū gubernatoribus, qui dūm tranquillū sulcaut mare, etiam si aberrēt, nō sunt manifesti eorū errores: at vbi tēpestas ingruerit, statim eorū detegitur ignorātia; Itā & medicorū errores, dūm salubres morbos curāt, etiā si maximē delinquāt, nō sunt manifesti: at vbi graues morbi se se illis offerunt curādi, tūc manifestē deprehēdunt: mox exēplo sanorū, docet nō minorā incōmoda puenire à repletionē, quā ab inanitionē: & loquit nō de quātitate, sed de forma victæ vt patet ex primis, cū dicit, si quæ fortiora sunt, nocent, quod ad substantiā ciborū pertinere constat.

23. At verō paribus, & ex virtute, & ex morbo vigentibus indicationibus, si quis in metiēda quātitate à recta rationē recesserit, itā vt plus in quātitate, quā oporteat, exhibeat, aut à debita mensura aliquid detrahat, puta, si sex vncias succi pitæ exhibere debeat, & aut octo, aut qua-

Errores in quātitate sunt peiores, si plus cōcedatur quā oportet.

quatuor tribuat, maius committitur, si non
 concedis, quam si quatuor, solas propter hoc animi
 est quod Hipp. 37. et auct. docet, adiectioni autē
 ciborum multo minus accedendum, ratione red-
 dit, quia quod plus est noxae, affert, inemendabiles, quod
 vero minus, facile emendatur, neque, si virtus liba-
 scere videatur, cibi exiguum possumus ministrare,
 verū, si in vitem cibum, si ablopius, quod super-
 fluit, si alias, multo magis in acutis morbis tollere
 est difficile, ubi & Hipp. & Gal. verba non de for-
 ma victus, sed de quantitate esse manifestū est: mul-
 tiū verō id refert: quoniam victus forma, & gradu, &
 specie diuerse sunt: cognosc. q. & eligi, discerni q.
 a medico in Hipp. & Gal. operibus exercitatio po-
 terunt, sique in ea errores committantur, necesse est
 specie mutare, sicq; magna erit mutatio, etiam si
 per unū solū gradū, aut specie transieris, ut a meli-
 crato ad inedia, vel succū pituitosū; unde & parer-
 ror committitur. At in quantitate cum cōiectura so-
 la uti possumus, an magis, an minus sit exhibendū,
 non est par ratio; quia, si tantam quantitatem exhi-
 bueris prima cibatione, ut commodē cōficere pos-
 sis, nullo morbi, aut in vehementia, aut in accessio-
 nibus facto augmento, & eam quantitatem faci-
 le ferat, videaturque maiorem etiam quantitatem
 citra incommodum ferre posse, quis inde conijci-
 te minus, quam oportet, exhibuisse, in sequenti or-
 blatione parū adicies, ita quod minus est, facile
 emendatur; quod si plus exhiberemus, quam ag-
 rantis natura ferre posset, noxam emendare ita faci-
 le non esset. Nam hunc errorē hāc sequuntur in-
 commoda, grauitas hypochondriorum, frequen-
 tia anhelitus, febriles incensionēs, sitis, capitis do-
 lores, & huiusmodi, quae omnia difficile tolli pos-
 sunt;

sunt; nam repletionem hanc medicamento tolle-
re non licet, cum in acutis passionibus raro medi-
camentis purgantibus uti liceat, præsertim ante
declinationem. In forma vero sensus est; nã si à debita
forma vel supra, vel infra etiam per se non gerant tan-
to deflexeris; ægrum præcipientes in mortem, vel longa
oratione docuerunt Hipp. & Gal. in acut. 30. 40. &c.
44. & 2. acut. 19. 37. & 48. locus verò 1. aphor. 9. qui
huic determinationi est directio adversari videtur,
nullo modo repugnât; neque enim loquitur de to-
niori victu quã par sit, sed de erroribus, & lesio-
nibus in tenui victus ratione evenientibus, dicens es-
se maiores lesiones, quæ decidunt ex erroribus in
tenui victu accidentibus, quã quæ ex erroribus cõ-
missis in paulò pleniori. Vchertè dici potest in il-
lò 5. Aph. loqui de tota victus rationis forma in to-
to morbo, quæ multò periculosior est, quia errores
cõmissi magis lædunt, ut acut. 37. loquitur de vni-
ca, aut altera cibi exhibitione in quantitate, quæ si
plùs fuerit, quã oportet, plùs lædit, quàm si minùs.
Ne quis errorem censeat, si medicus ali-
quando ex pluribus cibis non malis, minùs bonũ
feligat, & per totum morbi decursum in usum du-
cat, si multò magis palato ægrotantis arrideat, siue
ex consuetudine; siue ex natura peculiari, siue ex
appetitu in morbo: Docbat enim Hipp. id om-
ninò præstandum 2. aphor. 30. sed diligenter at-
tendat ne luxu, & intemperantia ægri in errores
ducantur, quod passim ab adulantibus medicis fio-
ri video, quòs ut principum virorum gulæ tanquàm
mancia inseruiant, abutètes utilissima Hipp. sen-
tentia, aut ægrorantes præcipientes agunt in mortem,
intemperantiz, & dominæ di cuiusdam libidinis
pœnas dantes, aut morbo prorogato cruentas suas
om.

nonis d
et d
m
et d
et d
et d

ind
et d
et d
et d
et d
et d

Gibus par
dò dete-
rior, modò
suavior cõ-
cedendus:
quomodo
intelligen-
dum
et d
et d
et d
et d

omnino implentes; cum sciant Hipp. dixisse non absolute, sed paulò deterioresem præstantiori, modò suavior sit, esse præferendum.

Cibatione 25. Gratificandum præterea quandoq; ægris do-
in vna gra- cebat Hipp. 6. Epid. secb. q. 11. 8. à t. id aliquid am-
tificadum plus est, vnam. n. aut alectam cibationē respicit, in
ægris etiā qua deiecto appetitū, aut vi morbi, aut lōgitudine,
contra re- aut vt obsequentiē magis in reliquis habeamus ali-
gulas. quid comedendum; quod extra limites instituti vi-
ctus etiam sit positum, modò modicū sit: interim
plura polliceātur, vt importunitatem cohibeant.

Auersanti 26. Aliquando tamē cō vsque deiecta est in-
bus oīnō ægris appetentia, vt cibi genus omne refugiant, ac
cibum ali auersentur, quin etiā, ratione suadente, cū vim
quāddetiā sibi ipsis inferāt cibos assumētes, statim illos euo-
pessima mūt, & tūc medicus deterrima quēq; cōcedere so-
cōce den- mel, aut iterū debet, vt vires custodiat, ne in cer-
da. tissimā mortē cadāt: sepē. n. euenit, vt ex malo illo
cibo assūpto expetito natura instauretur, & mor-
bus omnino quasi conclamatus superetur.

Cibos a- 27. Cauēat in auersantib. cibū, ne alimēta præpa-
uerfantes rētur ipsis præsentib. aut. n. maior ex diuturna visio-
ne cibos ne subsequetur auersio; aut recula aliqua minūs il-
preparare lis aridēte visa, in maiore cadēt abhominatiōe.
videant.

Victus hu- 28. Cū Hipp. 1. aphor. 16. febricitantiū victum
midus fe- omnē humidū esse debere scribat, caue, ne censeas
bricieantib. de humido solū potentia loqui: quāuis. n. & il-
oībus cō- lud requiratur, humidū tamē a cōtu, siuē liquidū,
uenit a cō- esse debere manifestē intelligit: nam alibi, vt 1. de
& potētia dicta, cibū humidum esse debere, id est potentia,
talīs. imbecillum, sitis expertem, coctū facilem, & liqui-
dum omnino testatur, qualem ibi Ptsanam cōsti-
tuit: humidum verò potentia etiā liquidum esse
debere docet, & Cornel. Cels. lib. 3. c. 6. cuius etiā

rei rationem reddit Gal. lib. de opt. secta ad Tra-
fib. 4. cū ait, qm̄ quæ cōcoquantur, effunduntur,
ideò, & mox distribuuntur, & egrotantes nō mul-
to labore in cibis conficiendis indigent. Et ab his
præceptum nascitur, liquidos cibos oēs febricitan-
tibus cōuenire. quod confirmavit 1. acut. 18. & 1.
ad Glau. cap. de cur. feb. cont. sine accidētibz, ubi
cibos oēs febricitantiū debere esse liquidos testa-
tur; quia humida actū, & facilius in chili formā re-
ducuntur, & cæteris paribus facilius multò cōco-
quantur: cū enim ex febre calor naturalis imbe-
cillior reddatur, ea erunt exhibēda, quæ facile cō-
ficiuntur. Viderint igitur quā bene victū in fe-
bricitantibus instituant, qui petronā imitantes so-
lidiora concedunt, & non solum elixatas carnes
exhibent, sed assatas etiā, in quibus vix humidi-
tas in potentia reperitur: sed de hoc postea.

29. Vt verissimum est in accessionibus. i. princi-
pio, augmēto, & statu abstinendū esse; declinatio-
nemq; in cōtinuis, & potius interuallū in intermit-
tentibus cōmodum tēpus esse nutriendi, vt colligi
pōt ex 1. apb. 11. & in fin. 1. de ratione vic. in acut.
itā declinante febre acuta, si vires vrgeant, forma
aliquo modo erit mutanda, vt, si pristinā hordea-
cea sit forma, in fine status, aut inchoante declina-
tione primò potionem dabimus, vt cremorē hor-
dei, vel iusculum refrigerans, vel stillatū carniū
cum aliqua aqua refrigerante; mox interpositis
tribus, aut quatuor horis cibum iam institutum
concedemus, vt innuit Hipp. 1. acut. in fine.

30. In synochis verò, quæ vniformes sunt, ean-
dēq; à principio morbi ad finem vsq; seruant for-
mā, vnicaq; accessione perficiuntur, quando nam
sit egger cibād°, docuit Gal. 11. meth. med. c. 5. nepe-

In longis
accessioni-
bus quo-
modo, &
quādo ci-
bandum.

In syno-
chis quan-
dò cibā-
dum.

quan-

22: LVDOVICO SEPTIMALI MEDIOL.

quantū rger facilius tolerat morbum invidetur, & quando, dū in sanitate frueretur, cibū sumere consueverat: si igitur & facilior tolerantia cum solita hōta coincideret, hæc erit eligenda: si minus semper prævalerio facilis tolerantia, quæ si immanifesta modo fuerit, ad solam consuetudinem tunc tempus nutriendi erit deferendum: nisi aut ab eo, quod dicitur

Cibare p-
stat in fine
status, quā
propē in-
uasionē &
quando.

Quod si contingat in intermittere cibū etiam in-
teruallū nullum esse, & declinare morbum inquam
expectantia accessione, tūc ut caput se poris, à fine sta-
tus ad nouā inuasionē non intercedat, ut cibis ip-
gestus conquiescat, puta spatium horarū a cibus
ita vnde cessatū si autem signis vigore nutriti, vel
sequenti accessioni occurrere cibo incocto, & reple-
to ventriculo, quod sæpe in praxi exercebatur: occu-
rit, quid in eo casu faciendū erit? an mē faciat eis
vigetia accessione cibū propinare, an potius vigore
citrato sanus erit, cibo in ventriculo existente, se-
bri occurrere? Communiter ab omnibus respondetur
deterius esse multo in principio cibū exhibere, quā
in statu, quod nocumēta principij etiā alijs tempor-
ribus comunicantur, non sic autē nocumēta sta-
tus. Verūm mukōsecus Gal. 1. 2. meth. med. ubi mō
rē hanc definit, ubi, casu proposito eodē, conside-
randū esse id docet, quod magis virget, quodque
magis nociturum iudicauimus, fugiendum mō-
cetque esse consideranda, locum affectum, affectio-
nem, principij, & status naturam, tūc & motus
morbi locus quidem, & affectio, ut si ventriculus,
vel hepar afficeretur inflammatione, si paulo antē
accessione cibaremus, omni mō esset perniciosum:
hepate enim affecto, alii deiectiones: vna cum ac-
cessionibus solent inuadere: si autem ventriculi
vexato syncopes superueniunt. Vbi verò abest in-
flam-

inflammatio, & vires debiles fuerint, statu omnino
 eufiato, propius principio cibum offerre expedit,
 potissimum si mos morbi, principij, & status mori
 respondeat, hic vero consideratur in vigore, & prin-
 cipio, si annotauerimus in summo vigore an citra
 magnitudinē febrilis calor siccus sit, & squallens,
 an citra squallorē, vrens; Priore namq; humiditate
 victu madefacere quāprimū oportet. In secundo;
 dum plurimū caloris remittat, expectare. In prin-
 cipio verō accessibus morē estimabis, an corporis
 extrema perfrigeret, & magnā sanguinis renova-
 tionē ad interiora corporis faciat, an omnino cor-
 pus non premat. Quippe secundū hoc, seu facile,
 māsuetumue, contēnes: in priore distinguas, opor-
 tet. Nā si absq; viceris phlegmone, aut succorū re-
 dundātia, motus ad interiora, in accessionibus pos-
 set, nihil offēdes paulo ante cibans; sin vel phleg-
 moni, vel redundantiā sublit, cauenda est ante acces-
 sionē cibatio, seu res maxime noxia. Cū tamē mul-
 to maior sit quantitas morborū, & habitudinū cor-
 poris, quæ exposcunt, vt potius in fine status nu-
 triamus, quā propē principium nouæ accessionis,
 magis laudarem eam propositionem medicā, qua
 assereretur, urgente hæ necessitate, præstare in fi-
 ne status nutrire, quā etiam per duas horas ante
 principium, quod maior quantitas febrilium sit ex
 genere putridarum ex obstructione ob abundan-
 tiā crassorum humorum, & ex interno, vel ex er-
 no phlegmone, in quibus, Gal. teste, præstat in fine
 status nutrire, quā proximē ante principium.

32. Commendandus tamen aliquando cibus &
 in principio, & in augmento, & statu, & proximē
 ante principium, vbi habitus corporis aridus ad-
 modum, atque squallens fuerit, & in febre admo-
 dum

Cibū offer-
 re in prin-
 cipio, &
 augmento
 accessionis
 qū liceat,

dum ardente, bilioso humore, etiam exuberante,
atque ad ventriculi os transfuso. Tam ubi longa-
precessit inedia, vigilia, immoderata tristitia, & so-
licitudo, quibus & exsiccatur, est plus nimio; & exca-
lesfactum corpus, multique congesti acres, & mordaces
humores; pro quare bene intelligenda legodus
est Gal. poster. 10. Meth. med. 2, 3, 4, & 5. in quibus
casibus præstabit antè inuasionem, & in ipso prin-
cipio cibare, quam in fine status. Verum cum hoc
rarius contingat in casu propositum ubi à statu ad
principium nouæ inuasionis tantum temporis in-
tercedit, ut commodè cibum offerre possimus, præ-
stabit dicere, melius esse in fine status nutrire, quàm
proximè antè principium, secus quàm recentio-
res omnes medici hactenus crediderint. Cum ali-
qui passim Hipp. & 1. acut. penultimo, & 4. acut.
39. & Galen. in com. multo plura referant incom-
moda, si quis in principio cibum offerat, quàm si in
statu, & hoc est quod innuit prima aphor. vndeci-
mo. cum dicit in accessionibus abstinere oportet,
id est & proximè antè, & inchoante inuasionem.

Augmētū
accessio-
nis minus
incommodū
cibationi
quā status

33. Quoniam autem aut in complicatione dua-
rum febrium, aut in vna eadem, in qua tempora
adeò extenduntur, ut, antequam superueniat de-
clinatio, noua accessio superueniat, sicque neque
intervallum, neque declinatio reperitur, in qui-
bus cibum offerre ex ratione possimus, in ambi-
guo medicorum animus hæret, quando nam cibum
offerre expediat; augmētū tempus pauciores, &
minores secum inuhere læsiones censerem, quod
nec ea immincant damna, quæ sequi docuit Gal.
& 11. Meth. & 1. acut. penult. & 4. acut. 39. neque
usque calor, & symptomata peruenierint ad summum,
ut in vigore, non negandum noxas etiam ex oblato
cibo

cibo in augmento nō patuisse excitari, et in dictio-
ne a virtute vrgente, cōmodo tempore, in cibo
impertinente sublata, illud eligendum tēsentis,
quod minora secum inuehit incommoda.

34. Caeceat, ne tempus triū horarū censeant suffi-
cere ad cibi oblationē ad nouā inuāsiōē, quod ple-
tiq; consueverunt Gal. auct. ducti 8. meth. 4. vbi asse-
rit satis esse, si tres horas equinoctiales, quatuorue
interbalneū, accessiōisq; tempus interponat: a
balneo enim cibi exhibere solebat; Cū aliōq;
Gal. 3. meth. 1. docuerit maximē in omni febre
coctiōis incumbendū esse: quia si adueniente ac-
cessiōe cibus in vētriculo nō sit confectus, ex tra-
ctatione caloris ad interna febris omnino inten-
detur, pessima illa symptomata producentur; de
quibus Hipp. & Gal. 4. acur. 19. & Auic. 1. 4. c. 8. itā
in febribus cibandū praecepit, vt vacuo vētriculo
occurrant: hae verō condictiōe in sanis quidem
triū horarū spatio consueti potestū in aegris na-
tura ex morbo debilis reddita seghiter coctiōis
vacet. Si igitur fuerit sorbitiō vt ptiſſana, aut
contritus panis lotus ex iure, aut idem conditus,
aut huius quippiam, quinque, sex, aut etiam septi-
mē horae concedenda sunt, plus, minus pro co-
ditiōe ventriculi, & p̄conditione febris, aut hu-
moris peccantis; si verō posio simplex fuerit, vt
cremor hordei, mulsio oxymel, aqua ex saccharo
cum succo aurantiorum, aut melleculum alterarum,
tres quidem horae equinoctiales sufficient; de
qua locutus est Gal. 8. meth. 4. de decocto enim
radicum apij loquitur, non de sorbitione, aut feru-
culo, quae non exhibuisse constat ob angustiam
temporis ad sequentem accessiōē subditiōē ve-
rō circa vesp̄ā, aut duabus horis ante accessiōē

Horae tres
a cibatio-
ne ad ac-
cessionem
suffi-
ciunt.

Ad sorbitiō-
nem
concedenda
sunt
horae
quinque
sex
aut etiam
septem

inuasit, cum lauisse manē liceat, cum cibus sit, ut
 quietet illa incommoda, quæ sequi docet Hipp. 4.
 acut. 29. ubi cibus incoctus in ventriculo accessio su-
 peruenerit, venter enim, inquit, calet, fastidit cibū,
 intenditur hypochondrium, iactatur corpus propter
 internam turbationem, mens fixa non est, do-
 let æger, lancinatur, vellicatur, vomere affectat, &
 si mala quomerit, dolet.

8571 810H
 0011210 E
 002 1 2 011
 011 00110 10
 Inaccessio-
 ne quando
 offerre ci-
 bū oport-
 erit, & in
 quibus.

35. Excipienda tamē ab hac regula, & horarū
 cibandi antē accessionē, & non offerendi alimentū
 aut in principio, aut antē principiū accessionis, ea
 corpora, quæ & calida, & sicca sunt tēperamento,
 & habitu gracili, quibus spiritus facillē dissoluū-
 tur, quæ ore ventriculi admodū sentiente, & in
 quibus acris humor, & mordax aduentriculū irā-
 fusus, & ægrū infestat, ut in ipsius etiam inuasionis
 initio, syncope inducta, vel etiā in simplicibus ter-
 tianis intermittētibz sæpenumero mortē indu-
 cat, in ijs enim antē inuasionem, vel in illius princi-
 pio cibandū censuit Gal. 10. meth. cap. 2. 3. 4. & 5.

Cibus qñ
 offerendus
 in princi-
 pio acces-
 sionum, &
 qñ paulo
 antē.

36. Adhibenda tamē ea est cautio, quod, si ani-
 mi deliquia in febriū initio supervenerint, affluē-
 te acris humore ad ventriculum, & os illius mor-
 dicante, cibus, vel in media, vel antē accessionem, vel
 in ipso principio eris exhibendus, ut admixta cibo
 bilis minus mordicare valeat: Si verò ex spirituum
 subtilitate exolutio sequatur, in principio febriū,
 nutriendi erunt ægi per duas, tresve horas cibus
 huiusmodi, qui citò instaurare possint spiritus, fa-
 cileq; commutari, ut sunt, oua sorbilia, iuscula, quæ
 instaurantia dicuntur, & similia, quibus adstringē-
 tis si non nihil addiderimus, ut succi granatorum,
 aurantiorum, aut similia, optimè illis cōsulum
 fore existimamus.

37. In acidis tamen, is in ysū ducēdis, illud ma- Acidōrum
ximē cauēdum existimo, ne nimio plūs limonum, ysus in fe-
succus, aut acidorū aurantiorū addatur, quod pas- brib. acu-
sim etiā a doctissimis viris fieri video, qui in acu- tis utilis,
tis, & malignis febribus in omnibus ferculis, & iu- sed mode-
sculis succi limonū quam plurimū adiungunt, non randus, &
animaduergentes tantā illi inesse acerbitatē, ut, si, quomodo
modū excedat, aut coctione nō tēperetur, quod in
syropo de limonibus, & de succo citri fit, aut sac-
chari mixtione non moderetur, obstructions in-
venis pariat inemendabiles, ideo moderate illo viē-
dū, in qua mēsurā si in ysū veniat, refrigerabit, &
incidet, aliūsq; medicatas portiones exercere faciet.
Aurantiorū succus aliquatō minorē habet austeri-
tatē, & propterea nō tāra liquoris mixtione indiget.

38. Victū omnem aut crassum, aut tenuem, aut, Victus
tenuissimū antiquos constituisse docuit Hipp. lib. nus in a-
de prisca medicina, nempe cū crassa comedimus, cutis quo-
cūm sorbemus, & cūm bibimus; quartū Gal. victus duplex an-
genus addidit, omnimodā cibi, & potus abstinen- tiquis, &
tiā 4. com. 1. aphor. quod extremē tenuissimū ap- q. recipiē-
pellant; quod si quis sorbentur, bifariā partiamur, dus, & qui
nēpe in tenuē, & crassam sorbitionē omnes victus excluden-
habebimus differentias. verū quatuor sunt, quæ dus.
acutē febricitantibus conueniunt: Crassa sorbitio,
de qua 1. acut. 26. est integra prissana, alica, panis
lotus siue contritus, siue concisus, & conculsa car-
niū. Tenuis sorbitio est, ut prissana colata, aut fer-
cula eadē tenuiora. Portiones sunt aut oximelanti
quo more paratū mīlta, si illatitius liquor ex car-
ne, iuscula cuiusq; generis. Aquæ verō frigida po-
tus, aut omnimoda abstinentia summē illū tenuis-
simum victū constituunt. Quæ omnes victus ratio-
nes, vltima excepta, vires augent, atq; instaurant,
quam-

quāvis aliquando inbecillitas vires reddere dici so-
leant, habito respectu ad corpora sanorum, qui si
illis victibus viderentur, ad marcorem ducerentur.
Nostris tamen temporibus victus ille extreme te-
nuissimus, & quatrigenarius in media aut ob con-
suetudinem, aut ob regione exterminari omnino
debet, ut porē periculi omnino plena, ex qua &
mors agris inducitur, & medicis infamie nota ma-
riatur, sed loco illius portiones induci debent, sicut
pus acetosus, vel de succo citri, cum stillatitio aliquo
liquore, aut lasecula aliterata, vel cremor hordei.

Vi^o cras-
sus in acu-
tis rejiciē-
dus, ut &
horarii fru-
ctus.

Hordeum
prō pū-
nā quale
eligendū

Hordeum
aliud sine
corrice,
crasso na-
tūre, aliud
vestitu.

39. Cauendum tamen ne transitus fiat ad victum
illum, qui extrahit vires febricitantiū con-
netur, ne scilicet quae comeduntur, suntq; solidio-
ra non liquida concedantur, ut panis, carnes, &
quod deterius est, horarii fructus, quod paucim ex-
tra hanc provinciam fieri videmus.

40. Cum nihil sit, quod in egrotantibus cibari-
dis, & apud antiquos, & apud recentiores antiquo-
res febricitantibus maxime recte victu institue-
res, magis in usum ducatur ipsa purissima hordea-
cel, optime consulti medicis in his meis cautioni-
bus practice censui, si aliqua hoc loco interposue-
ro de recta conficienda purissima ratione; de qua
etiam Gal. 1. de alim. facult. et 9. lib. de purissima
cap. 4. Orb. 4. collect. 1. 2. & 1. 1. & Paul. lib. 1. c. 730
Possimus cum adeo variare in ea scriptores anti-
quos videā, recentiorū autem aliquos doctissimos
etiam longe aberrare. In ea igitur, purissima sit in ele-
ctione hordei castus, quod cum hordeum sit du-
plex alterū quod sponte nudū nascitur 1. de alim.
facult. 1. 3. & lib. de attenuanti victu c. 61. quod in
Cappadocia nasci scribit, ut alicubi etiam apud nos
in sublimi altitum vestitum, quod magis commune

est,

est, postremū hoc eligi debet, de glubitū tamen,
& a cortice exutū, quāuis enim multi primo illo
potius vtendū censeant, ea fortē ducti ratione, qđ
cū Gal. arte cortice adimar, satius videatur spō-
re tali nato vii; sed non bono argumēto: Gal. n. il-
lud cū nouerit 1. de alim. facul. 1. cō tamen nō
vitur; quin specie ab alio differre asserit, fortēq;
enā facultate; Vnde Herod. Gal. antiquior apud
Oribasiū 1. collect. dicebat illud plurimū nutrire,
multū succū habere, & proximē ad tritici naturā
accedere, quibus rationibus minime in acutis cō-
uenire scribit, quē n. nimis multū nutriūt, quāq;
crassū, & glutinosū succū generāt, vt triticū, i acu-
tis febrib. minime cōuenire possūt. j. d. ali. fac. c. 4.

41. Sed qua arte preparandū sit, vt cū fructu si-
ne gāno in vsum duci possit, nō leuē requirit dili-
gētia, multa q; cauyōne indiget; farina aliqui vtū-
tur aquæ, aut iuri miscentes, & pultrē eformantes,
quā tanquā sterculentā, & excrementa multa produ-
centē omnino rejicit Gal. lib. de attenuāte victus
ratione c. 6. & 1. de rat. vict. in acut. c. 18. freso ali;
& fracto vitur. At reselluntur ij. ab eodem Gal.
lib. 1. de alim. facul. c. 9. & lib. de attenuante victu
c. 6. & 1. de rat. vict. in acutis. cap. 18, quod torri-
na faciat, hypochondria distendat, non leuis sit, nō
lubrica, quod deniq; crassus succos producat. Le-
uiter torrefaciunt alij, vt facilius externa tunica
spolia i possit, & stas exuere; At sic prissanā mi-
nus humectante reddunt, minusq; aptā alui sol-
uerē; colligitur id ex Herodoto referente Gal. 1.
de alim. facul. c. p. 13, prissanam ex Zea torrefa-
cta aluum cohibere asserente; Vnde Oribasius 4.
collect. cap. 7. ex Diocle, hordeum in polenta tor-
refactum alui cohibere asserit, quod confirmauit

Hordeum
quō parā-
dum **prō**
prissana

lib. 1. de
alim. facul.
c. 9. & lib.
de attenuante
victu c. 6.

•Galen. de alim. 9. quinihor. 1. 2. eiorde fixa om-
nia statū quidē deponunt, sed difficile coquuntur,
& adstringunt, crassumq; succum generant, quod
obseruans Trallianus lib. 8. c. 6. voluit in dysente-
ria hordeū torrerī, ne, si sine fritione vteremur,
aliū subduceret, non cohiberet. Brassanolus hor-
deum aqua saepius macerat, mox siccatur, & in mor-
tario ligneo illud contundens decorticat. At si pro
primo cortice expurgando id facit, non est, quod
aqua illud prius maceret, si pro secundo subtilio-
si, male facit, cū coctione sola eximatur. Gal. igitur
c. hordeū integrū leui manu corusum, & hoc
modo decorticatū, atq; mox panno aspero perfric-
atum vt reliquum corticis, si quid reliquum est,
quod verissimile est, non leuē, etum, tolli possit.

Hordei
quantitas
ad aquam
pro ptissa
na paran-
da.

41. Cautio autē in quantitate hordei ad aquā,
& aquae ad hordeū in preparatione ptissanae ma-
ximae est adhibenda, cum varia si de his apud gra-
uissimos etiam scriptores sententiae alijs pro singu-
la hordei hemina decem aquae admiscensibus, vt
Dioscorides apud Oribasium 4. collect. 7. censuit, quā
quantitatem secutus est Constantinus Celsus lib. 1.
de re rust. 9. Antyllus vero eodē Oribasio referen-
te 4. collect. 11. pro singula hordei hemina quin-
decim aquae adhibet, quā sententia secutus est Pau-
lus lib. 1. c. 73. Brassanolus autem 1. de rat. vict. in
acut. 18. Pro singula hordei hemina triginta, &
trigintaquinque aquae miscebat. Galen. autem 1. de
alim. facul. 3. & 10. & lib. de ptissana nullam quan-
tatis aquae, aut eiusdem proportionis ad hordeū
meminit. Neque verō id praeter rationem, sed iu-
re merito, quod obseruasset hordeum pro varie-
tate sollicitū facilius coqui, aliud difficilius, vt do-
cebat, p. 1. lib. de cibis bonis, & malis succi, c. 9.

sum

cū etiā pro varietate naturę illius grani, & ut passim
in ciceribus excoquendis obseruamus, sed & aquę
non leuis habēda est ratio, cū aliā grana, & cerea-
lia omnia facillimē cōficere obseruauerimus, aliā
difficillimē, ut docuimus lib. 2. com. in lib. de aere,
aquis, & loci Hipp. Si tamen eius generis assuma-
mus, quod intumescat, & coquatur facili, apud
nos Insubres pro singula hemina illius quindecim,
aut viginti aquę assumere poterimus, quę
quantitatis aquę varietas erit pro varia conditio-
ne hordei, & aquę.

42. Sed in ptissanę preparatione quid obserua-
dū, & in condienda quid cādendū? sanē Gal. oleū,
& acētū addidit, & salē, illa quidē lib. de alim. facul.
9. 7. tuenda valet. 4. & 3. eiusdē 8. lib. de marore
vlt. 7. Meth. med. 6. 8. eiusdē 1. & 10. meth. 1. 11.
Orib. 4. collect. 1. & Paulus lib. 1. c. 88. salē etiā in-
dendū constat ex 1. alim. 9. & Orib. & Paul. loc. cit.
Sed quo tēpore hæc addenda? Galen. 1. de alim. 9.
acētū indendū cēruit, cū ad summū intumuerit
hordeū, deinde etiā permittendū, ut lento igne in
succū dissoluatur, tū addendū: salē autē addi vo-
luit paulō ante tēpus dissoluendę ptissanę: oleū
addebat pro condimento; nos quibus placherit,
concedemus. Placet tamen potius, ut ex iure opti-
mo carniū pareretur, siue integrę pareretur, siue cola-
te addita aut leui portione salis, aut sacchari pau-
xillum plus, pauxillum enim mellis addebat ptis-
sane, viuenda valet. 8. cuius loco prestabit saccha-
rū addere: aliquatō plus illius etiā addentes, si ace-
ti non nihil admisceatur, prohibemus enim admix-
tionē illius, ne saccharū in bilem vertatur, quod si
quis aceti vsum refugiat, fietbit locustilius aut suc-
cus aurantiorum, aut citri, aut etiam limonū in-

aliorum
2120. 11
10. 11. 11. 11
11. 11. 11. 11

Pro ptissa
na cōdic-
da, quę ad-
denda, &
quomo-
do.

11. 11. 11. 11
11. 11. 11. 11
11. 11. 11. 11
11. 11. 11. 11

brū glutinosa aliqua ad sint, multo tamē pauciora sunt, atq; ex parte etiā auferri possūt. Quod si quis piam gallinarū, aut caponum ius expetat, cautionem hanc adhibeat, vt alarum duarū extremæ iuncturæ auferantur, & coxarum vltima pars; quod si cute etiā pullum spoliare poterimus, salubriorē cibum, & potum proculdubio parabimus.

46. Sedentes in lecto alantur, si natiacientes cibū capiant, vix ad vētriculi fundum cibum effundēt; deinde à cibo sumpto semihoram sedeant, vel saltem erecti aliquantulum semiaceant.

47. Antē cibū memores sint expurgationis oris: nā à febre plurimi vapores, & fuligines fursū feruntur, q̄ limū quendā in lingua eformāt, qui cū gustū perturbet, cibos ēt malā qualitate imbuit; quare & lingua, & os colluendū, & œsophagus, q̄ sepe per febres arefcit, madore à liquo rigandus, cui maxime inferuit aqua etiam cruda ex aceto, & saccharo.

48. De potu aquæ in febribus pro potu quotidiano, nō pro medicamento, hæc sit observatio si in ægrum inciderimus, qui in sanitate assuetus sit aquæ potui, etiam citrà noxam posse nos yuq; per crudā optimā, aut fontanā, aut pluuiālē cisterninā cōcedere; aut certe decoctā simplicem, si minus assuetus potui aquæ æger fuerit, ne in ea incōmoda incidat, de quibus Hipp. 14. de rat. vict. in acut. aliquid addi licebit, quò facilius ex hypochondrijs meēt, cruditas reprimatur, atq; etiā morbo, si fieri possit, morbificæ causæ aduersentur; vt si mel, aut saccharum, cinnamomū, anisum, semen coriandrorum, aut hordeū incoquerimus.

49. De aqua hordei, quæ potū antiquis ignotū pleriq; cōser, q̄ nullibi Gal. Or. Paul. Erius, & alij illius mētionem fecerint, itā cōseruātip. 3. de rat. vict.

Quæ si rū tenere debeat, dū clbantur.

Os ablucendum ante-quā cibus assumatur.

Potus acutorum qualis.

Aquā non coctā potesse potus in acutis.

Aqua hor-
dei in acu-
tis pro po-
tu optima

videtur in aphor. 13. & 4. de ratione victus 71. potissimum
autē lib. 2. de morbis, vbi laborantibus corpore ca-
pitis propinanda censet aquā hordeaceā de ea mē-
tionē fecisse; vbi etiā intelligere nō potest succum
hordei, quia illiob subiungit, nā prò alimento suc-
cū hordei exhibeo: venec in alijs duobus locis; cū
potum aquam hordeaceā appeller, succū autē hor-
dei passim non potū; sed forbitionē appellat: Neq;
verò reiicienda est potissimum in febribus exure-
tibus, quod flatulenta sit; si. n. rectē excoquatur;
flatulentia exiit; neq; si diutius excoquatur false-
dinem cōtrahit; quod ab alijs obijciunt; si enim in
pristana, quā longiori tēpore elixatur, id non ve-
riti sunt Hipp. & Gal. nec experientia id ostendit,
in qua magis hoc sequi deberet ob hordei maiore
ad aquā proportionē, & quantitatem; quā ob cras-
sitiam falsedo in elixatione longa contrahi debe-
ret; cū id in aqua hordei omninō aquosa, & potu
veteratur. Cautio tamen est adhibenda, ne ea in
omnibus morbis, aut in omnibus febribus in vsum
ducatur, vt alijs fieri solebat, sed in ijs solū, in qui-
bus magnus æstus fuerit, vt vbi absterisione opus
est. At verò in ea conficienda magna adhibēda est
cautio. Accipio hordei veri, non speltæ, seu zæ, vt
pleriq; faciunt libram vnā duodecim vnciarum,
maceretur in illam in aqua, mox panno admodū
aspero optime cōfricetur, donec omnis arista de-
ciderit, & quippiā etiā ipsius cornicis cassi sit de-
tersum, deinde optime abluatur, & omni sorditie
expurgata addantur aquæ libræ quadraginta, &
tandē rursus igne decoquatur, donēc optime hor-
dei succo fuerit, mox deposito de igne decocto,
per micturū perfrigerari, deinde transfundatur
in vā perfusum esse, ac valde clarū decoctū in vas
vitreum,

Aqua hor-
dei in om-
nibus mor-
bis non
conuenit.
Aqua hor-
dei quo-
modo pa-
randa.

vitæum, in quo si quippiam iterum refederis, do-
nò in alterum vas transfundatur; quod perspicu-
um est; & relinquendum, donec resideat; quod
pro potu in usum ducl poterit.

¶ In melle melieratuz cõpositione maxima
adhibenda est canis: vel. n. mulsam paramus pro
medicamento, aut salte cibo medicato, aut pro po-
tu pro medicamento, aut cibo medicato, vel eru-
ditit, vel cocta Gal. 3. de alim. facul. 39. & r. 1.
meth. cap. 3. ctuda magis alim. subducit, minus
nutrit: contra aut cocta; quinimò etiã coctam
aliã integrẽ coctẽ sunt; aliã imperfectẽ; quẽ effi-
magis, & minus & mueriunt, & deijciunt; prout ma-
gis, aut minus coctionẽ susceperint, vtramq; etiã
hanc aut meratiorẽ coctuit, aut dilutiorẽ Hipp.
3. de rat. vict. in acut. 13. immò Gal. 8. meth.
med. 4. in meratissimã, mediocrẽ, & dilutam diui-
dit; sed quãtã est mellis ad aquã, quibus duobus
solis coctat mulla, omninò proportio? censent ali-
q. meratissimã esse ex vna mellis, & duabus aqua;
sic censuit Auic. lib. 7. & Discor. mediocrẽ ex vna
mellis, & quatuor aqua ex 4. de tuend. val. c. 6. Di-
luta autẽ ex vna mellis, & octo aqua facta ebulli-
tiones, & despumatis extremis, donec supernatet
ex Paulo lib. 1. ca. 46. sic Mesues, & Rasis 9. ad Al.
maiorẽ, sed ante hos omnes Oribal. 4. synopsis
cap. 38. hæc comuniõr est recentiorũ opinio. Ego
verò, vt verissimã hæc esse opinionẽ censeo in mel-
lifero pro cibo simplici, seu medicato, nã falsam
existimo, si mulsã sanamus pro potu ad distribu-
tionẽ cibi parando. Quin censeo diluta illã de qua
3. de ratione victus. 13. mentionem facit, eam esse
posse, de qua Gal. 3. de rat. vict. i. acut. 43. vbi dicit,
mulsam dilutam fieri, vbi Paucillum mellis multæ
aque

Mulla di-
uisio & pa-
randi ra-
tio.

213

aqua admiscetur, & aqua per se, & queat ad distributionem, ne diuina hypochondrijs commoretur, hoc enim munus est potus, & potus, non & cibus, quā fortasse diuersam à diluta, de qua 8. meth. meruimus credere poterimus, q. diluta illa, in qua cibus esse poteris, ex vna mellis, & octo aquæ: At q. diluta est pro potu, ad distributionem cibi diluta, magis esse debet, q. vi vna sit mellis ad octo aquæ, neque enim paucillū mellis vna est, vncia ad octo. Erit igitur mulla, pro potu si, p. vncia vna mellis viginti vnciarum aquæ tumatur paulo plus, aut minus: neq. n. determinata aqua, quā has certo p. scribi p. r, vi ē Gal. videmus fecisse 3. acut. 13. 3. de alim. facul. 39. 8. meth. 6. 4. qui nullibi quantitas mellis ad aquā, memoratur, q. mellis videmus esse magnā differētiā, cū sciamus aliud esse bonū, aliud malū, 3. acut. 23. & 4. de tuēd. yal. 6. bonū & letitiam conquirunt, & celestissime desinit spumā facere, inde minus aquæ absumitur in coctione. Contra, quē in malo, & propterea in eo coquendo maior induenda, erit aquæ copia, q. absumi possit, q. in bono, qd ex philagrio colligitur, qui referē. Orisbas. 5. collect. c. 17. in cofectione napo mellis, si mel crassum esset, plus aquæ addi soluit, si tenuius minus, si medium medio modo. Vbi etiam obseruandum est, si aqua fortē crassior fuerit, ut apud nos Infubres putalis esse solet, quæ in mellificati cofectione sumitur, & optimū mel indatur, cū p. 3. aqua, vi et regitur, & longiori cōstat elixatione, mel versū illud pauca, antequā illi mel indatur aliquantisper esse elixandum: sic enim, & attenuabitur, & in sese mellis substantiam recipiet, faciliusque hypochondria permeabit.

151. Sed cū iā saccharū antiquis incognitū, salū perfectū nostrū in vltimū medicū, & inter delicias

15. mullum
29. 8. o. m.
- 27. ibid.
. 07

Mulla ex
saccharo
optima
quomodo
paretur.

supra

gustus

gustis fit radactū, an ex eo nulla parari poterit? Vtq; & optima, cū non tāta polleat acrimonia, vt mel, immo in biliosis vtilior erit, & suauior. Censurali qui nō nisi crūdā melleū ex zuecharo parari possit colliquatione, q̄ si saccharū coctū sit. Ego vero, & crūdā colliquatione parari posse crediderim, sed p̄tatiore esse coctū, quia p̄ coctionē aqua p̄ficet attenuata aqua, & melius p̄ hypochōdria p̄ficabile v̄ ignis ambob⁹ attenuatis. Vtū ea adhibeat cātio, vt prius aqua elixetur, q̄ illi indac saccharū, & in minori quantitate, ita vt sēpē p̄ vicia sacchari libra agnē sufficiat, potissimum si affectus nōn admodum cōtuans fuerit, in quo casu succilimonum nonnihil in coctione addi poterit.

52. Oximel, & syrūpus acetosus ad pensum veniāt, qui & pro potu ad sedanda sitim, & pro cibo in peracutis febribus, & pro medicata potione in vsū medicū saepenumēro v̄ntun̄t. In triplici sūt differētia pro vario vsu: vel. n. sunt valde acidi, vel mediocriter, vel minimū: de L. Hipp. 3. acut. 26. de 2. 3. acut. 30. de 3. 3. acut. 27. locutus est. De tribus ijs oībus Gal. 4. de tuend. val. 6. docens illorū mixtionem ex aceto, melle, & aqua; aut zuecharo loco mellis in syr. acetoso: Minimē acidū fieri afferens ex vna parte aceti, duabus mellis, aut sacchari, & octo aqua. Medius ex vna aceti, duabus mellis, & quatuor aqua. Valde acidū ex duab⁹ aceti, & mellis, & quatuor aqua. Gal. fecit uselt Oribas. 5. toll. 24. Paulus solius acris meminit lib. 7. c. 11. Mesues solius mediocris meminit, cōpositionēq; tradidit, sed animaduertendū multū in coctura a grēcis differre. Gal. n. ad quirtā, aut tertā ex cōq; debere dicit. Pleriq; ita intelligēdū cēsēnt, donec romaneat tertia, aut quarta pars, q̄b⁹ subscribere v̄ Mesues;

Oximellis
parandi ra
tio.

de semina
monstrat
q̄ v̄ntun̄t
q̄ v̄ntun̄t
q̄ v̄ntun̄t
q̄ v̄ntun̄t
q̄ v̄ntun̄t

38. LVDOVICI SEPTALII MEDIOL.

qui ferè hoc modo excoquit, vt per totū forte an-
nū conseruetur, quod etiā pēs seplasiarū faciunt.
Verū illud vetustissimū est censu, ille græcos solā ter-
tiā, aut quartā partē esse absumēdā: docuit, n. Gal-
oximel esse temperandū, vt vinū ibidē, cum autē
vinū nunquā meracum biberetur, sed tēperatum,
vt colligitur ex Plinio 14. naturalis hist. cap. vii. &
lib. 23. cap. 1. & hoc ipsū vario modo tēperaretur,
aut pari aq̃e cū vino quantitate assūpta; aut plus
aq̃e addentib. & hoc triplici modo, aut duabus
vini tres aq̃e, aut vni vini duas aq̃e; aut deniq;
vni vini tres aq̃e addentib. vt docuit Plut. 3. quæ-
synopsesc. 9. Athenēus lib. 10. c. 8. & 9. Si igitur
oximel vt vinū tēperari debebat, nunquā ad duas
tertiās, aut ad tres ex quatuor excoqui potest, a no-
qui nō modò dupla, aut tripla ad mel erit, sed tri-
plo, aut quatruplō à melle superabitur quoniā mel
lis quatruplō minus aqua ob crassitiē, & visciditatē
absumitur. Exēplo sint vna acci, duæ mellis, qua-
tuor aq̃e vnciæ in quartā redigantur, erūt vna vnci-
cia cū dimidia; sicq; tota aut penē tota erit mel, si
ad tertiam, erūt reliquæ duæ vnciæ, quarū vna cum
dimidia erit mel, media vncia erit aqua, & acciū;
nō igitur tēperatura simile erit vino; q; si vnica ex
quatuor, aut vna ex tribus absumatur, optimē tēpe-
ramēto vini correspondebit; quod si leuissima fiat
decoctio, cū aqua vis aceti, & in sapore, & in odo-
re cum melle relinquetur. Quod si tandiū coque-
retur, mulla fieret meracissima, quæ solū in ex-
trinsecis erat in vsu, non per interna 8. meth. 4. 101
3. 5. Animaduertendum præterea pharmacopo-
las, vt diutius oximel, aut syr. acetosum conserua-
re possint ex decreto Mesuri prius aquam, & mel
vsque adro excoquere, donec tota aqua, aut penē
vni;

Oximel se-
plasiariorū
diuersū à
Galenico
quomodo
paretur.

uniuersa absumpta fuerit, mox acetum addere, & iterum coquere, omnino quod aquæ reliquum est absumentes, sicque oximel non fieri ex aceto, & mulla. Vbi obseruandum oximel hoc ita pararum pro potu nuttiente in usum duci non posse, est. n. potius sorbitio, quàm potus.

54. Cauendum præterea ne medici cōmuni nostro oximelite vāntur ad humectandum; cū ex siccati potius facultate cōstet, cū aqua ea creat, in vsū tamen etiā hoc nostrū ducitur, quod diluator, si quidumq; & fluxile reddatur quadrupla ferè parte aquæ, aut stillatitiæ, aut decocti alicuius addita.

55. Obseruandum præterea in Pleuritide, vbi crassi sunt, & viscidī humores oximel nostrum imbecillius esse: quod sit illud mediocre: cū in eo casu valde acri vtēdum docuerit Hipp. 3. acut. 26.

56. Obseruādum præterea, si per totum morbi decursū vtendū sit oximelite, aut syr. acetoso, neq; acriori, neq; mediocri esse vtendum in acutis febribus, quod non humectet, potissimū nostrū ita pararum; sed docet Hipp. 3. acut. 37. vtendum esse eo, in quo minimum aceti sit admixtum, vt multū possit humectare, nec in reſtinis noxam inferre.

37. Cauendum præterea ne in oximelitis, aut syr. acetosi compositione acetum illud acerrimum sumatur, aut ex vino cretico, vel alio potenti confectum; nam in acutis febribus, in quibus præter facultatem obstructions tollendī, abstergēdi, & incidendi requirimus, & humectationem, & refrigerationē, potius siccare solet, & excalescere quàm humectare; aut si tale acetū in usum ducatur, aquæ quantitas erit augenda; & tunc fortasse controuersia in verbis Gal. tolli posset; cū 4. de val. Tuend. 6. voluerit ex vna aceti, & duabus mellis fieri oximel

Oximel nostrum non humectat.

Oximel nostrum imbecille ad crassa incidenda.

Oximel nostrū in acutis non ita accomodatū.

Acetū pro oximelite nō fit acerrimū, neq; ell vinopotentissimo.

mel médiocre: acerrimū verò ex quolibet aceti,
 & mellis partibus: cū in cōsilio pro puerō Epilepti-
 co acidissimū oximel ex vna aceti, & quatuor mel-
 lis velit cōfici: Minimè acidū ex vna aceti, & octo
 mellis. Nisi cū doctissimō Cigalino dixerimus li-
 bellū illū esse quidē Gal. sed multis in locis deprauatū.
 Potissimū cū oximel ex fauis cōfici ibi tradi-
 derit; cuius oppositū docuit, & 4. de val. tuend. 6. &
 2. de fract. 29. q. si ex fauis quis dixerit docuisse cō-
 ficiēdū Gal. lib. de Ther. ad Pāphr. oximel, is sciat
 lib. illū Gal. nō esse, q. vel indē colligitur, q. diuer-
 so modo cōposuerit ibi Theriacā, ac lib. de Then-
 ad Pisonē, ac lib. de Antid. Deindē cōstat cōsiliū
 illud pro puerō Epileptico esse deprauatū, q. dies
 canicular res constituat quadraginta, viginti ante
 exortū caniculæ, & viginti post; quod Gale. repu-
 gnat, & græcis simbl, ac latinis omnibus scriptori-
 bus, caniculares dies ab exortu huius sideris incho-
 antibus, vt lōgioratione, & in com. lib. Hipp. de
 aerē, q. stocis. & in com. in Probl. Arist. docuimus.
 Colligitur tertio mēdosū esse libellū illum ex eo,
 quod pueris Epilepticis apium cōcedendū, petro-
 selinū abdicādum censeat, q. petroselinū laedat epi-
 lepsia correptos; cū oppositū reperiamus apud oēs
 scriptores apium epilepticis obesse nulla facta pe-
 troselini mentione: sic Plin. lib. 20. ca. 11. sic Alex.
 Trall. lib. 1. cap. 17. sic Auic. lib. 2. tract. 2. cap. 36. sic
 Serāpio lib. simpl. cap. 290. & Mesue in sua praxi
 cap. 26. de dolore capitis: nisi dixerimus corrigē-
 dum esse locum illum in cōsilio epileptico, vt loco
 mellis partes octo, legamus aquæ partes octo: sic
 enim conueniet cum loco 4. de Tuenid. val. cap. 6.
 38. Cū in vino concedendo in febribus, & po-
 tissimū in acutis, tantū quod contrones sic excitetur

Imitatio
 amulio
 amulio

Imitatio
 amulio
 amulio

Imitatio
 amulio
 amulio

Imitatio
 amulio
 amulio

Vinū febricitantibus acutè interdiciendū per se.

Lm

tur

ut ob varios Hipp. & Gale. locos inter se contrarios, de quorū conciliatione, eadēq; controuersia quid sentiendū sit alibi à nobis cōstitutū est, nēpē nūquā ratione morbi esse concedēdū, aliquādō verò ratione causæ & symptomatū, tūm etiā eorū, quæ secundū naturā dicuntur, & virium: qm̄ autē alicubi concedi passim intelligo, vt in agro Neapolitano, & fortasse frequentius q̄ debeat, atq; non apparentibus signis cōctionis æstuantēq; agrotante, quānī felici successu ipsi viderint; nos Insu- bres laborantibus febre acuta, & maligna omninō vinū interdici mus, quod adeō felici successu sit, vt ex viginti laborātib; maligna febre cum maculis vix vnus intereat, nisi fortē, quod rarissime eu- nit, ratione virium aliquando concedatur.

§9 Cauendum tamen, quantum maxime possu- mus, ne in nostris his regionibus vinum conceda- mus, etiam si cōctionis signa appareant; videmus enim plerosque ex quauis vini concessione quan- tūmuis minima in deterius labi; atque denuō ma- teriam recrudescere: quod cum sæpē, ac sæpius cōsiderassem, videremq; antiquos adeō frequen- ter vinum in febribus concessisse non solum ratio- ne virium vitalium, aut symptomatum, sed etiam ad adiuvandā cōctionem materiæ morbificę, at- que ad promouendā illius per lotium euacuatiō- nem, vt videre est r. meth. med. 9. & 1. ad Glau- c. in curanda tertiana, & quartana febre; tūm ad spu- rum facilitandū, vt 1. acut. 22. 3. acut. 1. & 4. acut. 37. non aliam horum apud nos infeliciū euētiū ex vini exhibitione causam esse coniecraui, quam vinorū nostratiū conditionē. Rubra, & nigra opti- ma multa sunt, quæ primis mēribus, & austera, & crassa, sed min⁹ apta ad febres, qd nec viinas pro-
mo-
ueant,

Vinū in a-
cutis cur
aliquando
cōcedatur

Vinū nū-
quā ne ap-
parētibus
quidem si-
gnis co-
ctionis a-
pud Insu-
bres cōce-
dēdum, &
cur.

ueant, nec spurum faciliunt. Quæ alba sunt, aut flaua, aut sunt potentia, aut imbecilla; potentia quoniam maxime alba expectatur à nostris in aperto vase, vbi compressis viuis reponuntur, vt simul ebulliant, non permittuntur tandiù firmari, quandiù oporteret, vt debitâ coctione in se conciperent, & id, vt albo colore oculis, austero sapore, quæ picanter vocant, palato gratificentur, hinc & austeritate coctionis officiunt, obstructions excitant, neq; vrinæ promouent, neq; spumæ adiuuant, præterea vero caput petunt quàm maxime igneis partibus validè in ipso contentis ob terrestres partes admixtas. Vnde etiam primis mēsis gratissima palato esse solent, si dulcedinis aliquid retinuerint, subausteris partibus cum dulcibus duplici sapore gustui ablandientibus. Imbecilla vero, & tenuia alba huiusmodi sunt, vt nunquam maturecant, nisi maximo æstatis calore superueniente, & ne tunc quidē austera partes omnino coctione euincuntur; sicq; minùs apta erunt, & vires instaurare. & lotia promouere: quod etiam incommodum alterum excipit, quod, vbi quasi maturuerint, austeritatem quæ deposuerint, aut statim serè acecant, aut euanida reddantur, aut corruptionem contrahant, vnde ad vsum inepta redduntur. Euitandus igitur quæ maxime apud nos in febribus putridis maxime in acutis, potissimum in malignis, & etiam magis in internis inflammationibus, vt in Pleuritide, vini vsus; & si in vsum duci debet, potentius potius eligatur, quod multa aqua diluatur.

69. Cautio præterea in bibendo adhibenda est in febribus potissimum æstuantibus, quam docuit Aristoteles 1. problem. 36. vt sæpè, & paulatim aquam, & alios potus frigidos ad sedandam sitim illam

Bibenda sæpè, & paulatim aqua in febribus æstuantibus non affirmari & conferri.

illā ex calore febrili excitatā cōcessos assumā f: Potio. n. multa, & confestim assumpta nec exsiccatas partes humectat, quibus ætus, & siccitas inest, cū statim præterfluat, nec sitim sedat: at si sæpius data fuerit, & paulatim pitissando hauriatur. os ventriculi, æsophagum, linguam, & palatū, dū sē sim per eas transit, refrigerat, & humectat aliqua ex parte parietibus, & tunicis adhærens; quin & paulatim se se insinuans in carnes conscēdit, & venulas exsiccatas madefaciendo, & irrorādo humectat. Quod aptissimo exēplo docet; si enim multa aqua, & cōfestim aut decidat, maximè si sicca sit, in terram, aut aliundē per cauū corruetur, superficiem terræ non permeat, sed præterfluit, nullam noxā ducens; at si paulatim aut decidat, aut deducatur, superficiē paulatim madefaciens, & oclusos poros aperiens viam subsequenti ad penetrationem parat. Id verò intellegendum est de aqua in potum assumpta ad sitim sedandam: non verò de ea, quæ in multa, quantitate assumpta ad extinguendam febrem ardentem assumitur, quæ & multa, & assatim est assumenda; sed de hac re in com. nostris in Probl. illud: quidquid dicat aduersus Aristotelem Hieremias Triuerius in lib. Hipp. de victu idiotarum.

61 Quamuis somnus in accessionum febrium, Somnus
omnium principijs consensu omnium medicorū, aliquando
& multis rationibus id persuadentibus sit fugien- in princi-
dus, animaduertendum tamen aliquos reperiri, pio acces-
qui adeo sensu exquisito in musculis, & carnosis sionū con-
partibus sunt, ut superueniente effusione materie- cedendus,
rum acrium ad illas partes, vade rigorem illū cō- & quādo.
cussium fieri medici omnes profitentur, tantis, tā
que magnis doloribus conficiantur, ut vitales vi-
res prosternantur, & mors sæpenumero subsequa-

tur, in ijs non solum in principio somnus est auertendus, sed potius omni ingenio procurandus, vt sensus ille exquisitus retundatur, aut sopiatur, vigorque, & dolor initior reddatur.

Sonus immoderatus in acutis quādo permittendus.

62. Somnus in febribus potissimū acutis si modū exceſſerit, licet maiori ex parte malo egrotantibus cedat, & propterea sit euincendus, quoniā tamē, vt omnes alias à natura factas euacuationes cohibet, ita eā, quæ per sudorē fit, omnino pmouet, si in fine status vniuersalis febris, aut in declinatione superuenerit, etiā si tēpote modū exceſſerit, ita vt decē, aut etiā plures horas perduret, non est impediendus, potissimū si indicatoria die imminere crīsim per sudores cōmonstratū sit: fit enim sæpe numero, vt promotis per longū illū somnū sudoribus ex vniuerso corpore, & ex illō sōno instaurata natura, & morbus soluatur, & eger conualeſcat: cognoscemus autē ex signis præſentibus bono cessurū huiusmodi somnū longū, si sine stertore sit, si lenis, si deniq; illum non imitetur, qua in lethargo, comitosisue affectibus passim conspicitur: Videmus .n. aliquando excitatos egrotantes huiusmodi etiā medicorum consilio impeditos in huiusmodi euacuatione recidiuam fecisse. Propterea cauti maxime in hac re medici esse debent.

Aer frigidus febricitantibus acutē quō cōcedendus.

63. In aere frigido admittendo in acutis, & æstuantibus febribus hæc adhibeatur cautio. Vt prò viribus frigidus quidem aer ambiens in cubiculum admittatur, & procuretur, vt omnino & inspirari possit, & interna viscera æstuantia refrigerare, & faciei oblectamentum hoc afferre: reliquo autem corpori ne nudo obueniat omnino cauendum; quā ne etiā nimis tenui stragula, ac peruia operto: circumuersante enim aere ambien-

te frigido, aut flatu, & calidus vapor, exalatione, quæ foràs per sensum effugientem euacuationem promouebatur, ad interiora repelletur, & pori cutis peruij fortasse adstringentur, & internus feruor adaugebitur: imminuenda quidem in augmento, & magis in statu erunt coopetimenta, vt æstus illo imminuatur per vniuersum, & natura instauretur à tanto labore, at sensim id fiat, neque eò vsque, vt illa incommoda sequi possint.

64 Non placet tamen eorum consuetudo, qui quasi ægris vim inferentes plùs nimio coopertos, & stragulis obuolutos tenent, sic & transpirabile magis corpus reddere censentes posse, & sudores promouere; cum alioqui illud nimium effluxum spirituum efficiat, & subinde vires imbecilles reddat; hoc autem violentiam naturæ inferat, & aut crudum humorem extrahat, aut qui per alias partes exitum sibi quærebat, ad cutim vi quadam natura repugnante attrahatur.

Nō nimis
cooperti-
di stragu-
lis acutè
febricitan-
tes.



¹⁶
L V D O V I C I
S E P T A L I I
M E D I O L A N E N S I S .

A N I M A D V E R S I O N V M ,
& cautionum Medicarum ,
Liber Tertius, eas com-
prehendens .

Quæ ad Pharmaceuticum negotium pertinent .

Medica
materia
mutanda .



Vamuis tanquã verissima sit Hipp.
sententia 2. aphor. 52. omnia se-
cundum rationem facienti, si non
succedat secundum rationem non
est transeundum ad aliud, stante
eo, quod à principio visum est. Cauendum ta-
men ne diutius in eadem materia medica insisti-
mus, potissimum si in alterantibus versemur; sit
enim sæpenumero, vt, dum longo tempore eo-
dem remedio vtimur, natura illi assueta ita illud
in alimentum vertat, vt morbificam causam cui-
cere non valeat, potissimum si alexipharmacum
sit, peculiarique qualitate agat: immutanda igitur
erit materia præsidij, & quantitas etiam, quæ
adeò certa præscribi non potest: Hac enim ratio-
ne, & existimationi nostræ consulemus, & ægros
obsequentes magis habebimus; ne tamen id fre-
quentius fiat, ne ignorantix notam per incostan-
tiam subeamus.

In

1 In purgandis humoribus per medicamentū, siue leniens, siue soluens, vt multa sunt à medico, & animaduertenda, & præcauēda, ita huic nostro Cautionū libro minimè inferenda, quòd regulæ, & canones illi uon nisi cautiones omnes sunt, quibus medicum iam benè institutū supponimus; ne igitur in immensum crescat liber, solū cum Hipp. in fragmento lib. de medic. purgantibus illud admonebo: debere medicum præscripturum pharmacum, quod sursum, vel deorsum purgat, prius interrogare, num aliàs pharmacum purgās hauserit; & num alius ex purgatorijs deorsum facile se soluat, ac citò obediat, vel potius dura sit: hæc enim erit cautio purgatoria in metu hypercatharsecos, vt naturam peculiarem cognoscat ægrotantis, cum nullis notis idiosyncrasia cognosci possit; quam si cognoscere potuisset Gal. se æqualem. Esculapio censuisset: adeò enim aliqui faciles ad solutionē sunt & vt vel primo pharmacorū odore trepidant, atq; in fluxum soluantur; alij ita durialui sunt, vt vix vllis remedijs alius respondeat; sic enim aut mollioribus, & leuioribus, aut valentioribus vri poterit.

2 At si nunquā pharmacorum aluū subducen-
tū vsum se inijsse affirmet; tum demū exquirē-
dum, num, dum sanus esset, officij memor alius
fuerit: pò conditione rerū assumptarū, & nū à
pleniori cibo se in fluxum effundere alius soleat;
sic. n. tutius ægrotanti consilire poterit medicus.

3 In lenientium medicamentorū vsu; cū videat
medicos adeò dissidentes, & in quantitate, & in
hora exhibitionis, & in intervallo ab exhibitione
ad cibum, concedentibus aliquibus pura succi cas-
siae ad minus vnicuique, tum, & sequentiā, vel ele-

Purgādū
ægrum in-
terrogare
expedit
quomodo
alias se
gesserit.

Purgandū
interroga-
re oportet an lu-
bricæ sit
aluus.

Lenientiu
vltus utilis
in princ.
pio mor-
borum.

Quarj lenitui, vel diaprui per horā ante cibū, & hunc potius matutinū, quā vespertinū, vt somnum fugiant, quem post medicinas imbecillas fugiendum auctoritate magnorum vicerū omnino probant, vel ea ratione, quod per somnū, & euacuationes per secessum impediuntur, & medicamentū naturæ adeo familiare alimenti naturam subeat; quod in Italis medicis Franciscus Valleriola 2. enarrat. c. 5. maximè reprehendit: Negātibus alijs, aut hæc in principio morborū esse concedenda, aut sanè admodum rarò, in quo numero Mercurialem nostrū esse video. Ego de hac re itā censeo: In febrium omnium, & aliorum quoq; morborū curatione maiori ex parte ab initio lenitiū vsum conuenire, & vt excrementa, & in vētriculo contenta, & in vicinis partibus euacuetur, & vt cōmodius, securiusq; incidentia, tenuantia, & abstergētia auxilia in vsum duci possint sine periculo, ne crudi succi ad intimiores partes ducatur.

**Lenientia
qua quan
titate, &
qua hora
exhibēd,
distinctio**

5. Qua verò quantitate, distantia à cibo, & quo tēpore? Sanè nisi cautio adhibeatur, & distinctio, in errore versabimur: Aut enim in principio morbi ad præscriptum vsum exhibentur, aut progressu morbi, vt alius aliqua deiiciat in dies, cum enemata, quod aut tenuuntur, aut lædunt, aut nihil subducunt, aut alia causa in vsum venire nequeūt: si p̄ primā occasionē, & ad vnciā, & ad sesquiunciam concedi debent, & aliquanto tempore ante cibum, & potius matutinum, quā vespertinum, tempus eligi debet, nisi aliter accessio febrilis persuadeat. Colligitur id ex Gal. 2. de alim. facul. c. 31. de moris, mox etiam de prunis agente ubi ait: Alnum pruna mouent præsertim si prandium non statim, sed aliquanto post intervallo in-

choe

choetur; & ipsa sola comedantur: hæc enim cōmunia omniū laxantiū præcepta meminisse oportet; ut n. per se inexistencia excrementa subducant, sine cibo per se cōcedi debent; ne verò, cum naturæ ea familiaria sint, in alimentū vertantur, non multò post cibus est illis concedendus; ne vero somnū interrumpant, dū alium ad excretionem mouent, quod post quatuor, aut sex horas fieri solet; potius ante prandium erit exhibendum, quod: si ad excrementa, quæ in intestinis aggregantur ex quotidiano cibo, subducenda exhibeatur, cum id sæpius sit præstandum, multò minor copia illorum erit cōcedenda, puta semuncia, aut etiā dracmę dūc in molli aluo, & facili solubili, & ea quidē immēdiatē a cibū, vel cū cibo ipso, & potius cū cēna, quàm cū prandio: sic enim cibus ē molliēs, & lubricans redditur; & ferculū illud liquidū, aut iusculū medicamentosam, induit qualitatē lubricantē; & selecta à naturæ parte nutriente, reliquū, quod ad intestina transfunditur, & fæces contentas emollit, & tunicas intestinorū lubricat, neq; crudū subducit, quoniam, cū naturæ ea familiaria sint, illa nō auersatur, aut cū crudis expellit, sed concoctione facta, quod familiare magis attrahit, reliquum cū excrementitia parte ad intestina pellit, quod cum non fiat nisi celebrata cōctione, post somnum solet fieri; & ut, millies & ego expertus sum, & nostri res medici meo exemplo cognouerunt, hoc modo aut semuncia, aut etiā duabus dracemis sæpenumero maior excrementorum copia educitur quam cū semuncia, & etiā sesquiuncia per horam, ut moris est, antè prandium exhibetur; Somnus potius adiuvat cōctionem illam, & lubricitatem, quàm impediāt. Neq; interrumpitur, quia quantitate tardius

49 LVDOVICI SEPTALII MEDIOL.

mel mediocriter acerrimū verò & quilibet aceti;
 & mellis partibus; cū in cōsilio pro puerō Epilepti-
 co acidissimū oximel ex vna aceti, & quatuor mella-
 lis velit cōfici: Minimè acidū ex vna aceti, & octo
 mellis. Nisi cū doctissimò Cigalino dixerimus li-
 bellū illū esse quidē Gal. sed multis in locis deprau-
 uatū. Potissimū cū oximel ex fauis cōfici ibi tradi-
 derit; cuius oppositū docuit, & 4. de val. tuend. 6. &
 2. de fract. 29. q. si ex fauis quis dixerit docuisse cō-
 ficiēdū Gal. lib. de Ther. ad Pāphr. oximel; is sciat
 lib. illū Gal. nō esse, q. vel indē colligitur, q. diuer-
 so modo cōposuerit ibi Theriacā; ac lib. de Ther.
 ad Pisonē, ac lib. de Antid. Deindē cōstat cōsiliū
 illud pro puerō Epileptico esse deprauatū, q. dies
 canicular res constituat quadraginta, viginti ante
 exortū caniculæ, & viginti post; quod Gale. repu-
 gnat; & græcis simbl, ac latinis omnibus scriptori-
 bus, caniculares dies ab exortu huius sideris incho-
 antibus, vt lōga oratione, & in com. lib. Hipp. de
 aerē, aqua, & in com. in Probl. Arist. docuimus.
 Colligunt tertio mēdosū esse libellū illum ex eo,
 quod pueris Epilepticis apium cōcedendū, petro-
 selinū abdicādum censet; q. petroselinū ledat epi-
 lepsia correptos; cū oppositū reperiamus apud oēs
 scriptores apium epilepticis obesse nulla facta pe-
 troselini mentione: sic Plin. lib. 20. ca. 11. sic Alex.
 Trall. lib. 1. cap. 17. sic Auer. lib. 2. tract. 2. cap. 36. sic
 Serāpio lib. simplic. cap. 290. & Mesuē in sua praxi
 cap. 26. de dolore capitis: nisi dixerimus corrigendū
 esse locum illum in cōsilio epileptico, vt loco
 mellis partes octo, legamus aquæ partes octo; sic
 enim conueniet cum loco 4. de Tusend. val. cap. 6.
 58. Cū in vino concedendo in febribus, & po-
 tissimū in acutis, tantū quoniam non sit excitetur

lib. 1. de
 com. lib.
 de Ther.
 ad Pisonē

lib. 1. de
 com. lib.
 de Ther.
 ad Pisonē

lib. 1. de
 com. lib.
 de Ther.
 ad Pisonē

lib. 1. de
 com. lib.
 de Ther.
 ad Pisonē

Vinū febricantibus acutē in-terdicēdū per se.

tut ob varios Hipp. & Gale. locos inter se contrarios, de quorū conciliatione, eademq; controuersia quid sentiendū sit alibi à nobis cōstitutū est, nēpē nūquā ratione morbi esse concedēdū, aliquādō verò ratione causæ & symptomatū, tūm etiā eorū, quæ secundū naturā dicuntur, & virium: qm̄ autē alicubi concedi passim intelligo, vt in agro Neapolitano, & fortasse frequentius q̄ debeat, atq; non apparentibus signis cōtioneis æstuantēq; agrotante, quānī felici successu ipsi viderint; nos Insu-bres laborantibus febre acuta, & maligna omninō vinū interdici-mus, quod adeō fœlici successu sit, vt ex viginti laborātibus maligna febre cum maculis vix vnus intereat, nisi fortē, quod rarissime euenit, ratione virium aliquando concedatur.

Vinū in acutis cur aliquando concedatur

59 Cauendum tamen, quantum maxime possumus, ne in nostris his regionibus vinum concedamus, etiamsi cōtioneis signa appareant; videmus enim plerosque ex quauis vini concessione quantumuis minima in deterius labi; atque denuō materiā recrudescere: quod cum sæpē, ac sæpius considerassem, videremq; antiquos adeō frequenter vinum in febribus concessisse non solum ratione virium vitalium, aut symptomatum, sed etiam ad adiuvandam cōtioneis materiæ morbificæ, atque ad promouendam illius per loquium euacuatiōnem, vt videre est 1. meth. med. 9. & 1. ad Glau. in curanda tertiana, & quartana febre; tūm ad spiritum facilitandum, vt 1. acut. 22. 3. acut. 1. & 4. acut. 37. non aliam horum apud nos infeliciū euentū ex vini exhibitione causam esse cōieciui, quam vinorū nostratū conditionē. Rubra, & nigra optima multa sunt, quæ primis mē-sibus, & austeris, & crassa, sed min⁹ apta ad febres, q̄ nec vtinas pro-

Vinū nūquā ne apparentibus quidem signis cōtioneis apud Insu-bres cōcedēdum, & cur.

D

ueant,

ueant, nec sputum faciliunt. Quæ alba sunt, aut flaua, aut sunt potentia, aut imbecilla; potentia quoniam maxime alba expectantur à nostris in aperto vase, ubi compressis vis reponuntur, ut simul ebulliant; non permittuntur tandiù firmari, quando oportet, ut debitâ coctione in se conciperent, & id, ut albo colore oculis, austero sapore, quæ picanter vocant, palato gratificentur, hinc & austeritate coctionis officiunt, obstructions excitant, neque urinas promouent, neque sputum adiuuant, præterea verò caput petunt quàm maxime igneis partibus validè in ipso contentis ob terrestres partes admixtas. Vnde etiam primis mēsis gratissima palato esse solent, si dulcedinis aliquid retinuerint, subausteris partibus cum dulcibus duplici sapore gustui ablandientibus. Imbecilla vero, & tenuia alba huiusmodi sunt, ut nunquam maturecant, nisi maximo æstatis calore superueniente, & ne tunc quidē austera partes omnino coctione euincuntur; sicque minùs apta erunt, & vires instaurare. & lotia promouere: quod etiam incommodum alterum excipit, quòd, ubi quasi maturuerint, austeritatemque deposuerint, aut statim serè acecant, aut euanida reddantur, aut corruptionem contrahant, vnde ad usum inepta redduntur. Euitandus igitur quæ

Bibenda se-
pè, & pau-
latim aqua
in febribus
æstuantibus,
non affirm-
& confer-
tiam.

maximè apud nos in febribus putridis maximè in acutis, potissimum in malignis, & etiam magis in internis inflammationibus, ut in Pleuritide, vini vsus; & si in usum duci debet, potentius potius eligatur, quod multa aqua diluatur.

69. Cautio præterea in bibendo adhibenda est in febribus potissimum æstuantibus, quam docuit Aristoteles 1. problem. 36. ut sepe, & paulatim aquam, & alios potus frigidos ad sedandam sitim.

illam

illā ex calore febrili excitatā cōcessos assumāt: Potio. n. multa, & confestim assumpta nec exsiccatas partes humectat, quibus æstus, & siccitas inest, cū statim præterfluat, nec sitim sedat: at si sæpius data fuerit, & paulatim pitissando hauriatur. os ventriculi, æsophagum, linguam, & palatū, dū sēsim per eas transit, refrigerat, & humectat aliqua ex parte parietibus, & tunicis adhærens; quin & paulatim se se insinuans in carnes conscēdit, & venulas exsiccatas madefaciendo, & irrorādo humectat. Quod aptissimo exēplo docet; si enim multa aqua, & cōfertim aut decidat, maximè si sicca sit, in terram, aut aliundē per cauū corriuetur, superficiem terræ non permeat, sed præterfluit, nullam noxā ducens; at si paulatim aut decidat, aut deducatur, superficiē paulatim madefaciens, & oclusos poros aperiens viam subsequenti ad penetrationem parat. Id verò intellegendum est de aqua in potum assumpta ad sitim sedandam: non verò de ea, quæ in multa, quantitate assumpta ad extinguendam febrem ardentem assumitur, quæ & multa, & assatim est assumenda; sed de hac re in com. nostris in Probl. illud: quidquid dicat aduersus Aristotelem Hieremias Triuerius in lib. Hipp. de victu idiotarum.

61 Quamuis somnus in accessionum febrium, omnium principijs consensu omnium medicorū, & multis rationibus id persuadentibus sit fugiendus, animaduertendum tamen aliquos reperiri, qui adeò sensu exquisito in musculis, & carnosissimis partibus sunt, ut superueniente effusione materiarum acrium ad illas partes, vade rigorem illū cōcussuum fieri medici omnes profitentur, tantis, tāque magnis doloribus conficiantur, ut vitales vires prosternantur, & mors sæpenumero subsequatur,

Somnus aliquando in principio accessionū concedendus, & quādo.

tur, in ijs non solum in principio somnus est auertendus, sed potius omni ingenio procurandus, vt sensus ille exquisitus retundatur, aut sopiatur, vigorque, & dolor initior reddatur.

Sonus immoderatus in acutis quādo permittendus.

62. Somnus in febribus potissimū acutis si modū excesserit, licet maiori ex parte malo egrotantibus cedat, & propterea sit euincendus, quoniā tamē, vt omnes alias à natura factas euacuationes cohibet, ita eā, quæ per sudorē fit, omnino pmouet, si in fine status vniuersalis febris, aut in declinatione superuenerit, etiā si tēpote modū excesserit, ita vt decē, aut etiā plures horas perduret, non est impediendus, potissimū si indicatoria die imminere crisis per sudores cōmonstratū sit: fit enim sæpe numero, vt promotis per longū illū somnū sudoribus ex vniuerso corpore, & ex illo sōno instaurata natura, & morbus soluator, & eger conualescat: cognoscemus autē ex signis præsentibus bono cessurū huiusmodi somnū longū, si sine stertore sit, si lenis, si deniq; illum non imitetur, quā in lethargo, comitosisue affectibus passim conspicitur: Videmus .n. aliquando excitatos egrotantes huiusmodi etiā medicorum consilio impeditos in huiusmodi euacuatione recidiuam fecisse. Propterea cauti maxime in hac re medici esse debent.

Aer frigidus febricitantibus acutē quō cōcedendus.

63. In aere frigido admittendo in acutis, & æstuantibus febribus hæc adhibeatur cautio. Vt prò viribus frigidus quidem aer ambiens in cubiculum admittatur, & procuretur, vt omnino & inspirari possit, & interna viscera æstuantia refrigerare, & faciei oblectamentum hoc afferre: reliquo autem corpori ne nudo obuēniat omnino cauendum; quā ne etiam nimis tenui stragula, ac peruia operto: circumuersante enim aere ambien-

te frigido, aut flatu, & calidus vapor, exalatione, quæ foràs per sensum effugientem euacuationem promouebatur, ad interiora repelletur, & pori cutis peruij fortasse adstringentur, & internus feruor adaugebitur: imminuenda quidem in augmento, & magis in statu erunt cooperimenta, vt æstus illo imminuatur per vniuersum, & natura instauretur à tanto labore, at sensim id fiat, neque eò vsque, vt illa incommoda sequi possint.

64 Non placet tamen eorum consuetudo, qui quasi ægris vim inferentes plus nimio cooperitos, & stragulis obuolutos tenent, sic & transpirabile magis corpus reddere censentes posse, & sudores promouere, cum alioqui illud nimium effluxum spirituum efficiat, & subinde vires imbecilles reddat; hoc autem violentiam naturæ inferat, & aut crudum humorem extrahat, aut qui per alias partes exitum sibi quærebat, ad cutim vi quadam natura repugnante attrahatur.

Nō nimis cooperiē-
di stragu-
lis acutē
febricitan-
tes.



26
L V D O V I C I
S E P T A L I I
M E D I O L A N E N S I S .

A N I M A D V E R S I O N V M ,
& cautionum Medicarum ,
Liber Tertius, eas com-
prehendens .

Quæ ad Pharmaceuticum negotium pertinent .

Medica
materia
mutanda .



Vauius tanquã verissima sit Hippo-
sententia 2. aphor. 52. omnia se-
cundum rationem facienti, si non
succedat secundum rationem non
est transeundum ad aliud, stante
eo, quod à principio visum est. Cauendum ta-
men ne diutius in eadem materia medica insisti-
mus, potissimum si in alterantibus versemur; sit
enim sæpenumero, vt, dum longo tempore eo-
dem remedio vrimur, natura illi assueta ita illud
in alimentum vertat, vt morbificam causam cuin-
cere non valeat, potissimum si alexipharmacum
sit, peculiarique qualitate agat: immutanda igitur
erit materia præsidij, & quantitas etiam, quæ
adeò certa præscribi non potest: Hac enim ratio-
ne, & existimationi nostræ consulemus, & ægros
obsequentes magis habebimus; ne tamen id fre-
quentius fiat, ne ignorantie notam per incostan-
tiam subeamus.

In

2 In purgandis humoribus per medicamentū, siue leniens, siue soluens, vt multa sunt à medico, & animaduertenda, & præcaueda, ita huic nostro Cautionū libro minimè inferenda, quod regula, & canones illi uon nisi cautiones omnes sunt, quibus medicum iam benè institutū supponimus; ne igitur in immensum crescat liber, solum cum Hipp. in fragmento lib. de medic. purgantibus illud admonebo; debere medicum præscripturum pharmacum, quod sursum, vel deorsum purgat, prius interrogare, num aliàs pharmacum purgās hauserit; & num alius ex purgatorijs deorsum, facile se soluat, ac citò obediat, vel potius dura sit: hæc enim erit cautio purgatoria in metu hypercatharseo, vt naturam peculiarem cognoscat ægrotantis, cum nullis notis idiosyncrasia cognosci possit; quam si cognoscere potuisset Gal. se æqualem. Esculapio censuisset: adeo enim aliqui faciles ad solutionē sunt & vt vel primo pharmacorū odore trepidant, atq; in fluxum soluantur; alij ita duri alio sunt, vt vix vllis remedijs alius respondeat, sic enim aut mollioribus, & lenioribus, aut valentioribus vri poterit.

3 At si nunquā pharmacorum aliuū subducen-
tium vsum se inijsse affirmet, tum demū exquirendum, num, dum sanus esset, officij memor alius foret præ conditione rerum assumptarū, & nū à pleniorē cibo se in fluxum effundere alius soleat, sic. noturius ægrotanti consulere poterit medicus.

4 In lenientium medicamentorū vsu; cū vides medicos adeo dissidentes; & in quantitate, & in hora exhibitionis, & in intervallo ab exhibitione ad cibum, concedentibus aliquibus pura succi castæ ad minus vaciam, tum, & sequitiam, vel ele-

Purgādū
egrum in-
terrogare
expedit
quomodo
alias se
gesserit.

Purgādū
interrogā
re oportet an
lubrica sit
alius.

Lenientium
vltus utilis
in princ.
pio mor-
borum.

Quarij lenitui, vel diaprui per horā ante cibū, & hunc potiùs matutinū, quā vespertinū, vt somnum fugiant, quem post medicinas imbecillas fugiendum auctoritate magnorum vicerū omninō probant, vel ea ratione, quod per somnū, & euacuationes per secessum impediuntur, & medicamentū naturæ adeo familiare alimenti naturam subeat; quod in Italij medicis Franciscus Valleriola 2. enarrat. c. 5. maximē reprehendit: Negātibz alijs, aut hac in principio morborū esse concedēda, aut sanē admodū rarō, in quo numero Mercurialem nostrū esse video. Ego de hac re itā censeo: In febrium omnium, & aliorum quoq; morborū curatione maiori ex parte ab initio lenientiū vsum conuenire, & vt excrementa, & in vētriculo contenta, & in vicinis partibus euacuentur, & vt cōmodiùs, securiùsq; incidentia, tenuantia, & abstergetia auxilia in vsum duci possint sine periculo, ne crudi succi ad intimiores partes ducantur.

**Lenientia
qua quan
tate, &
qua hora
exhibēda,
distinctio**

5. Qua verō quantitate, distantia à cibo, & quo tēpore? Sanē nisi cautio adhibeatur, & distinctio, in errore versabimur: Aut enim in principio morbi ad præscriptum vsum exhibentur, aut progressu morbi, vt alius aliqua deijciat in dies, cum enematata, quod aut tenuuntur, aut lædunt, aut nihil subducunt, aut alia causa in vsum venire nequeunt si p̄b primā occasionē. & ad vnciā, & ad sesquiciam concedi debent, & aliquanto tempore ante cibum, & potiùs matutinum, quā vespertinum tempus eligi debet, nisi aliter accessio febrilis persuadeat. Colligitur id ex Gal. 2. de alim. facul. c. 34. de moris, mox etiam de prunis agente. Vbi ait; Alnum pruna mouent præsertim si prandium non statim, sed aliquanto post intervallo in-

choe

choetur; & ipsa sola comedantur: hæc enim cōmunia omniū laxantiū præcepta meminisse oportet; ut. n. per se inexistencia: excrementa subducāt, sine cibo per se cōcedi debent; ne verò, cum naturæ ea familiaria sint, in alimentū vertantur, non multò post cibum est illis concedendus; ne vero somnū interrumpant, dū alium ad excretionem movent, quod post quatuor, aut sex horas fieri solet, potius ante prandium erit exhibendum, quod: si ad excrementa, quæ in intestinis aggregantur ex quotidiano cibo, subducenda exhibeatur, cum id. sæpius sit præstandum, multò minor copia illorum erit cōcedenda, puta semuncia, aut etiā dracmæ duæ in molli aluo, & facili solubili, & ea quidē immēdiatē a cibū, vel cū cibo ipso, & potius cū cēnā, quā cū prandio: sic enim cibus ē molliēs, & lubricans redditur; & ferculū illud liquidū, aut iusculū medicamentosum, induit qualitatē lubricantē; & selecta à natura parte nutriente, reliquū, quod ad intestina transfunditur, & fæces contentas emollit, & tunicas intestinorū lubricat, neq; crudū subducit, quāniā, cū naturæ ea familiaria sint, illa nō auersatur, aut cū crudis expellit, sed concoctione facta, quod familiare magis attrahit, reliquum cū excrementitia parte ad intestina pellit, quod: cum non fiat nisi celebrata cōctione, post somnum solet fieri; & ut, millies & ego expertus sum, & nostrates medici meo exemplo cognouerunt, hoc modo aut semuncia, aut etiam duabus dracemis sæpenumero maior excrementorum copia educitur quā cū semuncia, & etiā sesquiuncia per horam, ut moris est, antè prandium exhibetur; Somnus potius adiuvat cōctionem illam, & lubricitatem, quā impedit. Neq; interrumpitur, quia quantitate tardius

dius

dius agit, & non nisi post coctionem: Auctoritas illius sententiae à Valleriola adductae, aut de primo modo exhibendi ea intelligitur, vel potius de verè purgantibus debilibus, de quibus alias.

Pharmaco assumpto pro an dormiendum, & quando.

6. Ab assumpto autem medicamento verè purgante an somnus concedendus, impetandusue sit, alia est ratio; neque vna responsione potest satisfieri: aliter enim est agendum in medicamēto leni, aliter in valido: alia est ratio si medicamētū simplex sit medicamentū, alia si venenosi in se quippiā contineat, ut elleborus, colocynthis videntur; neque idē impetandum si liquida exhibeantur, aut in boli formā mollioris, aut solida concedantur, quales sunt pilulae: si ex blādioribus fuerint, & in forma liquida vix est superdormiendum, nisi vētricus admodum imbecillis fuerit; si boli molliores fuerint, & medicina satis potens, aliquandiu superdormite licet potissimū si nauseabundus sit ager, aut debili stomacho; sic enim facilius ad actum ducuntur, & non eomuntur: A pilulis optimū est dormire, & longiori tēpore, ut citius colliquantur, ad actumque deductae facile opus suū exercere possint. A valentissimis autē medicamētis assumptis, in quibus virulentia non nihil inest, nullo modo dormiendum cenſeo: ne virus ad principes partes, & potissimam cor per somnum means, aut ad cerebrum vapores

Purgante assumpto gulae, aut regioni ventriculi calida non sunt applicanda.

transfusi noxas pariant inemendabiles.

7. Male ijs cōsultur, quibus ab assumpto pharmaco, ne vomitus superveniat, calidi pāni aut gulae, aut regioni ventriculi applicantur, illud enim potius vomitū trahendo concitiat, hoc autem, & calorem naturalem à loco auocat, & saepenumero flatus excitando ex materia in ventriculo contenta nauseam promonet: gulae igitur, & esophago

potius

potius frigida statim promoueri debent; vetriculo autem, non nisi cum difficulter ad actum deduci potest, aut dolor à flatu coneitatur, calida applicentur. Cauendum autem semper ne calor excedat; reuocatur enim potius sic natura ab opere.

8. Cum Hipp. viderint aliqui ab exhibito elencho, aliove medicamento validiori cremorē hordei exhibuisse, vt & reliquæ, si quæ adhererent medicamento esophago, superioribusq; ventriculi partibus subluerentur, æstusq; ex medicamento vi in ventre productus reprimeretur, post quodcumque medicamentū assumptū post tres horas, siue euacuare iā cæperit, siue nullus adhuc motus fiat, iusculū pulli propinant, adiuuari sic cēsentes opus medicamenti. Quod omninò cauendū censeo: sic enim medicamento vis hebetatur, aut præter rationem actio medicamenti cōfunditur. In fine sanè euacuationis si quis id p̄stiterit, optimè illi consultū censeo; nā & siti consulitur, & reliquæ medicamenti, aut humorū subducuntur, eluitur vetriculus, atq; vires aliquo modo instaurantur.

9. Purgante medicamento dato si spatio quatuor, aut quinq; horarum nō deiecerint ægri, nec benè, nec turò clyisma injici potest, quod passim à practiciis fieri video, nā distentis intestinis pharmaco, ac tuentibus succis aditu prohibetur remedium; sæpèq; deorsum pellente natura, & sursum propellente clysmate pugna exorta dolores concitantur maximi, & aliquandò voluulus promouetur. glandem igitur præstiterit ex melle imposuisse cū semidracma salis, fellis bubuli, & succi cyclaminis; aut cū puluere trochiscorum alhandal, sed cum filo. Quod si clyisma indatur, sit acre quidē, sed sex solūm viciarum. Præstat tamen id promouere

Pharmaco assumpto non semper iuscula post tres horas exhibenda.

Pharmaco non euacuante, clyisma nō indendū, & quid faciendū eo in casu.

accre

uere cum haustu octo, aut decem vnciarum iuris pulli addito saccharo rubro ad duas vncias, aut vncia addita mannæ, aut sesquiuntia.

Vomitur
quotu-
plex qui-
bus, & qñ
cōueniat.

10. Eò vsq; mollities nostra peruenit, vt vomitiuorum vsus ferè exoleuerit, vt vel eam esse causam etiam credam, vt rarò rebelles morbi à nobis euincantur; ne tamen id sine animaduersione relinquam, animaduertendum, cum duplex sit vomitus, arte procuratus vniuersalis vnus, quo totius corporis compages, si quid mali conceperit, euacuatur per vomitum: Particularis alter, quo ventriculus, aut à collectis per se excrementis in se, aut ab affusis aliundè, inanitur; in primo illo exercendo cauendâ omninò esse hyemem dicebat Hipp. 4 aphor. 6. quod cum crassi humores tunc exuberēt, & viæ non sint apertæ, corporisq; cōpages densior sit, quàm vt locum humoribus attractis concedat, difficillimâ reddunt eam actionem; secus est si vacuare humores per se in ventriculo natos tentaueris: frequentius enim id præstare debemus hyeme auctore Hypp. lib. de salubri diætâ, quoniâ, inquit, hoc tempus in diætâ fecundius est, & quamuis eo tēpore ventres statuantur calidiores 1. aphor. 15. quoniam tamen pituitę metropolis cerebrum, ob aeris frigiditatē maximè pituita abundat, vnde defluxus illius ad pectus, & ventriculum, ideo vomitus hyeme magis conueniunt blandis ijs auxilijs, quæ nauſeam promouendo partem illam solâ possunt euacuare, vt docet Gal. 5. de vsu parti cap. 4. At si hepate se exonerante, bilis recipiatur in ventriculo, quod ex amarore linguæ, & alijs conspicitur, quouis id anni tempore eueniat, euomi potest, licet frequentius id eueniat æstate.

11. Nunquam tabidi, aut in tabem propensi

euo-

euomant, si fieri possit, sed per inferna euacuentur ob grauiorum symptomatum metum.

12. Cauendus itidem est vomitus, quibus caput dolet, nisi ex recrementis in ventre collectis id fiat; aut quos interna phlegmone obsider; aut qui laborant molesta aliqua hæmoptoe, aut oculorū morbis; lypothymia, aut vterinæ affectioni expositis etiam incommoda est vomitio, vt & ijs qui fracto, nauseabundoq; sunt stomacho; & denique consumptis, & morbo exhaustis.

13. Eò vsq; progressa est hominum mollities, vt etiam in medicinis purgantibus assumēdis voluptatem quærant, dum illas frigidas actū; quin etiam si Deo placet, glacie refrigeratas expectant, & sæpè ab adulantibus medicis concedantur; non animaduertētib; & multū de natura propria per glaciē corrumpi, igneas partes, in quibus maxime purgandi vis inest, exstingui; difficillimè ad actum deducī; dolores sæpè excitari, tūm ex frigiditate, tūm diminuta actione medicamenti, & sæpè numero crassiores humores in ventre existentes, dum adhuc densat magis, contumaces etiam nimium reddit, vnde repugnamus actioni medicamenti, indeq; tormina, & intestinorum dolores.

14. Cū nostris his temporibus, quibus Chemicis, & Hermeticæ medicinæ locus sæpè datus est, illud inoleuerit, vt extracta viriutū medicamentorū per infusionē in vino, aut in aqua vitæ ferre fiant, nisi diligēs cautio adhibeatur, errores sequentur inemendabiles: vt. n. cōcedi hoc vtiq; potest in medicamentis blandis, & placidis, vt sena, agarico, & similibus, vt etiā in simpliciter alteratibus ad calidum, ita in venenosis, & fortibus non semper est tutum, vt in Colocynthide, Turpeto,

Cata-

Vomitus
tabidis
inimicus.
Vomitus
quibus nō
conuenit.

Pharma-
ca refrige-
rata, vel
glaciata
pissimè
cōcedan-
tur.

Pharma-
corū vali-
dorū per
vinū, aut
aquā vitæ
extracta
valde pe-
riculosa.

Catapucia, & similibus; vis enim virulenta aliùs permeat, & cordis palpirationes producit; aut si virulencia non insit, sed mediâtibus igneis partibus vehementiâ habeat, adeò medio harum magnus vigor illis additur, ut super purgationes, aut sanè dyssenterias efficiant; sitisq; tanta excitetur, ut difficillimum sit huic symptomati occurrere.

Rhabarbari infusio in vino exhibita febres excitat.

15 Quinimò vel ob hanc ipsam causam aliqua sunt etiam blanda medicamēta, quæ, quòd igneis maximè partibus consent, ut rhabarbarum, si infusione facta in vino concedantur, febres sæpenumerò inducunt non parùm æstuantēs: irrorari utiq; antequam infundatur rhabarbarum debet, ut igneæ partes terrestribus multis admixtæ quodammodo ad superficiem trahantur; at infusio in vino facta nullo modo laudari à me potest.

Pharmaca quæ miscentur, sint ex ijs, quæ æquali tempore agunt.

16 In componendis formulis medicamentorū diligenter animaduertat inedicus, ne ea misceat, quæ multum tempore differant in operatione edenda, ita ut vnum ex ijs sit, quæ non nisi longo post tempore, & humores peculiare, & attrahunt, & subducent; aliud ex ijs, quæ velocissimè eadē præstant, ut si quis electuarium ex succo rosarum cum pilulis masticinis misceat: quod enim citò vires suas exerit, integrum subducet medicamentum, tardius ad agendum, aut dùm vix id humores peculiare aggressum erit attrahere, sicq; imperfectæ remanebunt actiones medicamentorum, & tormenta in intestinis, ac dolores exorientur.

Pilulæ quæ magnæ, & quæ parvæ concedendæ pilulæ pro capite maioribus, pro vetriculo minoribus.

17 In pilulis concedendis, & secundum magnitudinem, aut parvitatē efformandis, magna adhibenda est cautio: si enim à capite, aut longinquis partibus attrahere debet, crassiores magnitudini formari debent, ut diutius in ventriculo firmatæ

&

& valentiùs, & magis à longinquis attrahere possint ac si ad excrementa solùm, quæ sunt in vetriculo, excutienda vorentur, vt solemus de pil. alexphanginis, & aloë facere, minurulæ sæper esse debent, vt non diù ibi hæreant, sed quàm primùm abstergant, sic ad trium dierum magnitudinem eas pil. exhibemus, quâuis ex aloë lota confectæ pilulæ aliquantò crassiusculæ concedi possint, quàm quæ ex non lota: cum enim robur parti addere illis soleant, aliquandiu etiã plus retineri debent.

18 In validis verò pilulis concedendis, nimis magnæ sunt vitandæ, cum enim non nisi longo tempore euinci à calore nostro possint, atq; colliquæ, diuùs ibi firmantur, vnde nimis magna sæpè sit attractio humorum, vnde & superpurgatio.

19 De aloës frequentiori vsu, de illius assumendi consuetudine à cæna, de eiusdè quantitate maxime varia, ac de eiusdem in febribus vsu, cautiones plures, aut hic, aut in aptiorè locum erunt addendæ, describendæ eodem ordine, quo superiùs scriptæ sunt.

20 De clysteribus hæc sint cautiones. Prima, in gravidis non multùm frequens sit clysterum vsus, si enim emollientes sint, progressu temporis per communicationem partes vteri, & adiacentes nimium laxant, & hinc ad inferna repletus vterus prolabitur; si aciores verò fuerint, & fortui noxas afferunt magni momenti, & ex præmitu, quem inducunt, prolapsum excitant partus, & sæpenumero hæmorrhoidas maxime molestas produciunt.

21 In gravidis grandiori fetu clysteris nõ multa sit quãtitas, præterquã enim quòd cõprimit fetum, statim quasi etiam non primente fetu repellitur.

22 Remibus calculo, vel inflàmatione laborantibus

Pilulæ validissimæ forma nõ sint magnæ.
Aloës vsus frequens.

Clysteres prægnantibus non frequenter indantur.

Clysteres in prægnantibus grandiori fetu quãtitate non excedant.

Clysteres laborantibus renibus sint parue quantitatis.

In præpinguibus, & intestinis multi sensus clysteres non indantur: multum calentes.

Intestinis turgentibus, flatibus clysteres blande injiciendi.

Clysteres violenter non injiciendi intestinis repletis.

Clysterum communium incommoda.

tibus paræ eidem sint quantitatis, ne repletis nimum intestinis comprimendo dolorē adaugeant.

23. In præpinguibus non multum calentes indantur; solent enim intestina habere sensu maxime prædita, ita ut ab iniectione quasi subito expellantur sine utilitate: hoc verò in omnibus observetur, qui exquisiti sensus habent intestina.

24. In quibus flatibus maxime intestina turgent, qui enema injicit, blandè admodum id faciat, neque cum impetu propellat; in angusta enim loca propulsi venti nimium distendunt partes, atque inde dolores sæpenumero vehementissimi excitantur.

25. Tantundem damni ijs evenit, qui & plus nimio duras feces in intestinis habent, quique intestina ijs nimium repleta habent; paulatim enim emollire illas debent, atque mediocri quantitate indita, & blandè admodum.

26. Clysteres, quos ex malua, althæa, mercuriali, violaria, beta, & similibus decoctis parant passim pharmacopola, quos communes appellant, vel hac ratione semper suspectos habui, quòd decoctum illud paratum diutius conseruent, & quantum oleo diutius serpare, incorrupta huiusmodi decocta profiteantur, si tamen passim observaueris, putredinem, & malevolentia esse cognosces: quo dolore sæpenumero uterus in mulieribus commoveri solet, in alijs dolor capitis excitatur: Quare præstaret multa bene mellita, & oleo id prætare, aut ex oleo cum melle despumato, & oleo eodem præparare, aut sanè secens semper decoctum illud parare.

27. Magis verò iidem cavendi erunt, si addita vicia calidæ fistulæ, quam calidæ, aut diacassia pro cly-

clysteribus parentur: eam enim passim parari scio ex recrementis cassiæ ablutis fœce aliorum medicamentorum, exoletorum, & syrupis: iam corruptis loco mellis, aut sacchari, ut sæpè, & magnos dolores intestinorum inducant, & in aluo solvenda nihil proficiant.

28 Quantitas enematum maior sit in mulieribus. Oribasi. 8. collect. cap. 24. sunt enim ventricose magis, & ventre capaciore, ut & cum vterum ferrent, minus præmerentur.

29 Salem recentiores semper adiungunt, & si quis illum omiserit, tanquam si piaculum commississet, derident; sed præter usum antiquorum, & rationem; quoniam illo addito non diutius detinetur; cum etiam per noctem integram aliquando probe detineri scribat Aetius Ter. 2. sect. 1. cap. 129.

30 In puerorum clysmatibus olei usus interdicitur, & eius loco butirum succedat; ne vermes, si qui sunt sursum ferantur; sicque sebesteniuri, aut sero incocti maxime erunt ex usu, ex Paulo lib. 4. c. 33.

31 Ut ante venæ sectionem optimum aliquando est aluum clysteri euacuare; ne inanitate venæ crudam illam, & ferulentam materiam ad se trahant; ita non placet statim ferè ab insecto illo venam secare: Præterquam enim quod, & frigore ventantur aliqui ex surrectione, & alijs deliquia animi superueniunt; fit etiam sæpius, ut natura adminiculante non semel tantum, sed bis, ter, & quater, & sæpius deicere soleant: unde, aut in ipso sectionis actu alius perturbatur; aut etiam artifex in ipso deiectionis actu; ne tempus conterat, ob lucrum venæ sectionem exercet.

32 Cum morbus causæ implicetur, caue ne morbo euincendo insistas causa posita; si enim illud

Clysteres pro mulieribus quantitate maiores.

Sal. clysteribus raro indendum.

Clysteribus puerorum oleum non indatur.

Clysteri inducendum ante sectionem venæ, quæ observanda.

Morbo
causæ cō-
plicato,
causæ pri-
mo habē-
da ratio.

Causis
multis p-
sentib; qui
ordo in il-
lis eūincē-
dis seruan-
dus.

Nō cōtra-
rijs cōpli-
catis mor-
bis quo-
modo p-
cedendū.

Cōplica-
tis morbis
cōtrarijs
quōmodo
succurren-
dum.

Remedijs
in multis
quōmodo
proceden-
dum.

Extremis
morbis ita
timextre-
mus reme-
dijs occur-
rendum.

primò tentaueris, quamuis interdum mirior red-
datur morbus, manente tamen causa, aut nō eui-
netur integrè, aut sanè renascetur proximè maio-
ri cūm periculò.

33 In causis remouendis, externa prius tolla-
tur, secundò antecedens, tertio continens: siquidē
cūm alia ex alia nascatur, nisi in ijs euincendis is
ordo seruetur, frustra quod primò expetitur, sed
postremò superare intendimus, nempe morbum
superare, obtinere tentabimus.

34 In complicatis morbis remouendis, si ita
diffideant, vt varias sedes occupent, nec vnus cu-
ratio alterius curationi officiar, simul curari, & eo-
dem tempore poterunt, aut etiam diuerso, neque
multum refert ab vtro curationem exordiaris.

35 Si verò vnus curatione alteri incommodum
afferat, maximè erit cauendum, ne dūm vni rade-
mus affectui, alterū exacerbemus; sicq; aut ei, qui
magis vrget, maximè insitemus altero non neglo-
cto, aut sanè (quod potissimū obseruabitur, vbi
æque vrgeant) vtriq; mediocritate quadam, & cō-
trariorum permixtione erit succurrendum.

36 In decernenda remediorum copia hæc sint
animaduersiones prima in leuioribus morbis par-
sit remedium, ac semel, vniuersūq; morbum sub-
monens, cū enim leue sit, nullā naturæ vim inferet.

37 At in extremis, & periculosis morbis, incun-
te morbo præstat valentissimū adhibere reme-
dium, quia, cū mortis imminet periculum, nisi
vniuersū remedio euincatur, precipitem in mors
tem agemus. Hinc extremis morbis extrema re-
media adhibenda consulebat Hipp.

38 Quòd si mediocres fuerint, sensim, & blan-
dè melius depellentur, nullam enim sic contrariè

qua;

qualitatis noxam corpori inurent; Nec tamē adeo Morbis
lentæ eorum remediōrum vires esse debent; ut il- mediocri
las morbus non sentiat; exasperatur enim sæpe bus blādē
morbus; & acerbior fit; cūm morbus talia reme- occurrēdū.
dia facile superet.

39 In fouendis externē partibus, ut incalescāt; Fetus cali
prudenter se gerat medicus, ne diutius ipsi, utaturq; di nō lon
scripsit enim Hipp. Calidum, si quis diū, multū, go tēpore
quē eo utatur, ægris dānūm augeat; carnis effe- ut vultu
minationē inuehit laxatis carniū fibris; dissipa- ducendi.
tōq; proprio carniū pabulo; & inducto humore
re excrementino; vnde etiam nervorum sequitur
infirmitas; nām eorum robur in mediocritate consistit
siccitate. Cerebri quoq; affert stuporem, nam sensus
motus, omniumque cerebri actionum, quasi
resolutionem parit; & hæmorrhagias concitat, laxat
venis, & sanguine fuso; & lipothymias, dissipa-
tis spiritibus, & resolutis membranis; quæ mors
ipsa exiit.

40 At verò, nec multū frigidis diū utatur; Frigidis
nām frigidum, idem inquit Hipp. si quis inconsi- externis
deratē eo utitur, spasmos & rigores affert, inam- diū non
exitu omnia corporis inquinamenta prohibet, & viendū;
ossibus, ac cerebro bellum indicit. Frigida ad

41 Ad prohibendum sanguinis fluxum ubique; sanguinis
commendantur frigida, nisi in pectore fuerint ma- fluxū op-
lum; summē enim frigida pectori sunt inimica; tima præ-
ere enim sanguinis, & spirituum vias interceptiunt; fer quā in
ipsiusque thoracis naturam, quæ cartilaginea est; thorace.
labefactant, quod multo calore gaudeat ad vitam Repellen-
fouendam. tibus solis

42 In vehemēti dolore, vel ex multa copia; pioquādo
materiæ, vel ex acri, vel si in partem multū sen- non vten-
silem accurrat, capēdum, ne meris repulsorijs uta- dum.

eidem
 in
 ad
 ad

in
 ad
 ad

Narcoti-
cis raro
 vrendū, &
 quando.

Narcoti-
ca nūquā
 applican-
 da futuris
 capitis.

Narcoti-
ca nūquā
 intra au-
 res.

Narcoti-
ca nūquā
 in pueris.

Natura
 quo ver-
 git, eo du-
 cere oportet;
 quo modo in-
 telligendū.

mur; sed non nihil eorum, quæ discutiunt, erit ad
 miscendum; quæ enim adstringendo repellunt, cū
 tunicas siccādo exasperent, maiorem inferunt do-
 lorem, hinc potius influxum augent; quæ verò so-
 la refrigeratione id præstant, vt aqua frigida, nix,
 glacies, narcotica, cū materiā nimis crasse faciāt,
 partemq; condensent, & si dolorem minuant, cu-
 ratū tamen difficilem affectum reddunt.

43. Narcotica, quæ stuporem sensui inferunt,
 ne temerē in vsum ducantur, sed non nisi in vehe-
 mentissimis doloribus, vbi vires concidunt, vt ces-
 santibus doloribus robur recoligant: Adulatoris
 verò medici erit, aut auram popularem captantis,
 ea in leuibus doloribus in vsum ducere.

44. Nunquam commissuræ coronali, vt in cete-
 ris sit, applicentur in vehementibus capitis affecti-
 bus, sed temporibus, & fronti.

45. Nunquam in aurium doloribus intra auris
 meatum; surditatem enim sæpē cōcitant, quicquid
 Rasis contra sentiāt.

46. In pueris Narcoticorum vsus omnis suspe-
 ctus, nisi enim intus sumantur, cū angustis venis,
 adhuc consent, quasi strangulantur; extrinsecus
 autem ad somnum conciliandum si admoveantur,
 in reliquam vitam memoriæ multam iacturam
 faciunt.

47. In quacunque euacuatione molienda à me-
 dico siue non operante natura, siue imperfecte a-
 gēte, quāuis, & quæ maximē natura tūm partis,
 tūm humoris vergit, eo ducere oporteat, per loca
 conuenientia, id est per quæ euacuari possunt, &
 à natura etiam saltem secundaria intentione sunt
 institutā, qualis est ventriculus, vesica, intestina.

Cautio tamen adhibenda est, quia sæpē euenit,
 quæ

quæ per se sunt conuenientia, ex accidenti talia, non esse, vt si hæc loca laborent aut inflammatione, aut alio morbo. Vnde Galen. i. ad Glauco. cap. vndecimo. dicit, si ventriculus, vel intestina laborent, vel vulnere, vel inflammatione, non esse euacuandum per illa loca; tùm etiam si vicinus locus ille per se conueniens parti alicui laboranti fuerit, per accidens non erit conueniens; vt quamuis thorax, & pulmones ad excipiendam materiam à cerebro transfusam aptissimi sint, laborante cerebro non est per eam viam euacuandum quia trachea arteria, quæ pulmoni iuncta est, cerebro maximè est proxima, & sic periculum esset, ne ad pulmones irrueret, vt testatur Galen. 2. in 6. Epid. 32.

48 Quamuis, quæ ab Hipp. medicinæ parente primo Aph. 22. Proposita est sententia; Concocta medicari oportet, & cruda non mouere, nisi materia turgeat, quæ alioqui rarò turget, huiusmodi sit, vt maxima curandorum morborum ratio ea nitatur, vt felicitatem, qua in curandis ægris per quadraginta ferè annos fruor, in observationem huiusce canonis maximè referre soleam; quoniam tamen vnicam hanc exceptionem adiecit, nisi materia turgeat; tunc enim cruda sunt purganda; cum alioqui, & in Pleuritide Hipp. secundo. acut. vndecimo, & in angina 4. acut. 30. & cum lotium crassum est, & nebulosum quarto acut. 44. quod Imperfectæ coctionis signum constituit Galen. primo de crisi. decimo. septimo. Et in quinta die si venter marmurauerit Hipp. 4. acut. 64. & in quarta in Pleuritide, quæ est principium 4. acut. 76. medicamento vsus sit purgante; vt & Gal. 2. de differentiis feb. 4. in febribus

Côcocta medicari oportere, & cruda nō mouere, v. quomodo intelligenda Hipp. sententia; & loci controuersi cōciliati.

pestilentibus, & 1. de compos. med. per loca. cap. 1.
 & 8. curans alopeciam; & secundo eiusdem cap. de
 curatione doloris capitis; & 4. meth. med. cap. 4. in
 ulcere superueniente erysipelate; & 11. meth. 9. qd
 ita putridum est, ut corrigi nequeat, ab initio euacuan-
 dum. & cap. 21. in ophthalmia, & linguæ in-
 flammatione statim initio fluxus medicamentis
 purgantibus ab initio, quod est, ac dicere, cruda
 existente materia, vti sunt; in quibus certū est non
 surgere materiam; & fortē ea ratione, quod præ-
 stet aliquid cum periculo experiri, quā egrū de-
 stitutum remedijs sinere mori; Vndē tanquam in
 fallo hærent medici: cū confirmari sententiam
 illam 2. 1. sect. videāt 1. aphor. 24. 4. aphor. com.
 10. 4. acut. 22. 2. prorrhit. 58. 3. de diebus decret. 8.
 lib. quos, & quando purgare oportet in fine per
 longum processum, Quomodo in hoc negotio om-
 nium, quæ ad faciendam medicinam faciunt, ip-
 ximi momenti, se gerere debeant dubij hærent,
 & quid pro conciliandis contrarijs ijs sentētijs di-
 cendum sit, dubitant; An igitur cum antiquis pa-
 tribus euacuatione distincta in eradiciuam, quā
 in cruda materia nunquam cōuenire, & minora-
 tiuam, quam conuenire asserunt, satisfaciendum
 erit? minimē, quod vniuersalis sit regula cum vna
 sola exceptione, & 4. acut. 22. dicit vniuersaliter
 non conuenire, quia cruda non cedunt; at minū
 cedent minuatius debilioribus. Nec rarō in acu-
 tis in principio vteremur medicamentis purgan-
 tibus. Et ratio à Gal. in com. 22. tradita, quod non
 sit in cruditate separatū bonū à malo, in mino-
 rantibus locum habet. An potius canonem intelli-
 gemus de euacuatione, quæ sit curandi grātia; at
 præseruationis grātia cruda ab initio euacuare po-
 terimus?

terimus? At Hipp 4. acut. 22. reprehendenti medicos cruda ab initio euacuare tentantes ab inflammatione responderemus, excusari posse eos, dicemusque id illos præstitisse non curationis, sed præcautionis gratia. At nec placet ij, qui cum euacuationem aliam constituent euacuativâ solùm, aliam reuulsivam; in reuulsiva nunquam cruda in principio esse euacuanda, in euacuativa simplici aliqui posse censuerunt, cum in Pleuritide, in Angina, & alijs inflammationibus sciamus eo tempore reuulsionis gratia fieri eas euacuationes: Præterea incōmoda, quæ sequi scribit Gal. ad crudorum euacuationem tam in reuulsione, quàm in euacuatione vera sunt, potissimum cum absolute, & simpliciter regula ab Hipp. ponatur. Minus recipiendi, qui euacuationem crudæ materiæ à toto, nisi surgeat Hipp. reijcere censent aphor. 22. Alibi verò eandem concedere, si à parte solùm aliqua fiat. Quoniam rationes Galeni non solùm in totali conveniunt, sed & in partiali: Et 4. acut. 22. Potius de euacuatione loquitur, quæ à parte fit, cum præterea medicamentum intus assumptum non electione, & intellectu ducat, ut cognoscat, se non ad totum euacuandum, sed ad partem, esse deuoratum; Nec dicendum est, expectandam coctionem ordinata curatione ratione; Coacta verò, ne opprimatur æger, cruda posse euacuari, ut aliquibus visum est. Nam, coactam esseurgentis crudæ materiæ euacuationem scimus, quâ solam in 22. aphor. excepit, nulla alia omnino superaddita. Minus etiam dici potest in febribus nunquam floere cruda euacuare, nisi forte surgeat materia: in morbis autem sine febre cruda posse euacuari, quod alijs visum est. Convincit eum eor Hipp. auct. 2. acut. 1. qui in

pleuritide morbo cum febre sine turgentia à principio purgat. Vt igitur iam tandem in difficillima hac controuersia quid faciendum sit, eruamus, nō pigebit longiori uti oratione, & præter institutum cautionum practicarum tradendarum; cū res hæc basis ferè sit curationum omnium, in qua tamen omnes ferè aberrarunt. In primis igitur memoria repetendum est, cruda, & cocta in duplici esse differentia; alia enim cruda dicuntur, quæ coctione mutata in aliam substantiam verè possunt: alia verò non verè cruda, aut verè coqui dicimus, sed per similitudinem; nam licet nutrire cocta nequeant, in meliorem tamen conditionem ducuntur: de duplici hac coctione, & cruditate etiā primo locutus est Aristoteles 4. meth. vbi non solum cibum, chylum, & sanguinem cruda, & cocta appellauit, sed & lotium, & excrementa, ut & Hipp. 2. acut. 44. vbi bilem crudam appellat. & Gal. lib. quos, & quando, &c. & lib. de constit. art. med. 16. Distinguuntur autem hæc, quòd, quæ concoquuntur propriè ut nutrant, eandem qualitatem, & substantiā nutritæ partis suscipiunt; quæ verò impropriè, & per similitudinem cruda concoqui dicuntur, non suscipiunt aut qualitatem, aut substantiam, sed suscipiunt tantū quandam similitudinē caloris concoquentis: nam chylus albus fit in hepate ruber, & sanguis ruber albas partes nutrens fit albus. In crudo verò cocto, cū putridum esset, non fit mutatio secundum substantiam, sed in qualitate; ut sanguis putridus crudus dicitur, per coctionem albescit in pus. Hinc Gal. variè varijs modis coctionem definiuit. Secundo enim de naturalibus facul. cap. 4. concoctio, inquit, est alteratio, & mutatio eius quod nutrit in similitudinē eius, quod

nutritur: quā etiā recepit 3. de sympt. causis cap. 3.
 Diversā tamē ab hac posuit aliā 2. in primū Epid.
 c. 46. cū dicit, coctio est victoria humoris lædentis.
 & in arte med. 89. inquit concoctio est, quæ finit
 putredinē manente substantia, per primā. n. illā, ve
 ra coctio definitur, duabus ijs alia, quæ per simili
 tudinē dicitur, quæq; putridi humoris est. At. 8. de
 cōpos. med. secundū loc. cap. 7. dicit, concoctio est
 alteratio secundū, transmutationē ad similitudinē,
 ut utramq; cōprehēderet; quod in utraq; fiat mu
 ratio ad similitudinē, sed in prima secundū simili
 tudinē qualitatis, & substantię; in secūda verò tan
 tū secundū qualitates. Secundo supponendū est, q
 inflammationes ex Gal. 3. meth. med. c. 3. duobus
 modis fiūt, vel à transmissō sanguine ab alijs par
 tibus ad partē inflammandā: vel ab attracto sangui
 ne à parte inflammata: si inflammationes primo
 modo fiant, ut sanguis ab alijs partibus ad partem
 inflammandam transmittatur, dupliciter etiam fie
 ri possunt; vel quia partes afficiantur à multo san
 guine, vel quia pungantur ab acri sanguine; Cū
 enim multus est, partes insurgunt ad illum expel
 lendum, atque itā expellunt ad partem inflamman
 dam; iste autem sanguis, qui expellitur crudus dici
 non potest; non enim cruditate alimentali, quia p
 se nutrire aptus est, nisi quantitate, excederet; neq;
 impropria cruditate, quæ putredinalis est, quia si
 in toto abundaret, synocum generaret, cū tamen
 nulla præcedat sæpē febris; si verò in parte mitten
 te computruisset, iam in ea parte inflammationē
 produxisset: sanguis igitur ille transfusus crudus
 non erat. Idem dicendum est de sanguine expul
 so à parte per punctionem, ex acrimonia bilis san
 guini admixtæ; cruda enim nullo modo dici pōt
 bilis

bilis illa, neq; n. cruditate alimēti cruda diēi potest, quia bilis nō nutrit, neq; putredinali, quia anteq; fluat faceret febrē ardētē, vel erisypelata, nō igitur tū crudus sāguis ille pōt. Vbi verū sanguis iste influxerit in partē inflāmādā, cū extrā venas est trāsmisus, incipit calefieri, & putrescere, tūq; crudus efficitur cruditate putredinali; sensim verò à calore naturali cū eo, qui p̄ter naturā est, pugnāte incipit cōcoqui, & ex rubro fit albus, vnde oritur pus. Hāc autē distinctionē eliciamus ex sōte medicīnē Gal. primo prōgnost. com. vltimo, vbi reddens rationē, quomodo fiāt inflāmationes, dicit, sanguinē, vel humorē nō nutrientē sanguini mixtū, priusquā influxerit, crudū appellari nō posse; nā tūm primū tantū incipit alterari, & à sua natura in alienā permutari, cū influxerit, nā sāguis ex-cidens ē proprijs vasis, in pristinā naturā reuertēre nō potest, sed putrescit, & mox in pus vertitur, & p̄pter obstructionē illi calor p̄ter naturam accedit, & immutat, eadē de causa. 4. de vsu part. c. 1. erisypelata, herpes, & similes affectus p̄ter naturā ex excrementis p̄ter naturam fieri dicebat; quod ad retētionē obstructio sequatur, hincq; calor sequatur p̄ter naturā, qui humores corrūpit, ex quibus huiusmodi affectiones producūtur, vt à calida propter dictas causas, & acri bile reddita erisypelata generātur, & quę prius malē olēs non erat, fœtida tandem redditur. 4. acut. 44. Quā suppositionē efficitur, vt in quibuscunq; inflāmationibus à bilioso humore liceat ab initio purgare, quia humor non est crudus, & propterea nō comprehenditur sub aphor. illo vigesimo secundo primę sectionis cōnecta medicari; cruda verò non mouere oportet, quia bilis in principio inflā-

mationis

mationis nō est cruda. Ab initio verò purgari posse intelligo in erisypelate, herpete, & ceteris inflammationibus, & similibus, ubi minimū est, q̄ influxi, plurimū verò quod influxurū est, vt influxuri humoris pars maior. reuellendo euacuetur; nā si multū influxisset, plus periculi ex pharmaco purgāte sequeretur ob influxā materiā, quā commodi propter fluxurā, vt docuit Hipp. 4. acut. 22. reddēs rationē, quā ob rē purgante medicamēto nō cōuenit materiā defluxā detrahēre; q̄ pro materia noxia bona euacuetur, vires debilitētur, & in morbū addatur. Quibus positis facillimū erit intelligere cū in Pleuritide ab initio purget 2. acut. 11. & cū in angina 4. acut. 30. quia bilis in principio fluxionis nō est cruda. At 44. 4. acut. in lotio crasso, & nebulofo purgat, quia iā erat cocta materiā. Primo verò de cris. 17. cū crassū lotiū cruditatis signū dicit, intelligit de crasso, & turbido. quod verò. 4. acut. 64. quinta die purgarit crudo morbo, optimē fecit, quod ex historia cōstat fuisse turgentē; Gal. etiā loci illi regulæ nō refragantur: nā quod de pestilentiali dicit primo de differentiis feb. nihil est. præterquam. n. qd̄ i peste maiori ex parte materiā turgent, vnde quaque mota, nullum præfigens sibi locum determinatum; dico etiam verē crudā non esse, vt alias docebimus, cruditas enim coctionem supponit; at in peste maiori ex parte eo corruptionis materiā deuenit, vt corrigi, concoqui nequeat; de qua putredine locutus est 2. aph. 17. & li. aduersus Iulian. cap. 6. Gal. quam non nisi euacuatione tolli posse docuit. Auctoritates aliæ ferē omnes sunt aut de bilioso sanguine i principio inflammationum, aut erisypelatis affluente, quem ab initio purgari posse iā docuimus, quod adhuc

crudus

crūdus non sit, aut de materia alia, quæ nullo modo crūda dici potest, quod non computruerit.

Syr. ros. solutius in ter lenientia non cōnumerandus, sed in ter soluentia potissimum in acutis.

Syr. & mel. ros. quādo in principio concedenda.

Serum ex lacte quō separatur.

49. Caue etiā ne inter lenientia potissimum in biliosis naturis, & febribus tū verō maxime in acutis veris morbis syr. ros. solutiuū recenseas, quod à plerisq; medicis factū video; cum. n. obseruauerim saepenumero, aut simplicē, aut ex sero lactis sumptū tantā humorū copiā euacuare, quantā vix intestina, mēseraica venæ, & ventriculus capere simul possent, semper sū arbitratu ab vniuerso corpore, & venis maioribus humores attrahere.

50. Non negauerim tamen in alijs febribus, vbi multa in vētriculo, intestinis, & primis venis crudorum humorum copia subsit, quod altius vires suas exerere nequeat, tanquam absterforium medicamentum mel ros. solutiuū in vsum duci posse.

51. In sero lactis vsu animaduertendū, quomodo separet aquosa hæc lactis substantia à reliquis; Modus enim, quo passim nostri vtuntur, vt copula separentur, vt facilius est, ita minūs salubris: præstat enim separare, vt Diosc. docet lib. 2. cap. 276. quod fit duobus modis, primò si decoquatur lac donec efferuescat, dimoueatq; tamis siculneis, & vbi bis, aut ter deferbuerit, conspergatur oximellite, prò singula hemina, quæ est octò vncia, rursū cyathum illius immiscēdo, idest sesquialtera. secundo modo ait serū separari, si ei efferuescēti immergatur vas argenteum aqua frigida plenum. Idem docet Gal. 4. acut. 9. & Oribas. Primo Euporiston cap. 9. Sed multò diligētius Aetius lib. 1. quaten. sec. 2. c. 96. qui ret vt efferuescat, & ter deferuescat vasculo aquæ frigida pleno voluit, mox oximellite, vel mulsæ aspgendū, & peolandū esse, quod etiā docuit Paulus lib. Primo cap. 88.

32. In eiusdem feri assumendi quantitate cautio maxima esto, aut enim sumitur ad vniuersum corpus expurgandum, & tunc maxima illius quantitas haurienda est, sic fecit Hipp. 4. acut. 29. vbi Corylas ad minus duodecim propinandas voluit, quæ sunt centum, & octo vnciæ; quod si validæ sint vires etiã ad sexdecim peruenire posse, idest centum quadraginta quatuor vncias, scribit; sic enim interpretabatur Gal. lib. de salubri dieta. c. 28. vbi cõgium potionis similis propinasse scribit, idest centum, & octo vncias. Quod si ad ventriculum, & intestina abstergenda, & euacuanda bibatur serum, ea quantitas sufficet, quæ tradita est à Diosc. lib. 2. c. 176. nepè quinq; heminæ. Heminæ enim prius hauriendæ scribit, deinde deambulandum, rursus aliam bibendam, iterum deambulandum vsq; ad quinq;. Hanc sequitur Orib. 1. Euporiston c. 9. addens hanc quantitatem esse moderatam. Idem Aetius 1. Quat. ser. 2. c. 86. Paulus lib. 1. c. 43. tradit, quantitatem ad idẽ tendentem adhuc parciorẽ tres, aut quatuor heminas tradens; & se explicans c. 88. ætate vigentibus triginta sex vncias, iunioribus, solum decẽ, & octo idest corylas quatuor, aut duas concedens. Aliquãdò autẽ sero lactis vtimur tanquam materia infusionis, aut macerationis, tunc multò minor illius copia sufficet; & sic Mesuæus lib. 2. c. 9. à sex vncijs ad duodecim concedit. Neque obijciat quispiam Gal. 4. acut. 7. asserentem, serum intestina solum subire, illaque euacuare, quod repugnare illi videtur, quod primò dicebamus ad vncias centum, & octo dari ab Hipp. 4. acut. 29. ad vniuersum corpus expurgandum. Cum tamen ipso tantam quantitatem non probaret, vt constat ex locis propositis, cum solum intestina

euacua-

Seri lactis
quantitas
variã, quo
modo cõ-
cilianda.

Placitum
et ab
et in
et in
et in
et in

et in

*Purgandū
non ſēper
in febrili
declinatio
ne.*

33 *Caueat medicus in declinatione febrili m-*
putridatum ſemper medicamento purgare mate-
ria, quæ morbum faciebat, euacuationem facere;
quādiſ enim ſēpe hoc neceſſarium ſit; ne qua
relinquuntur, recidivas faciant 2. aphor. 12. ſæpe
tamen in iuditijs naturæ nihil relinquitur; quini-
mō aliquando etiam ſi nulla criſis facta ſit, aut re-
cta victus ratione, & debita abſtinentia, aut inſen-
ſibili per habitum corporis facta euacuatione, aut
paulatim per clyſteres eadem materia euacuita, ſi
euacuare in fine medicamento tentaremus, colli-
quatis humoribus bonis, & carnibus, & ſpiritibus
exagitatis, ac excalefactis, viribusque deſtructis
ægrum præcipitem ageremus in morrem.

*Purgandū
quādō in
declinatio
ne feb. pu-
tridarum.*

34 *Quādō igitur cognoscemus purgandū eſſe*
corpus in fine febris? Docuit id Hipp. 2. aph. 8. cū
dicit, ſi quis à morbo cibū aſſumens nō corrob-
ratur, ſignū eſt corpus pleniori vi alimēto; Quod
ſi nec capienti id contingat, vacuatione tū opus eſ-
ſe pro certo habēdū. Vbi Gal. dicit intelligere, ſi
cibū multū aſſumat, & cū appetentia quæ ſi aſſit,
nō poteſt abundare prauis humoribus relictis: ſic
que nō indigebit euacuatione, ſi multū cibū, & cū
appetētia aſſumpſerit, & corroboretur; ſi verò nō
multū cibū ſumens nō corroboretur, indiget eua-
cuatione. Animaduertendum tamen corporis hāc
confirmationē non ſtatim cognosci, ſed trium, aut
quatuor dierum ſpatio, poſt quos dies, niſi ſequa-
tur & appetentia, & corroboratio, euacuatione
per medicamentum purgans vtendum eſt.

*Purgandū
in ipſa de-
clinatione*

35 *Animaduertendum tamen purgationem il-*
lam, & ſtatim morbi intermedio illo tēpore ſup-
ponere, & apparere ſigna coſtutionis perfectæ in vri-
na.

na . fit enim quandoque vt cessâte febre per diem vnum, aut alterum febris antè quartam redeat; nō quod non desierit ex ratione cōcocta materia, qđ quandoque fit etiam per octō dies; neque tamen terminatus morbus dici potest, quia adhuc cruda est materia, & in eo casu non est in eo spatium purgandum, quia nec cocta est materia; nec separata mala ab vili; tunc enim & tormina, & vertigines produceret euacuatio, colliquatis carnibus, & spiritibus euacuatis. aph. 35. & 36. Vndè in intermissione hac falsa putantes aliqui medici esse veram declinationem post coctionem materiae factā euacuantes, agnum interimunt.

56. In ijs, qui dura admodum sunt aluo, aut viscidis, crassiq; multum succis potissimum in ventriculo, & intestinis sunt, ne medicamentum verè purgans cōcedatur, quin prius clystima vespere injectū sit, vt facilius subducatur, & dolores nō pariat, exitumq; per inferna nō inuenientes humores, & medicamentum, ad ventriculum regurgitent, quod docuit Ruffus apud Orib. 6. collect. 26.

57. Criticis diebus quarto, septimo, vndecimo, decimo quarto, vigesimo, si nihil antè iudicatum fuerit, ne dubitet medicus aut purgare, aut sanguinem mittere; critici enim tuncij dicendi non sunt,

58. Quod si indicatorio die monstratum sit naturam crism facturam, nec tamen faciat, leuibus remedijs, quæ etiam in manu nostra est subtrahere, manus adiutrices porrigere eadem die etiam poterimus.

59. Caue tamen ne in deficiente natura in materiz motu per aluum id facias, ne maior quàm sit fiat euacuatio, si auxilium medicamenti tunc adiugas.

Clysterem
indēdū sepe in aluo dura ante purgationem.

Criticis
dieb⁹ quādo purgandum.

Crisi deficiente quō procedendum.

Crisi die critica deficiente, eadē die nihil moliedum.

72 LVDOVICI SEPTALII MEDIOL.
gas, cum semel haustum pharmacum reuocari ne-
queat, nec illud amouere liceat: naturæ enim is est
mos, ut aliquando cunctetur aggredi euacuatio-
nem, & aliquando cunctanter moueat, mox vero
validè aluū excludat. Quare postridiè potius erit
pharmaco vtendum, quo manus quasi adiutrice
fatiscenti naturæ porrigamus; aut quod restibile
est à Crisi imperfecta excludamus.

Sympto-
maticæ na-
tura ope-
rante, quid
medico p-
standum.

60 Quid si natura ante coctionem symptoma-
ticè euacuationem molatur? Digladiatur hic me-
dici doctissimi. Ego sic sentio, si fiat per loca natu-
ræ dissentientia omnino cohibendam cum Gal. 1.
aphor. 21. at si per consentanea feratur cohiberi
non debere: nam fallit interdum, & quæ mala vi-
deri poterat, bene aliquando cedit. 4. aphor. 46.
47. ut in Methone contigit, vnde si cohiberetur,
prauis lithores copia, vel qualitate stimulantibus,
qui euacuantur, ad partem aliquam principem
calamitosè rapi possent. Et licet, & cruditatis, &
multitudinis, & prauitatis hæc euacuatio sit argu-
mentum, & signum malum; ratione tamen causæ
bonum est, vel minus malum: nam minus malum
est humores educi, quam in principem partem fer-
ri. Si in otio quiescerent illi succi, præstaret eos
non excerni, sed cum prauis adeò sint, ut partes ir-
ritent, præstat eos excludi.

Sympto-
maticæ na-
tura ope-
rante cau-
tè agendum.

61 Cautio tamen adhibenda, quod licet talem
euacuationem non conueniat cohibere, minime
tamè à medico est valde iuuanda, cum fiat à natu-
ra non omnino bene agente, etiam si fuerit dimi-
nuta. Imò ubi diutius perseuerauerit talis eua-
cuatio, & vires prosterнат, omnino erit cohi-
benda.

73

L V D O V I C I

S E P T A L I I

M E D I O L A N E N S I S .

A N I M A D V E R S I O N V M ,
 & cautionum Medicarum ,
 Liber Quartus , conti-
 nens eas .

Quæ in sanguinis missione obueniunt.

I N sanguinis enacuatione per sectā venam, licet illud sit obseruandum, vt ventriculo, & venis mesenterij crudis humoribus, & excrementis repletis, non prius fiat, quàm ea abstergente aliquo, aut leniente subducantur: Cauendum tamen ne si morbus ita vrgeat, vt mortis periculū immineat, id faciamus: statim enim missione sanguinis illi occurrendum est; vt in Angina, & vehementi aliqua inflammatione, & febre: melius enim est imminuentem mortem præuerrere cum aliquo damno, quàm ægrotantem à morbo opprimi sinere: potissimū cum leuioribus ijs noxis nō difficili negotio occurrere possimus.

2 In sanguine detrahendo cauendum maxime ne quantò putriorē, & deterioris conditionis sanguinem ē vena profluere viderimus, tantò maiorem quantitātē effluere sinamus; quod plurimos facere obseruamus; tali enim existente sanguine,

Sanguinis missioq; nō semper præmittenda alui lenitio.

Sanguine malo minores illius quantitas euacuanda.

F &

& pauciores subesse spiritus constat, & vires facilime solent collabascere.

Coloris in sanguine mutatio in missione sanguinis non sepe expectanda.

3 Coloris in sanguine, qui euacuatur, mutatio, quæ in euacuatione reuulsiva potissimum in internis inflammationibus spectatur non sit terminus, & mensura quantitatis detrahendæ; nam in febribus sæpe primus sanguis, qui detrahitur, ruber est, mox niger, aut lucidus; cuius mutationem si quis expectare voluerit, præcipitem agrum aget in mortem.

Coloris mutatio in sanguine in inflammationibus ne etiã expectanda.

4 Quin nec in inflammationibus internis quidem perpetuò illa coloris mutatio expectanda est: aut enim vix à parte, & circumfusa ob crassitiem quandoque extrahitur, aut sanè tanta illius est copia, vt, si coloris mutationem expectare voluerimus, vires omninò finis delecturi.

Coloris in sang. mutatio quò intelligenda

5 Mutatio hæc coloris ab Hipp. 2. acut. 10. tradita intelligatur, si primum albidior ille floxerit, mox purpurascat: vel cum primò purpureus exierit, post luescens fundatur; tunc enim suppressus est modo dicto.

Coloris in sang. mutatio in reuulsione longinqua non expectanda

6 Hoc aut seruandum erit, vbi vena proxima est affecto loco: alioqui si in alijs casibus inflammationum, idem quis agere vellet, nimia foret euacuatio, antequam sanguis à phlegmone abduceretur.

In angina & hepatis inflammatione copiosius sanguinem extrahere poterimus, quàm in Pleuritide, & Pulmonia; quòd in illis maxime, & euacuare, & reuellere opus sit; in ijs verò præterea, quòd reliquum est, vbi suppuratum fuerit, excretionem per tussim expelli debet: quòd, & si opus sit animalis facultatis, vitali tamen imbecilla existente, constare illa non potest.

7 In Angina tamen, & hepatis inflammatione copiosius sanguinem extrahere poterimus, quàm in Pleuritide, & Pulmonia; quòd in illis maxime, & euacuare, & reuellere opus sit; in ijs verò præterea, quòd reliquum est, vbi suppuratum fuerit, excretionem per tussim expelli debet: quòd, & si opus sit animalis facultatis, vitali tamen imbecilla existente, constare illa non potest.

8. In pueris sectio venæ quæ euacuandi officiū solū adimplet, vt rariū in vsū duci debet ob eas, quas Gal. & sequaces eius adduxerunt, causas; non tamē adeò perpetua hæc regula esse debet, quin aliquādo ante decimū quartū annū hoc remediū præferri possit, & debeat, tū, quod pubertas sæpè terminū illum præueniat, potissimū in mulieribus, tū, quod multos solidioris, & nigrioris habitus ante illud tēpus conspiciamus, tū, quod aliquos tāta sanguinis copia repletos obseruemus in acutissimos morbos incidere, quorū plenitudinē, nisi secta vena statim soluamus, certum mortis impendere periculum scimus. vnde sæpenūmero natura præueniens, [quā omnino bene operantē imitari debet medicus] copiosa per nares hæmorrhagia subito morbos huiusmodi soluit. Et quamuis huic sententiæ refragari videatur Gal. cum tamen Cornelius Celsus, Mauritanii ferè omnes, Hispani, & Galli plerique, & ex Italis quamplurimi, in hāc deuenierint sententiam, ijs assentiri potius placuit, atque exprimentis propemodū infinitis spatio quadraginta annorum, quo in magna hac vrbe, & in magno hoc nostro Valetudinario medicinam exercui, firmare possum.

9. Quod si de sanguinis missione per sectam venam loquamur, quæ reuulsoria est, qualis est, quæ administratur pro internis inflammationibus curandis ab initio, quales sunt Angina, phrænitis, Pleuritis, Peripneumonia, hepatis inflammatio, omnino in pueris ante quartum decimum euacuari sanguis per sectam venam poterit, cum & statim, nisi retrahatur sanguis, ægrotantes iugulent, & cum impacta est materia, retrahi, amoueri que nequeat; he quo ex transpiratione per mollē trans-

Pueris et
euacuatio
nis gratia
ante annū
quartū de-
cimū seca-
ri potest
vena.

Pueris pro
reuulsione
secari om-
nino vena
debet.

pirabilēq; habitū sperari possit materiā retrahi posse, etiā si concedatur permeabilē illū habitum euacuationis vices supplere posse; reuulsiuum tamen nunquam constitui poterit verē remediū.

Pueris autē septem-
mum præ-
stāt hiru-
dinibus sã
guinē eua-
cuare, &
cur.

Tempore
mittēdi sã
guinis si
mēses flue-
re conrige-
rit, sed im-
perfectē,
euacuādū
antē quā
desinat
motus.

10 Præstat tamen in pueris ad sextum annum hircudinibus vena aperta sanguinē extrahere; cum enim vsque ad septimum annum ob excessum humilitatis vena, arteria, neruus ferē simul conglobata sint periculum subest, ne loco venæ, aut simul cū ea neruus, aut arteria pertundatur. quod si etiā manifestē se exerat, lanceola, pertūdatur quidem, sed amplum potius, quā profundū vulnus fiat.

11 In febribus, si tempore mittendi sanguinē, aut menses moueri contigerit, aut hæmorrhoides fluant, quamuis doctissimi aliqui viri censeant nō prius quippiam à medico esse moliendum, quā euacuationes illæ desierint, etiam si sint imperfectæ, quod nesciamus quantum velit natura euacuare, & cum imperfectē aliquandō in principio agat, versus finem autem suppleat, vnde si euacuare remus periculum immineret, ne ex excessu vires deficerent; Censendum tamen melius esse, cum versus finem videmus naturā deficere, manus adiu- trices porrigere, vt ex coniunctis naturæ, & medicamentis facilius euacuemus, quantum opus est; sic enim Methoni diminutē sanguinem nariū euacuāti lauit caput Hipp. 1. Epid. sec. 3. c. 14. quod confirmat 3. acut. 39. sic. 6. Epid. sec. 2. p. 8. ex euntem humorem vna dicebat debere medicum effundere; quod etiā Gal. in com. vna explicabat, id est, dū imperfectē natura operatur; nō autem dicit post. Sed quod omnem tollit difficultatē, Gal. 9. meth. ca. 5. vbi hac proposita difficultate respondet, quod in eo casu impetus fluentis sanguinis

spectan-

ſpectandus eſt, qui ſi ſatis fore videbitur, totū negotiū permittendū erit naturæ; ſi minus tantum medicus detrahet, quantum ſatis videbitur, vt ex coniunctis ambobus tanta fiat euacuatio, quāta pro euincendo morbo erat neceſſaria. Vbi duo ſunt, ex quibus facile colligitur noluiſſe expectare ſanc motus naturæ, et ſi imperfectus ſit. Primū quoniā dicit, ſi ſatis fore videbitur, quod non ceſſatū motū oſtendit, ſed dū in motu eſt coniectandū eſſe ex impetu, an ſufficiens futura ſit illa euacuatio: ſecundū quoniam fruſtrā ex impetu id coniectari doceret: ſufficeret enim ceſſato motu videre, an adhuc & morbus magnus eſſet, & ſanguinis ſubefſet abundantia, viresq; valentes: cum autem impetum fluentis ſanguinis ſpectandū iuſſerit, id nō alia de cauſa faciendum voluit, quā vt ex impetu coniectari poſſimus, an ſuffectura ſit huiusmodi naturalis euacuatio, vt, ſi ſuffectura ſit, puta ſi magno cū impetu eſſuat, totum negotium naturæ relinquantur: ſi verò lētē, & guttatim, ante quā deſinat, manū adiutrices porrigere valeamus, vt vtriſq; coniunctis poſſimus tantū euacuare, quantum opus ſit; quā diligentia adhibita, ea eſſugiemus periculā, quā nādeo verēbātur, qui contrā ſentiunt.

12. In ſanguinis metienda quantitate ex habitu corporis gracili cautio magna adhibenda eſt, atque diligenter conſiderandum, an à natura gracilitatem haectus ſit, an à conſuetudine, victu, morbo 3. de ſenſu. cap. 4. ſi enim aut ob victus paſſimoniā, animi curas, aut ſimilia, quā verifimile eſt parum ſanguinis in venis contineri, minor extrahi debet quantitas. In ijs verò, qui tales ſunt natura, quā fieri poteſt, vt & liberiori victu, vi fuerint, & propterea ſanguine abundant, plū

Gracilibus
quādo pa-
rum ſan-
guinis de-
trahendū,
& quādo
multum.

detrahi poterit primo ad Glauc. cap. 14. i. n. d. b. r. t.

Carnosi à **Idem in crassis animaduertendum.** Disting-
pinguibus **guēdi. n. erūt carnosī à pinguibus; in carnosīs quā**
distingue- **plūs sanguine abundant, plūs sanguinis detrahi**
di, in illis **poterit; contra in pinguibus.** Gal. 1. ad Glauc. 14.
plus san- **14. In vite instituto video multos medicos erra-**
guinis de- **re plus sanguinis in ijs detrahentes, qui laboriosas**
trahēdum. **artes exerceat ut; in fossoribus, & similibus, quā in**
Sanguinis **ijs, qui in artibus; sedentarijs toti sunt; quasi in illis**
minus de- **plus insit sanguinis; viribusq; maximē valeant; nō**
tradēdum; **animaduertentes etiā in illis spiritus, & sanguinē**
ijs, qui ar- **exhausti: robur verō potius in solidiori supra re-**
tes labo- **positū esse, & ex quotidiano alimento suppeditari;**
riosas exer- **cūm alioqui venā nō in multo sanguine refertā sint.**
cēt, & cur. **15. Cum repetitam sanguinis euacuationem per**

Sanguinis **sectam venam in putridis febribus curandis ali-**
repetita, **quando eadem die, aliquando sequenti, aliās etiā**
missio **tertio die vno interposito faciēdam docuerit Gal.**
quomodo **lib. de curandi rat. per sang. miss. cap. 16. si tertia**
facienda. **na nō hā simplex fuerit, vrgeat verō necessitas**
mittendi sanguinis, bis eadem die intermissionis
fieri poterit septem horarum spatio interposito,
aut in sequentem diem etiam reseruari, si accessio
vesperi superuehiat. Quod si duplex facta sit in-
terposito die maioris inuasionis, in tertium differ-
ri potest. In quartana verō præstabit bis facere
duobus diebus intermissionis.

16. Animaduertendum præceptum Gal. lib. de
curan. rat. per sang. miss. cap. 21. si repetitio fiat
euacuationis gratia, reperendam potius eadem
die, sin reuulsionis in alterum, aut alterum esse
differendam.

17. Caue tamen ne in præcipiti morbo reuul-
sionem exposcente id serues; cūm enim affluxus
fiat

fiat vehemens, vt in effusione sanguinis per narem, aut vterum, aut hæmorrhoides, aut in inflammatione gutturis, hepatis, pulmonum, nisi eadem die fiat, frustra sequenti die id tentabimus, quod cum sanguine anima sit effusa, aut suffocatio eo peruenierit, vt nulla amplius subsit spes salutis.

18 Cum in reuulsione perfectam venam facta, & rectitudo obseruetur, & venarum cōsensus, vnde laborante inflammatione crure dextro nunc secandam iecorariam dextrī brachij; nūc saphenam internā cruris sinistri præcipiebat Gal. hac distinctione in harum alterutra seligenda ego vtendum esse; si ex interna causa, calido sanguine affluente, fiat inflammatio, secanda omnino erit vena iecoraria dextrī brachij; sic enim versus originem, & fontem retrahemus sanguinem seruata rectitudine, & à corpore extrahemus. At si externa aliqua causa, puta vulnus, contusio, aut quod simile inflammationem pepererit, præstabit ex crure sanguinem mittere, vt sanguis, qui ex vicinis ad partem laborantem affluit, facilius per venarum communicationem, & reuellatur, & euacuetur.

19 Cum sanguinis missionem ad animi vsque deliquium concedat Gal. 23. 1. Aph. in ardentissimis febribus, maximis inflammationibus, & vehementissimis doloribus, non nisi in extremis morbis admittendum esse hoc genus auxilij manifestè ostendit. Verum cum ad illud exequendum tot requirantur etiam conditiones, nempe, vt ad sit ætas iuuenilis, temperamentum calidum & humidum, regio temperata, corpus sanguinis missioni assuetum, anni tempus temperatum, quas vix in vno, & eodem corpore reperiri posse constat; Cauebit iuuenis medicus sanguinis missionem ad animi vsque

Reperitio sanguinis missionis reuulsuæ quâdò eadem die faciendâ.

Reuulsio per sectâ venâ quâdò magis requiratur rectitudinem, & quâdò magis cōsensum venarum.

Sanguinis missio ad animi vsque deliquium raro in usu dutendâ, & à quibus cur.

deliquium aggredi; sed eam peritis medicis, & plurimum in arte versatis relinquit; quia, cum vix tot conditiones in vno concurrant, & si in vno reperiantur, vix cognosci possint, potissimum à iuniori, necdum multum in arte exercitato, præstabit illā omittere, & maturiori iudicio relinquere.

Sectionē
venæ quā
ad præce-
dere de-
beat focū
inanitio.

20. Non semper antè sectionem venæ lenienda est aluus, vel leniente medicamento, vel clystere; sed vbi crudorum humorum colluuiem in ventriculo, & venis mesenterij adesse cognouerimus, aut ex præterita victus ratione, vel ex colore linguae, vel ex grauitate partium illarum, iuxta ea, quæ tradita sunt à Gal. 4. de tuend. sanit. cap. 5. & antè ab Hipp. 4. acur. 116. vbi dicit, si secanda est vena, & aluus fluat, prius esse adstringendam: at si adstricta sit; clystere, ait, prius esse soluendam; ne scilicet inanitæ venæ crudos humores, aut etiam corruptos ab illis locis sugant; ac attrahant.

Morbo in
præcipiti
sanguis mit-
tendebe-
tè alui le-
uentionem.

21. In febribus putridis, in quibus dantur indicia, præmitti vbi adsint crudi illi humores, aut putridi in primis venis clysteres debet, aut lenientia aluum; at in præcipiti morbo à fluxione sanguinis facto venam prius secato, non aluum emollias.

Venis bra-
chij in se-
riendis, quæ
cautiones
adhiben-
da.

22. Cæterum omnibus in pertundendis in brachio venis hæc adsit cautio, vt Basilica feriatur, postquam se iunxerit cephalica: infra eundo per digiti latitudinem, cephalica contra supra per digiti latitudinem; nam corporum sectio id docet: nam maximus nervus, qui ex ceruice inter primā costam, & elæuiculam permeans toto brachio fertur, basilica subest eo loco, quo ferit digiti latitudo, sursum eundo, si consotiationi basilicæ, & cephalicæ imponatur: tunc si digiti altera latitudine ad axillas abieris, eo loco supergreditur basilica.

cum

eum neruum, dum nēpē cursum suum ad cephalicam flectit, ibi periculum. Quod si infra pergat in altum se abdit neruus. Nec etiam tuto in ipsa conjunctione utriusque venę sit sectio, cui plerumque validissimi tendines subsunt, cephalica autem superius, ut dictum est, erit ferienda; nam ibi ab arteria, quę ei vicina est, longius abest; nec quicquam periculi habet.

23 Plures, si quis in sanguinis missione, & vena secanda exposcat, cautiones, & animadversiones Aulc. legat 1. quarti cap. 20. sed potissimum Nicholum Florentinum serm. 2. tract. 1. summa 2. cap. 16. 17. & 18. & recentiores qui de sanguinis missione per sectam venam ex professo scripserunt. Dū enim regulas quasdam ad hanc materiam pertinentes tradunt, cautiones plerasq; attingunt, quas, ne actum agamus, in presentia prætermittendas censemus, potissimum cū in animadversionibus circa febres, & morbos particulares quā plurimas ad hoc negotium spectantes infrā simus proposituri.

24 In Cucurbitularum usu, si locus scarificandus sit, non adeo multo igne opus est; nam præterquam quod sæpē numero vesicę in cuticula eleuantur aqua plenę, quę scarificationem cutis integre impediunt, attractum etiam sanguinem adeo cōdēnsant, ut mirum non sit, si incisa cute sanguis non effluat, potissimum si diutius adhæreant.

25 In scarificanda sub cucurbitulis cute ad euacuandum sanguinem non eodem modo semper incidenda est cutis: nam in cute subtili, & alba, in tenui sanguine, & bilioso non profundis incisuris est utendum, sed superficie tenus est scarificandum; vbi verò in crassum corium incidimus,

Cautiones in mittendo sanguine alię a quibus petendę.

Cucurbitulę si cū scarificatione, effigantur cū paucō igne, & cur.

Scarificatio quādo profunda & quā leuis faciendā.

81 LVDOVICI SEPTALII MEDIOL.

mus, & nigrum, crassusq; sanguis, & fœculentus erit euacuandus, profundius erit curis, & subiacens caro incidenda, ne euacuationis sine frustremur: cum alioqui artifices quamplures videamus, qui in quouis corpore vix cuticulam transeunt, solumque & iehorosum, tennem, & in extrema superficie consistentem sanguinem extrahunt, vt manus agilis, & vix ferientis nomen adipiscantur.

Cucurbitula non diutius affixæ parti permittantur.

26 Caueant quàm maximè, ne diutius cucurbitulam carnosè potissimum, & molli parti adherere sinant: cum enim vehemens fiat attractio, & multa carnosà substantia cucurbitulam ingressa sit, adeo coarctatur, vt spiritibus non permeantibus pars emoriatur, & gangrenam, quin etiam sphacelum subeat; vnde maxima vitæ pericula sequuntur.



83
L V D O V I C I
S E P T A L I I
M E D I O L A N E N S I S ,

A N I M A D V E R S I O N V M ,
& cautionum Medicarum ,
Liber Quintus, eas com-
plectens,

Quae in Febris curandis observari debent.

N verum est in febris putridis sudoris, & urinae prouocationem utilem esse: ita in intermittētib; maximē autem tertianis, sudoris utiliore censemus, quā urinae, nam cum singulis harum accessionibus videamus ferē ad ambitum corporis portionem materiae transfundi a natura per sudorem, motum illius imitari debemus.

2. Oppositum in cōtinuis fiat; quod in intimioribus venis in eis humor putrescat; ex quibus per lotium apertissime expurgatur, nisi forsan sero si nimium, & tenues humores praeualeant, & aestas cum madore sit; tunc enim etiam sudoribus euacuatur.

3. In Tertianā febre vera, & ardente haec in clysteribus adhibeatur cautio, ut sicut molles, & refrigerantes potentia esse debent, ita actu vix teporem habeant.

In febris intermit-
tentib; su-
dorū pro-
uocatio p-
stātor, po-
tissimum
tertianis.

Febris
continuis
comodior
euacuatio
per lotiū.
Tertianis,
& ardēt-
ibus clyste-
res vix te-
pentes in-
dendi.

Tertiana. 4 Vt in tertiana respectu sui, aut materiae illam
in febre an- faciens, nunquam ab initio ante coctionem est
coctionem medicamento purgare euacuandum, ita cum quan-
quodque venter bilis acris transfundatur, &
purgandum, mordens grauissima inuehens pericula, & saepe
& quando. mortem, potissimum si aget ad vomendum ineptus
natura fuerit, vt illa praueuiamus, licebit purga-
tione vt respectu symptomatis, vt syr. ros. solutiuo
ex seto lactis, vel solo, vel cui incocti sint rhama-
rindi, aut & valentioribus, vt electario rosato Me-
sue, aut de succo rosarum, quin in accessione ipsa
symptomate urgente aut hydraleo vtemur, vel vt
vomitu adiunemus, vel vt deorsum ducamus, aut
sanct, vt acerrima illa qualiteratem attemperemus.

Rhabbari vsus in 5 Vtus rhabbari, vt omnino inter principia
fluos febriū est interdicens, quod electiue pur-
gatiue, quod non licet cruda materia, & quod calidum sit, &
modo sus- siccu, qualia omnia euitanda ante concoctionem doce-
pectus. bat Gal. 1. ad Glau. ita ad deturbandos biliosos il-
Biliosis in los humores, & syncopim ex motu oris ventriculi,
febrib. pro & vehemetissima alia accidentia in primis trib. aut
purgatio- quatuor accessionibus ante coctionem omnino fugiendos:
ne sufficit humores. n. illos feruētes magis exacit, partē sto-
adesse nu- gosi quadam afficit, obstructions in venulis mesera-
bē albā, le- cis potius adauget, siticulososq; deniq; egros reddit
uē, & equa- 6 In purgatione in biliosis febribus molienda
lem. caueat medicus, ne decipiat hypostasim in vrina
Rhabbar- albam, leuem, & aequalē expectans: cum enim
rū ēt i de- in biliosis affectibus sola nubes illas habens con-
clinatione ditiones ad concoctionem ostendendam sufficiat,
astutium si exquisitiora illa signa expectauerit, recidua fa-
febriū pro cile occasionem praebet.

Diff. purga- 7 In bile in astuosissimis ijs febribus euacuan-
da suspe- da, licet rhabbarum primas apud omnes medicos re-
ctum; cur. ne animaduertendum tamen omnino erit, si calor adhuc

vehemens in declinatione, vel in ventriculo, vel in hepate, vel in vniuerso corpore, & solidis partibus relictus sit, & sitis ingēs, qđ in vehemētissimis tertianis aliquādo, sępius in cōtinuis, & Causone cōtingit, pręstare illo non vti, vndē in illius locū substituere poterimus decoctum thamarindorū cum syr. ros. solutiuo, & portione mannę, & similibus: rhabarbarū. n. caliditate sua, & siccitate, ac igneis partibus, vt calorem per accidens minuit euacuata calida materia, ita per se in huiusmodi corporum cōditione calorē exacuit, siccitatē adauget, ac sitim inducit; vndē accensis denuō spiritibus denuō febres excitantur; aut solidioribus magis siccatis hecticę introducuntur, quod multi non animaduertentes non leuem ignominię notam subeunt; quod iam vel declinata, vel cessata febris noua, eorum actione excitetur.

8 Si qñ autem etiā in ijs casibus rhabarbaro vti placuerit, aut in tertianis ipsis adeo nō ardētibus, aut in corporis tēperie, aut cōstitutione sic calida, & sicca, quod pręstantissimū Colagogū sit, ac maxime in biliosis affectibus ab omnib. & a me commendatū, potius dilutū, facta in aquis refrigerantibus, aut sero infusione cōmendo, vt caliditas illius, & siccitas retundatur, & igneę partes reprimantur; aut ex saccharo in syrupū paratū cū cicoraceis, vt est syrup. de cicorea cū rhabarb. descrip. Guglielmi. Quod si portiones quępiā auerſetur, in vsum in puluerē quidē ducetur, sed admixta cassia, eiusue succo ad vnciam, faciliē enim sic siccitas eius retundetur, & igneę partes compescuntur.

Rhabarbaro quō vti possimus pro purganda bile, ēē in effluuis febribus.

9 Scammonij vsum, vt in biliosis omnibus febribus suspectum habere conuenit, & non nisi refracta illius caliditate mixtione aliorū medicame-

Scammonij vsum in effluuis feb. suspectus, & quando eovtendū,

torum refrigerantiū, vt in electuario rosato Me-
sue, & de succo rosarum, & admodum raro, ita in
ardente febre omnino fugiendum censeo; hæc. n.
febris magis quam quavis alia refrigerantia ex-
poscit. Quapropter per cassiam, mannam, syr. ros.
solutium ex sero, violas, thamatindos subducere
humores peccantes contineat; vel etiam Aetio
Tetrab. 2. ferm. 1. cap 78. id persuadente.

Blandis as-
suptis me-
dicamentis
potest levis
sonus con-
cedi,

Causone
laborante
purgato se-
rum lactis
optimum.
Sacchari ro-
sati vsus
post pur-
gatione in
ardentibus
non pro-
bandus.

Tertianæ
in febre et
intermissio-
nis die vi-
ctus a Gal.
& alijs in-
stitutus a
ppd nostra
res pericu-
losus.

10 Post blada hæc medicamenta optimè suadet
Auic. dormire aliquantulū; cum enim etiā alimen-
tosam habeant facultatē, etiam si porro aliqua in
alimentum vertatur, refrigerabit, neq; tamē eua-
cuatio impedietur, natura per somnū refocilara.

11 A purgato in Causone humore, si quis lactis
serū ad frigidū alteratū per duos, tresue dies si m-
pserit, vel lac asinæ, illi maximè consultū censet:
humectat. n. & refrigerat corpus, sitim extinguit,
atq; si fortē hectica inceperit, oīdō eā reprimīt.

12 Vndē etiam non adeo probanda est practi-
cantium consuetudo altero a purgatione die sem-
per saccharū ros. ex aliqua aqua refrigerante con-
cedentium, vt calor, siccitasq; vt expurgantis me-
dicamenti facta, & ex febre relicta, & sius compe-
scantur: Cum experientissimus Rasis 3. tract. con-
tin. 27. eos, qui calorem, & ardorem in ventriculō
patiuntur, illud comedere nullo modo debere te-
stetur, & maximè si æstas fuerit: calefacit enim;
inquit, & sitim inducit; id quod etiā in multis ex-
perientia docet; quare præstabit aut sero, vt dixi;
vti, aut aqua hordei cum succo aurantiorum, aut
iulepo rosato, aut violato.

13 Laute etiam nimis, oriam intermissionis tē-
pore, cibari mihi videntur tertiana laborantes, ab
omnibus fere, & a Gal. ipso, qui cibandi modus si

apud

apud nos in vsum duceretur, oēs ex tertiana simplici in duplicē, aut etiam continuam duceremus: atq; hoc sepe, ac sepius iuniores medici, cū ex scriptorū instituta victus ratione victū præscriberent agrotantibus, experti sunt cum agrotantium periculo, vnde mutare sententiam coacti sunt.

14 Quinimò si vinum prò potu incipiente cōditione cum Gal. & antiquis concesserimus, omnes in deteriorem cōditionem ducemus, vt vix in ipsa declinatione cōcedere illud possimus, siue hoc corporum nostrorum constitutioni tribuatur, siue vinorum nostratium conditioni, siue vtrique, hoc vnum scimus, securius per totum morbi decursum abdicari vinum.

Vino Tertianarij apud nos potū morbum interdicendi.

15 In quotidianis curandis febribus animaduertendum est, quòd, licet in febribus alijs in principio vberius sit nutriendum, paulatim versus statum progredientibus imminuendo; in illis tamen primo septenario tenuius sunt alendi ægri, vt & crudæ in ventriculo contentæ materiæ attenuatæ, ex calefactæ, & exsiccatae, aut in bonum succū vertantur, aut saltem absumantur, aut per se, aut ope medici lenientibus, & abstergentibus subducantur; in qua re Rasis, Auic. & reliqui omnes Mauritanii conueniunt, vt nempè primis septē diebus tenuiori victu utamur, quàm etiam in statu; qui omnes à Tralliano mutuati videntur.

In quotidianis in principio tenuius alendū etiā, quam in statu.

16 Si tamē à falsa pituita fiat, potius vomitu in principio expulsa, aut deiectione abstergente per inferna educta, cū nutritui inepta sit, euacuabitur, neq; diēta adeò ab initio erit attenuanda, ne incalascit magis, sicceturque, minusque educationi apta reddatur.

Pituita falsa abundante vict. ab initio non adeò attenuandus, sed euacuanda.

17 Quamuis vomitum in hac febre Gal. laudasse

Quotidia-
na in fe-
bre vomit
utilis ab
initio, &
quomodo.
Quotidia-
na in febre
præter vo-
mitū ab ini-
tio, valen-
tior cōue-
nit, in statu
ex Galen.
Mel ros. so-
lutiū, li-
cēt in bilio-
sis ab initio
non cōue-
niat; in pi-
tuitosis op-
timū est re-
mediū; &
cur.
Aloe in
quotidia-
nis, & alijs
febril. lon-
gis opti-
mū reme-
diū.

dasle visus sit apparentibus signis coctionis, quod
in statu euenit; id tamen de ea per vomitum euacua-
tione intelligit qua vniuersum corpus euacua-
tur radícula, cui veratrum album infixum sit: cum
enim maiori ex parte primis diebus ventriculus pi-
tuita sit refertus, si ad vomendum ineptus non sit,
aut natura, aut structura corporis, optimum erit
blando, & facili vomitorio tentare illius euacua-
tionem, aut, si sit nauseabundus, à cibo.

18 Quauis mel, & syrupū ros. solutiū in bilio-
sis febribus, ab initio cruda existente materia, in-
vsum duci nō posse ad subducenda excremēta cō-
munia iā docuerimus; in quotidiana tñ ad abster-
gendos viscidos à ventriculo humores præcipuè
mel præstantissimum remedium censendum est:
attrahens enim facultas frigiditate, & visciditate
humoris primò occurrentis euanescit, & quasi
emoritur; valens autē maximè facultas abster-
gentibus relinquitur.

19 Ne quis in amphimerinis suspectum habeat
aloes vsum ad deturbanda communia excremēta,
& pituitam in ventriculo, & primis venis existen-
tem subducendam, vel ob eam rationem, quòd bi-
lem potissimū illam subducere scribat Gal. & 7.
meth. med. 4. & 8. de compos. med. secūdum loca.
c. 2. & lib. de Ther. ad Pisonem. 4. & Paul. lib. 7.
cap. 4. vel sanè quia eandem calidam in primo, &
secundū gradum attingentem, & in tertio sic-
cam idē Gal. constituerit, quod quā sit febril-
bus inimicum, quilibet, qui febris naturam exa-
minauerit, facile poterit intelligere, hac animad-
uertat: si enim duplicem in aloe esse facultatem,
considerauerit, alteram à tota substantia dictam,
qua bilem potissimū, tūc etiam pituitam, si

non

Aloes du-
plex facul-
tas.

alidem ad duas dracmas sumptū pituitam; & bile
 subducere: eūnt addit, sumi etiā quotidie potest à
 cēna, nō intelligit de eadē quantitate; sed alium
 vsum sumit; de quo i. Euporiston. c. 9. vbi de eua-
 cuantibus, quæ in sanis corporibus cōueniunt, agit;
 quantitatē enim ijs p̄scribit, qui quotidie eam
 effumunt; itum dixerunt magnitudinem. Idem
 enim, & longiori oratione explicuit Aet. Tetrab.
 i. lib. 3. cap. 24. cū enim ad triū dracmarum
 etiam quantitatem ad multos demolendos mor-
 bis optimam esse statueret; commodam etiā esse
 scribit sanitati conservandæ, si quotidie ante cenā
 sumatur, aut ante prandū maneat autem esse nō
 potest in eadē quantitate, sed ad sexuplū; ad os-
 midracmā, sicut Mauritanus Ane. lib. 2. cap. 43. &
 de ijs, qui secunda vultudine constitutis alōū mo-
 uere possunt de detorsoria hac facultate loquitur,
 vi lib. 7. & de eadē opus vni medicamento purgante
 agit, ut & apud Mesuam. videre licet. Si igitur
 taliquam detorsorium medicamentum, & vti cu-
 lup expurgans sumitur, & in minori illā quan-
 tate, & statim de cibis, vel de tam ante cibum statim
 sumitur, febri citantibus ijs sēpe concedi poterit,
 in quibus aut vtrūq; musti humores febres produ-
 ciunt, ad eētē ex diuturna febre debili reddito
 calore venter buli multa pituita congeratur, ut in
 longis febribus euenire docet Gal. in ad Gal. i. sic
 2. de compos. med. secundū loca v. 2. & Oribas. loc.
 cit. in febribus huiusmodi potissimū si lota fue-
 rint alōem quāpitabas iure cōmendantur, non loti
 tamen in ijsdē; sed p̄condit indicatio praualeat,
 etiā concedunt; Concedatur igitur intrepidē in
 ijs febribus, cūmque ex febrili calore desumitur,
 indicatio non praualeat, sed quare ex grassis humori-

Aloes va-
 ria quanti-
 tas lumen-
 da, si per
 purgatorio
 & si pro
 deiectorio
 motu
 Aloes igitur
 in ijs
 aubom

bus in ventriculo congestis, ob diminutum partis calorem, tū ubi roborandi ventriculi viget indicatio; quod in longis febribus, & ex pituita genitis, & tertianis spurijis sepiſſimè euonire dicebat Gal. 1. ad Glauc. Vnde videmus Mauritanos, & eſſeſcholam ſectantes, & pilulas ex hiera Gal. comendare, & alephanginas bis in hebdomada in pauca quantitate à cœna ſumprās.

20. In vſu attenuantium, & diureticorum hæc eſto cautio, ne idēte eorum vſum nimium ſint calida attenuantia, ſed moderate aperiāt, ne aut materia nimis liquata, & ſuſa maiori mole turgescat, & dolorem per vniuerſum pariat; aut, exhaustis tenuibus partibus, quę relinquuntur craſſiores remaneant, & quodammodo lapideſcant, & in inueterum ſerè malum agri decendant.

21. Illud certiffimum eſt in Gal. doctrina non multum in febribus vſum medicamentorum purgantium commendari, cum 8. meth. 1. abſolutam putridarum febrium curationem tradens, ne verbum quidem de purgatione habuerit; & 1. meth. in reſolutoria illa methodo curatiua earum, cum putridum humorem euacuatione eſſe propulſandum doceat, ſtatim ſubdat, eligenda eſſe medicamenta, quę ſine calore educant, vt ſunt muſſa, ptiffana, clyſter. & 1. ad Glauc. etiam in continua rum curatione purgantium medicamentoru ſi non meminerit. In tertiana verò præſtare ait, medicinalia alterantia, quàm quomodolibet euacuare: id verò, quod ſæpenumero per vſum copiam, aut per ſudores, inſenſibilemque tranſpirationem morbiſica cauſa ſit euacuata; quod, ſi quę ſuperſunt craſſiores potius aliqua portiones erunt, non multę illa medicamētis noſtris blandioribus non

Attenuan-
tia in prin-
cipio non
ſint valen-
ter calefa-
cientia.

Purgantia
valèter ra-
gò in febrī-
bus in vſū
veniunt.

ſi abſolūtè
non agerent,
ſi autē
non agerent.

calidis tolli possunt; cum in ea quantitate esse con-
 ſectabimur, quæ ad alios in putredinis communio-
 nem attrahendos apta sit, cum verò non sæpè id
 in tertianis, continuis, & acutis contingat, rarò
 etiam in fine earum purgationem exercendam
 censuit Hipp. 1. aphor. 23. 2. aphor. 29. & lib. de
 medic. purg. 3.

Purgantia 22 In febribus autem à pituita genitis, quæ in-
 leuia repe- termittunt, leuia quasi medicaméta purgantia tā-
 citra in quo tū, eaq; per interualla admittit Gal. quæ secutus est
 tidianis cō Alex. Trallianus magnæ vir auctoritatis lib. 12.
 ueniunt. c. 7. de hac re differens, cum dicit, non oportet au-

tē ipsos vniuersim purgare, sed per vices, & simpli-
 cioribus medicamentis, &c. vnde fortasse recen-
 tiores suorum minorantium vsum desumpserunt,
 quod in aliquo casu, & aliquibus febribus, & post
 coctionem conceditur ex arte, ad omnes febres,
 & quocunque tempore, & in principio malè tra-
 ducentes.

Purgandum 23 Lenius enim, cautiùsq; in febribus omnibus
 leuius in- purgandum esse constar, quàm in alijs morbis à fe-
 bre, quā bre sciunctis: calidissimorum enim viscerū, cordis
 i alijs mor- nempe, & hepatis feruor, calor ex humorum mo-
 bis, & cur. tu contractus, & deleteria, vel saltē fatis calens
 medicamentorum qualitas in causa sunt, vt cum
 timore in febribus purgemus: in morbo autem
 non febrili audacter euacuemus; id quod Hipp.
 lib. de articulis in fine clarissimis verbis ostendit.

Debiles dū 24 Verū purgare corpora in febribus cum
 purgantur opus est, inclinante morbo, vel post illum, quo tē-
 e lecto nō pore vires maiori ex parte sunt imbecillæ, & spi-
 surgant. ritus multū exhausti; cauendum maximè medi-
 co est, ne ex assurgendi frequentia, aut ex humo-
 rum euacuatione in syncope incidant sui ægri;

quod

quod vel in purgandis ijs, qui à tertiana sunt euacuandi, maxime timuit Auerroes. Quapropter iubeat excrementa in lecto exonerare vase aliquo huic vsui accommodato supposito, aut syndone plicata, quod innuisse visus est Gal. 3. de cris. cap. 9.

25 In quartanæ febris recta victus ratione, & in quantitate illa sit animaduersio, vt in principio non in omnibus sit eadem, neque enim semper à crassiori est incipiendum, quod ex communi regula primo aphor. colligunt aliqui, in statu attenuantes, neque etiam semper per primas tres hebdomadas abstinentum erit à carnibus, & pullis gallinaceis, vt crudi humores possint attenuari, & absumi, quod magni alioqui nominis viris placuit, sed distinctione opus est; sanguinei, & carnosissimi, quique lautiùs vitam per multos dies traduxerunt, & qui crudis multis scatent succis, & qui ex sanguine in melancholiam verso febricitant, primis quatuordecim, aut viginti diebus tenuiùs alendi erunt, atque etiam, si fieri possit, ab vsu carnum sunt interdiciendi; vt & crudi humores in ventriculo, & primis venis existentes concoquantur attenuati, & in sanguinem mutari queant, neue alius permeantes obstructions adaugeant. Qui verò in prima regione cruda non aceruarunt, & biliosi sunt, maeris, facile resolutibiles, tum & pueri, aliter sunt in principio alendi, atque concedenda erunt carnes, vt diuturno morbo obistere possint, atque ad statum vsque cum viribus valentibus peruenire.

26 Quòd salsamenta in quartanis laudentur à Gale. Cautendum est ne multo eorum vsu melancholicus succus in corpore adaugeatur; concedenda igitur erunt parca manu, vt medicamentosa

Quartanarum in principio varius victus, & quo modo variandus.

Salsamenta quartana laborantibus concedenda, sed parcè & cur.

alimentiā attenuante vi prædita, & vi lapperentiam, quæ primis mensibus omnino solet esse defecta, excitemus.

Quartanis
venæ se-
ctio quan-
do conue-
nit.

Quartana
laboranti-
bus dum
sanguinis
euacuatur
medici præ-
sentia ne-
cessaria.

Sanguis in
missione
sangi. in
quartanis
nō statim
supprimen-
dus, etiam
bonus.

Sanguis in-
miss. sang.
in quartana
nisi etiam
si optimus
quodam
modo
fiore qd

27 Sanguinem quidem in quartana missum, per sectam venam, si opportunè hoc auxilium ad-
ministretur; Gale. censuit optimum remedium,
opportunè autem fiet, si multus in venis sanguis
fuerit, & crassus, & fœculentus, niger, & crassus.

28 Undè iure merito medici præsentia necessa-
ria est, dum talis actio à veniseca exercetur, qui
qualitatem sanguinis consideret, ut eo inspecto, si
niger, & crassus sit liberaliorem permittat euacua-
tionē, habita semper vitium, ætatis, plenitudinis,
temporis ratione: Quod si potius tenuis, & clarus sit,
& potius ad flammam vergat, suppressendus erit.

29 Adhibenda tamen hæc est cautio, ne statim
ac percutientem sanguinem, & bonum exire vide-
rimus, illum suppressamus sugillata vena: sæpius
etiam vidi primas illas duas vncias effluentes bonæ
conditionis, quod non ex penitioribus educantur,
sed ex venis brachiorum, quorum sanguis ob assidu-
um eorum motum, quandoque purior reddi-
tur; Progrediente verò euacuatione nigrum, &
crassum effluxisse: quapropter saltē duas, aut
tres vncias, ut effluant, sinendæ sunt antequam
certum de hac re feratur iudicium, & antequam
supprimatur.

30 Buenit tamen aliquando, ut, etiam si sanguis
optimus è vena fluat, permitti debeat effluere, ne-
que sisti oporteat, si fortè ex antea acta vita, & si-
gnis plenitudinis ad vasa cognouerimus tantam
sanguinis copiam congestam in venis esse, ut nisi
soluatory periculū immineat, ne aut nouus aliquis
morbus magni momenti adiungatur, aut certe ex

multa

multa illa sanguinis congesta copia obstructione
genita aduratur sanguis, & in atrum sanguinem
mutetur, addaturque in causam quartanae.

Et licet Gal. de loco, unde in quartana san-
guis est euacuandus, agens, censuerit ex axillari, si-
ue interna brachij sinistri vena esse educendum,
illud sumēs, quod maiori ex parte evenit, originē
quartanarū ex splene pēdere: Praestat tamen hac
in re Aetium sequi, censentem, cōsiderandum esse
prius, an potius virio hepatis, multū melancholi-
cum succam gignentis, vel affato sanguine, vel ali-
qua alia occasione fiat: tūc enim potius ex dextro
brachio, quā ex sinistro sanguis esset mittendus.

In pestilentibus febribus sic dictis, quod pe-
stiferas emulentur, ut verum est maiori ex parte,
mittendum esse sanguinem secta vena consensien-
tibus viribus, ita in peste pestifetisq; sic verē dictis
tariū id. auxilium mersum duci debet: neque
enim vnquam si à prauis cibis in annonae penuria
fiat, sanguinem mitemus; neque in ea, quae ex
aeris putredine, nisi magna subsit plenitudo, & ex
humorum ætus, misso enim sanguine, & super-
fluum sanguinem euacuabimus, & æstum frenan-
tes ægris occasionem subrahemus multae acris tra-
hendi, neque periculum impinet tantū colapsus
vitiū. At cum pestis contagio aliunde delato
alioibi serpit, qualescūque sit primum principit
motu in seipide potest ijs omnibus perpensis, &
observatis, quae in reliquis febribus putridis con-
siderari solent, quod eadem vigent indicationes.
Consensit Galen. 3. in primum Epid. 20. in Ori-
tone, & 3. in tertium cap. 76. in Galen. Larissa in
quibus valuit missio et sanguinis conuenire, cū in
peste laboraretur tertio in tertium Epid. in proter

Sanguis in
quartana
quādo ex
dextro bra-
chio extra-
hendus.

In peste se-
pe mitti
potest san-
guis per se-
ctam ve-
nam, &
quādo.

Quin & Ruffus referente Oribasio. 6. synops. 25. in peste, ubi sanguis abundauerit, vel ubi alij humores admixti sint sanguini, fiatque genus aliquod plenitudinis, iubet esse secandam venam; Idem. *Æt. ser. 5. cap. 95. & Paulus lib. 2. capit. 36. ex Ruffi sententia. Ex Arabibus Auer. lib. 3. Theis. tract. 3. cap. 7. Rasis 3. cont. trac. 13. cap. 2. & libro de peste cap. 6. & Auic. lib. 4. fen. 1. tract. 4. cap. 4. ut ij satis esse possint aduersus Fracastorium, & nouitios aliquos, & si magni nominis. Neque verò facit negotium, quòd hausto veneno sanguis ex vena non detrahatur, ne bonò sanguine ex venis euacuato, in venas trahatur, & per sanguinem dispergatur, non secus quàm de secta vena crudis in venis existentibus humoribus: Dispar enim omnino est ratio, nam haustum venenum quàm primum est vacuandum, dum in ventriculo, & primis venis continetur, quod vel vomitu, vel purgatione fit, venæ sectione fieri non potest, quia sanguis bonus in venis existens detraheretur, venæ verò inanità suggerent, & attraherent ad se venenum in ventriculo, & mesenterio còsistens; quò nihil perniciosius esse potest; Quare Diosc. lib. 7. de curatione ab hausto veneno agens, non meminit venæ sectionis; quem secutus est *Æt. ser. 13. c. 45. & Paul. lib. 5. cap. 28. At in febre pestifera venenum, siue materia pestilens non consistit in ventriculo, aut primis venis, sed iam inest in venis cum sanguine commixta; proptereaque detracto sanguine par illius materiæ pestilentis simul cum sanguine inanitur. Hinc Paul. lib. 5. cap. 2. dixit, veneno in venis existente sanguinem esse detrahendum; Dispar igitur est ratio curatæ hausti veneni, & febris pestiferæ euincendæ.**

33. Cauēdū tamē ne in Rasis opinionē, & aliorū Mauritanorū sentētiā eamus, qui in aliqua peste ad animi vsq; deliquiū sanguinē detrahunt; cū in peste potiūs quantitas minor esse debeat sanguinis detracti, quā in alijs febribus putridis, quod vitales vires in ea magis, & faciliūs concidant.

In peste sanguis ad animi deliquiū nō mittendus.

34. Quinimō ne detrahendus est sanguis per seclā venam in brachio, si morbus iam inualuerit, quod vires, quę, si in principio missus esset sanguis, vegetiores factę essent exonerata ab onere naturę, iam ex virulentia fractę sint, & propter eā resistentibus magnę putredini, & alexipharmacis potius erit agendum.

In peste solum in principio mitti sanguis debet & cur.

35. Quid verō erumpentibus, aut eruptis maculis illis, aut pustulis? an mittendus erit sanguis; an potiūs expectandus exitus naturę; an iam eruptis? Ego sanē dūm operatur natura à principio sum spectator, mox si segniter id agit, & plenitudo magna adsit, & feruor humorum, euacuo sanguinem secta vena, & sæpē mitescit morbus, æstus imminuitur, validusq; reliquum ad cutim expelli sæpē animaduerto. Neque enim periculum illud impendit, quod vulgus etiam medicorum timet, & aded exhorrescit, ne scilicet humores ad cutim impetentes, aut delati retrahantur à circumferentia ad centrum; quod missione sanguinis fieri tanquam certissimum assumunt, & rāquam assertum à Gal. 4. tuend. val. 10. Missio enim sanguinis per se potiūs sanguinem à centro ad circumferentiā reuocat, vt experientia docet, & Gal. apertis verbis tradidit 4. de tuenda val. 4. quod si oppositum cap. 10. eiusdem libri asserit, id de multa sanguinis euacuatione per accidens intelligendum est. Cum enim per sanguinis mediocrem euacuationem,

Maculis; aut pustulis erumpentibus sanguis secta vena potest euacuari, & quādo, & quomodo.

Sanguinis
missio co-
piosa per
accidens à
circumfe-
rentia ad
centrum
trahis.

Anthraci-
bus, & bu-
bonib. ap-
parëtibus
secunda ve-
na, & quo
modo.

nem, sanguis qui in venis internis repitur, ad ex-
terna, & extra corpus reuocetur, ut in internis in-
flammationibus manifestum est; si vltreius progre-
diatur euacuatio, cum interne illae magnae venae
exinaniantur, natura provida, ut partes maioris
momenti destituta remaneant sanguine, ex acci-
denti, & secundario à carnibus, & venulis ambitus
sanguinem iterum contra ad interna retrahit. At
si mediocris fiat euacuatio, tantum abest, ut missio san-
guinis per sextam venam, ledat, aut reuocet, ut docue-
rit Gal. 6. Epid. sect. 2. com. 30. in latissimis pustulis
Simonis cuiusdam sanguinis missionem maxime futu-
ram proficua. Neque dicant Oribasii 7. synopses 7. &
3. ad Euphr. 31. dum haec verba ad verbum recen-
set omisisse sectionem venae; ut proinde censeant ad-
ditum esse in textu Gal. cum in omnibus Gal. codice-
bus illa particula reperiatur, ut potius ab Oribasii
collectore omissam per oblivionem dicere possi-
mus; aut aliud de sumpta verba illa esse, cum eadem
difficultas in purgatione etiam subit, quam opi-
tationem confirmavit Aet. 2. Quasi seruat. cap. 126.
pustulas buè vrbices in principio pestiferae febris
apparentes sanguinis missione cutanea.

36. In anthrace, furunculo, & bubone, potissi-
mum si in emunctorijs cordis, aut cerebri hant, ni-
hil esse praestantius cognoui remedium, si viris co-
stent, & in principio versentur, maxime si plentis-
simo, & sanguinis copia adsit, sanguinis euacuatio-
ne, tum ratione febris pestiferae, tum ratione mor-
bi particularis: cum enim hant à sanguine crasso
adusto bili flauo admixto, quid aequè sanguinem
euacuabit peccantem in toto corpore, tum, & do-
lorem illum intensissimum mitigabit, qui sepi-
us vires deiecit, maxime cum purgum in quibilibet ob-
tulerit,

aut erit tū, & materiā euacuatiua reuulſione ē par-
te retrahet? Scio hac in re, vt & in ſuperioribus ex-
perimētus certari, & cōtrarijs quidē. Ego verò in
peſte illa inſigni 1575. & 1576. noſtrę huius magnę
civitatis profiteri poſſū ex beſtiorum medicis, qui-
bus peſte inſectorū cura erat demādata, inter quos,
& ego vpus erā, cū vnus, aut alter venę ſectiōnem
in ſuis agris auerſaretur Fracaſtorij, & aliorū dog-
matibus inſiſtens, nec ex ſentētia curationes ſucce-
derēt, mutata ſententia aliorū ex ſolis, & felicito-
ribus ſuccēſſibus vtriq; excitati, quā præſtaret ſan-
guinē euacuare tandem cognouere: Vnde etiā cō-
muni conſenſu in peſte huiusmodi nobile reme-
dium nullo modo prætermittendum eſſe decreue-
runt, modo ſtatim adminiſtraretur, & pauciori ma-
nū, eaque ad eſſent, quę in eo remedio adminiſtrā-
do perpendenda ſunt. Erat autem non ex aeris
corruptione vniuerſali peſtis ea, ſed contagione,
& cōmunicata, & ſerpēs, ſalubri alioqui, & cęlo, &
anni cōſtitutione ſaluberrima; & rerū huius, quę
ad victū faciunt, maxima aderat abūdantiā: corpō-
ra autē noſtratia verē ſucci plena cōſtitui poſſunt.

37 Caueant tamē ne ſemper ex eadē, aut ve-
na, aut parte ſanguinem hauriant, ſi enim poſt au-
res parotides exoriantur, aut ſub axillis bubones,
aut anthraces, furunculiue in tronco ſuperiori eru-
perint ex brachio eiſdem partis ſtatim tōdetur
vena. Quod ſi in inguinibus bubones erumpant,
& inflammatoriū dolorē progignant, in talo eiſ-
dem pedis ſecta vena ſanguis euacuabitur. Si verò
anthrax, aut furunculus apparuerit, ex oppoſito
euacuabitur illa enim ſectiōne venę, & naturā bene
re leuabimus, & manus ad iuices naturę porrigē-
mus, vt ad emundatorium illud humores decedat,

cum

407. 11. 7

11. 11. 11

11. 11. 11

11. 11. 11

Anthraci-
bus, & bu-
bonib⁹ ap-
parētibus
in peſte vn-
de mitten-
dus ſan-
guis.

11. 11. 11

11. 11. 11

11. 11. 11

11. 11. 11

11. 11. 11

11. 11. 11

11. 11. 11

cum enim à corde plurimum recedat, vidimus plurimos ex bubone in inguinibus curatos: paucissimos autem si post aures per parotides: vt ferè nullos si sub axillis materia detrudebatur. At si anthrax enascebatur in dextro puta crure, euacuandus erat sanguis ex sinistro; ne maiorem molem, materiæ ad locum affectum traheremus, vnde, & inflammatio maior fieret, & dolor intensissimus, vndè vires collabascerent; præstat igitur in contrarium reuellere euacuando, simulq; à principibus partibus virulentiam retrahendo. Doctrinam hanc licet colligere ex 6. Epid. sec. 7. tex. 1. vbi dicit in angina pestilenti se venâ secuisse in cubito.

Scarificatio crurū in peste saluberrima

38 Sed cum in peste omnia sint in præcipiti occasione posita, & aliquandò medicus statim non auerfetur, aliquandò etiam venæ sectio ab aliquibus non admittatur, cupere ad manus artificis habere, qui scarificatione malleolorū sciret administrare; Cōmodum. n. esse remediū censuit Appollonius apud Oribas. 7. collect. c. 19. & 20. quo etiā cū aliquandò peste esset correptus, asseruit esse sanatū, quod remediū prò plenitudine curāda quasi venæ sectioni æquiparatur à Gal. 4. val. tuend. 4 & 20. Quæ actio omninò diuersa est à nostra scarificatione in loco cucurbitularum, vt constat ex Oribas. 7. collect. 18. ex Antylli sententia, si quis caput illud, & modum exercendæ illius operationis considerauerit; & quæ à doctissimo Prospero Alpino de hac re scripta sunt lib. de medicina Ægyptiorum, quidquid contrā senserint Auic. 1. lib. Fen. 4. cap. 22. & ceteri Arabes medici.

Cucurbitule scarificatio

39 Verū si iam aliquantò progressus sit morbus in pestilens, aut nesciamus an vitales vires firmæ satis sint, quod aut vereamur ne per tentatis acrijs

terijs pestem in nobis contrahamus, aut lege cautum sit, ne prius quatuor diebus medici pulsus arteriarum pertagat, ut apud nos constitutum est, certe solebam ego in nostra peste aqua calida ablutis furibus in interna parte cucurbitulas iniungere cum profundiori scarificatione, atque ita euacuare sanguinem ad sex, aut octo uncias pro signis, aut plenitudinis, aut robore virium; quamvis, n. immediate sanguinem ex venis non detrahant, sed ex carnibus, necesse tamen est, ut carnibus inanitis, ex venis subeat alimentum, & consequenter etiam totum inanitur.

40 Quinimò, & frequentius, & tutius est præsidium hoc, cum & euacuet sanguinem citra multam spirituum exolutionem; ab hepate autem, & corde ad longinquam partem virulentiam auertat, nec verum est, quod non sint profuturæ; quia nimis distent à corde tibiarum; nam inanita plenitudine totius corporis, ipsas quoque cordi vicinas partes necesse est inaniri.

41 Quid si inanito corpore urgeant symptomata, & exanthemata lente prorumpant, cor verò angustius præmatur in peste, & animi adsint deliquia, aut insignis aliquis dolor capitis urgeat, aut simile symptoma, quod sæpenumero in peste contingere videmus, erit à nobis præstandum? An cucurbitulæ dorso erunt admovendæ, quod adeò controuersum inter medicos video, alijs illas omninò exhorrescentibus, alijs passim, & in quocumque casu illas in usum ducētib; Censeo, si nihil aliud urgeat, non esse temerè, & sine distinctione admodum, sed negotium naturæ esse permittendum. In illis autem casibus, tum scarificatis, tum sine scarificatione uti nos posse, & debere iudico; neque periculum subest, ne versus cor attrahantur humores

catæ ali. 2
quandò vi
cariz se-
ctionis ve
ne.

Cucurbitulæ cum scarificatione in suis in peste frequētius in usu veniunt.

Cucurbitulæ in dorso quādo applicandæ, & quādo non.

pro-

propter totius corporis præmissam iam euacuationem: potius enim è corde in superficiem humores euocarentur, cum manifesta internarum partium vilitate.

Vesicantia in peste aliquando in usum duci potest, sed raro, & quando. Vesicantia, ut in hunc usum antiquis in peste non sunt usitata, ita, si extremis partibus potissimum furis post vniuersalem corporis euacuationem applicentur, non spernerem, modo est usille in corpore non adsit, peccetque potius serosus humor, & pituitosus, sic enim ad inferna virulenti humores à principibus partibus retraherentur.

Vesicantia in febribus pestilentibus si in peste in usu duci non debet, sed in febribus putredinis habita, ratione ex exsiccantibus aliquo addito, & corde non mediocriter roborato, non in usum ducere; sed non secus quam hinc febres putride curandæ erunt, excellentissimè putredinis habita, ratione ex exsiccantibus aliquo addito, & corde non mediocriter roborato, non in usum ducere; sed non secus quam hinc febres putride curandæ erunt, excellentissimè putredinis habita, ratione ex exsiccantibus aliquo addito, & corde non mediocriter roborato,

Vesicantia partibus superius comatosis affectionibus & lethargo conueniunt. Anima quædam tamè in ijs febribus improprie pestilentibus, quæ in vire pestiferis ratione symptomatum, potissimum lethargi, & comatosorum affectuum nullum esse præstatius remedium vesicantibus ipsis aut partibus brachiorum versus humerum, aut etià spatulis applicitis serosos, & humores, & frigidos cerebri opprimentes citò, & facillimè, & a terantur, & ex toto corpore euacuantur, constat hoc ex Antylli refectione. Oribasii. 10. c. 15. in pestilentibus affectibus maximè se penumero esse in sonu propensionis, in qua sinapismos conuenièter scribit maxime in lethargo, & magna sanè ratione, nam in lethargo cõfluxus fit materię ad caput, unde opus est reuulsionem, cuius perpetuò dormiari, & pinguere simili grauamine me dicamotorum corpus potest. Idè dicitur. Act. & ex Ar.

Chigene fer. 13. et 18. & Paul. Aegin. li. 7. c. 19. Hinc
Aretaeus medicus huius; & Gal. antiquior lib. 1. de cu-
radis morbis acutis c. 2. Curatorus lethargū dixit
et huius vitiis esse verberandas; aut etiam valentio-
ribus medicamentis esse utendū, deniq; et sinapi.
Cum verò ij oēs omnia prius ceteri voluerint, quā
ad vesicantia veniretur, ostendunt quanto in erro-
re receptiores versentur, qui protinus in morbi
initio vesicantia esse administranda censuerunt.

45 Alius est casus, in quo toto in pestilentibus ve-
sicantibus uti possumus: cū vniuersū corpus exte-
rius aiget, & agere cale fieri potest, nō quidē si re-
generatio fiat ob viriū extinctionē; tūc nō instan-
ter nobis opus est: sed si ob alias causas, tūc ad mā-
nistrari posse docuit Aetilius apud Oribas. lib. 10.
colle. c. 13. & Aechigenes Aetio teste sum. 3. c. 181.
tūc q; & tibijs; & brachijs sunt ad mouēda Oribas,
referente loco adducto; & Paul. Aegin. lib. 6. c. 13.
quibus locis constat duobus solis ijs casib; in acutis,
& peste vesicantibus nos uti posse, & hoc est quod
Oribas. ex Ruffo lib. 6. c. 25. docebat in peste calo-
rificis quādōq; esse utendū ad euocandū calorem ex
profundioribus corporis partibus ad superficiē: v;
& Aet. ser. p. 199. & Paul. lib. 2. c. 36. vnde neq; in
omnibus pestilentibus; neq; semper in peste vesi-
cantibus utendū censuerūt magni ij medicij; sed aut
in soporosis affectibus, vel cum externa aigent, &
interna aestuant cū nouatores ij semper, & in omni
peste, pestilentiq; febre; quib; & si Deo placet, in
principio vesicantia adhibeant, sed nō est mihi in
hac re tempus conterendū cū a doctissimis viris res
nec absolūtā; & ex professo sit pertractata; & a no-
bis in libro de peste annis iunioribus, dūm totus
in ea curandis in patre meo calamitate versaret,

Vesicantia
in princē-
pio febrū
pestilētia-
liū nō cō-
ueniunt.
Vesicantia
in pestilen-
tibus vbi
corpus al-
get vtilia.

Vesicantia
in pestilen-
tibus a re-
cētioribus
pestimē
passim v-
surpata.

composito, disputata, quem librum amanuensis meus homo exterus cum emendatum meo iussu transcripsisset ad editionem suffuratus est; nescio quo consilio; cum sciret apud me in schedis ea omnia remanere, licet multis in locis defecata.

**Purgatio-
ne uten-
dum in pe-
ste, & cur.**

46 Evacuatio pravorum humorum, & caco-
chymiae per medicamentum purgans assumptum
non minus, quam sanguinis evacuatio in peste co-
uenit, & fortasse saepius in usum ducitur: ut enim
venae sectio nunquam in peste, quae ex prauis succi
cibus fit, conuenit, & non ita saepe in ea, quae ex cor-
rupto aere, saepissime in ea, quae contagio serpit;
ita in ijs omnibus Purgatio in usum venire potest
licet multo rarius in ea, quae per contagium vaga-
tur; quod saepenumero virulentia communicetur
hominibus sanis, & optimis humoribus praeditis;
quibus si medicamenta purgantia exhibuerimus,
& carnes colliquabimus, & bonos humores eua-
cuabimus, spiritus exhauriemus, & denique vires
vitales destruemus: Quod si refectum prauis hu-
moribus esse corpus coniectabimur, purgatione
omnino opus esse dicemus, in ea vero, quae ex in-
gestis malis cibis fit, purgatione omnino opus est;
licet etiam ratione virium maxima adhibenda sit
cautio. In hanc opinionem medici omnes graeci,
Arabes, & Latini venerunt, locis adductis ad de-
monstrandum venae sectionem conuenire: inter
quos Gal. 1. de diff. feb. 4. vnus ex antiquis Celsus
lib. 3. cap. 7. & ex recentioribus pauculi medica-
menti uti purgantibus in peste iudicarunt inuti-
le, quod non putredinem, sed venenosam qualita-
tem simplicem in peste subesse putarent, quod ve-
neni naturam medicamenta propemodum omnia,
& igneam naturam participare, cessant; quod ali-

me

ui

ui fluor ijs concilietur quo plerosque in peste illa interijisse testatus sit Gal. 3. in tertiū Epid. 58. cum neq; Celsi auctoritas præponderare possit tot magnorum virorum auctoritatibus; neque recentiorum illorum rationes conuincant, quod ætate nostra tot medicamenta inuenta sint, quæ neq; venena sunt, aut venenatam naturam participant, neq; excessu caloris igneum febris æstum adaugere, neque etiam alui fluorem concitare solent: cum non in omni peste symptoma hoc superuenire scribat Gal. Sed in ea, quæ suo tempore vagabatur; In quam pestis constitutionem si quis inciderit, caute se geret, & ijs uti poterit, in quibus vis aliqua inest, & adstringendi, & roborandi.

47 Inuento auxilio in morbis, illius exhibendi occasio est inquirēda; quod maxime in peste est obseruandū: cum in secundo aph. docuerim Hipp. & Gal. vel statim ab initio, vel postquā maturuerint humores, coctiq; sint, in declinatione humores esse purgandos. Difficultas in hoc casu maxima esse solet etiā inter doctissimos. Ego sanè quid præstiterim in hac nostra pestilentia liberè dicā, & quibus ductus fundamētis, cui ēt euētū felicē successisse, sanctè posū profiteri, quantū pestis effrenis rabies cōcedere potest. Euacuandū igitur in principio statim, aut secta vena censeo saltē secunda die, si putridotū, aut malorū humorū copiā subesse cognouerimus. Neq; aph. 22. prima sect. quo asseritur cōcocta esse medicanda, & cruda non mouenda, nisi materia surgeat, ratio autemarget nobis repugnare censendum est. Quod ut intelligatur, considerandum solū erit, an sub dictione, cruda, contineri possint humores illi adeo putrefacti in principio febrium pestiferarum. Ego sanè non video

Purgandū
esse in initio in peste
Disputatio.

Peste materia cruda dici non potest.

H

quo

quomodo materia quæ nullâ patitur cōcoctionē neq; alimentālē, neq; impropriā, quæ putridę materię conuenit, cruda dici possit. Crudum. n. & coctum correlatiua sunt, ita vt crudū sit, quod coqui potest, sed nondū hanc perfectionē per coctionem est assecutum: Atqui si gradum eū putredinis assecutus est humoris, vt pestem gignat, quo maior vix dari potest, vt iā veneni naturā induerit, & ad benignum eiplus reduci non possit, certē cum nunquam verē crudum dicere poterimus; aut coctionem eius pro purgatione esse expectandam. Eoque magis quod maiori ex parte materiam hancurgentem, esse obseruatum sit, quare cū turgentem materiam excipit, vtrique pestiferam hanc materiam exceptam esse censendum est. quod sæpenumero prima die turgat, aut proxima die, aut altera turgitura sit. hanc enim etiam per turgentem intellexisse Hipp. constat. 4. aphor. 1. si turgent in acutis eadem die esse purgandum asserentem. At acutissimum morbum esse pestem, in qua materia plerunque turgat, quod æris sæpe sit, ardens; virulenta, quæque vndequeque mora principes partes impetat, quilibet, qui morbos pestiferos viderit, ac diligenter obserauerit, facile concedet: Nos in nostra hac pestilentia sæpenumero vidimus in eodem ægrotante eodem tempore à natura multas, ac varias tentatas esse excretionēs per aluum, per vomitū, per sudores, per vrinas, per cutis efflorescentias, & per carbunculos quoq; & bubones. Docuit hoc Rufus apud Oribal 6. synopsis. 21. & Act. ser. 5. c. 95. & Pauli lib. 2. c. 36. qui adeo varia, & vehementia symptomata in peste dum referunt, nihil aliud representare videntur, quàm turgentem materiam

hinc

Pestis materia turgens sæpe numero.

hinc inde latā, nec certā sedem habentē; Quę si dñ
non venenata est, purganda statim est ab initio, ne
repat ad Princeps aliquod membrū multo magis
tunc euacuanda erit, cū veneni naturā habet, cuius
proprietas est Principes partes petere; ostendūt id
ipsū pestilentes casus, quorū libris de morbis vul-
gar. meminit Hippocr. colligimus. n. materias in
eis fuisse virulētas, & veneni participes, vagas itē,
& certā sedem nō habentes; cū. n. varias sedes pe-
terent, varia et ā symptomata induxisse scribit; in
multis papulę apparebant, quę mox retrocedēte
materia ad internas partēs delitescēbant, quę po-
stēā alia inducebant sua symptomata. Neq; quī-
piam Hipp. obijciat dicentem raro materiā turge-
re; nos autem in peste sepe numero turgere asserē-
re; si namq; considerauerimus pestem rarō eueni-
re; vtiq; materiā raro turgere, & in peste sepe
turgere non esse contraria, aut contradictoria iu-
dicabit; turget enim materia, cū natura ā multa,
aut praua qualitate affecta materia concitata ten-
tat inter initia eam expellere quamuis importu-
nē: scimus autem pestem semper ā praua, & vene-
ni naturam sapiente materia fieri. Non tamen cre-
dat aliquis nos, vbi non turgēat materia, putare
euacuandum non esse: nām cū virulenta sit ma-
teria morbum faciens, & timendum sit ne vltro-
ius procedat reliquos omnes humores inficien-
do, venenique participes eosdem reddendo ex
contactu portionis illius primę ex contagione
acquisitę, purgandum statim erit, ne ad terminū
eum ducantur humores omnes, de quo locutus est
Gal. libro aduersus Iulianum cap. 7. quod vbi to-
tus sanguis putrescit, vel alioqui vitiat, morbi
qui inde oriuntur, curari nequaquam possunt. Ita

Turgens
materia
quomodo
rarō, & in
peste sepe

Putrida
nō omnis
materia
coquend.

quatenus. Non pollicentur medici se omnes mor-
bos ex vitiatō humore, omnemq; putredinem cui-
raturus, sed eos tantū, quibus corpus adhuc vali-
dum est, & vires robustæ: non autem quando san-
guis penitus corruptus, & factus æruginosus, vt as-
sumptū alimentū in corruptelā trahat, & quæ seq-
Cū præterea morbus is acutissimus sit, si declina-
tionē expectare voluerimus inanis omnis nostra
opera erit; non solum quod frustra expectetur co-
ctio quā nullatenus humor potest admittere; sed
quoniam cū declinatio tunc subsequatur, cū ante
à natura extra corpus pulsus fuerit humor, quacun-
que tandem via id fecerit; aut ope medici, aut mis-
sione sanguinis, aut alexipharmacis, & sudorife-
ris, frustra tunc medicus tentabit in fine propelle-
re: non negauerim quidē aliquando expurgandū
esse in fine corpus à reuiujs, vt renutrirī possit, at-
que à reciduis se se vindicare, & præseruatio hæc
potius erit, quā vera curatio. Purgandi igitur po-
tius erunt ab initio humores, quod, cū emenda-
ri nequeant, quā primū expelli debent: nam
apertissimo vini exemplo explicuit Gal. 2. aph. 17. q.
vbi acescere ceperit adhuc vinum est acidum; &
tunc emendari potest, & ad pristinam naturam re-
duci: si verò corumpatur, & naturam propriam
amittat, non amplius vinum est, sed æcerum, & tūc
non amplius ad pristinum statum reduci potest;
Ita sanguis, ceterique humores cū putrescunt,
ad benignum iterū, aut saltem ad conditionem,
quæ nō multū noceat, coctione deduci possunt:
at cū computruerunt, iam naturam mutarunt,
neque corrigi amplius possunt, sed tãquam omni-
nō deleteria statim expelli à corpore debent. Est
insuper præter morbi causam continētē, quæ est

aut

aut in venis propè cor, aut in partibus cordi com-
municantibus, alia quædam vitiosa in ventriculo,
intestinis, & circa præcordia adherens, dolore, co-
lore, astu, nausea, amarore alijsue signis manife-
sta, quæ necessariò quam primum purgatione ex-
pōcit, neq; declinationem potest expectare. Quæ
sane etiam efficit, vt alia ratione in principio etiā
expurgari debeat: nam si in hoc morbo per totum
eius decursum alexipharmacis, & medicamentis
à tota substantia vtendum est, vt etiam ij; qui se-
cūs sentiunt de hac purgatione, cōcedunt, non ne-
cessariò concedent in impuro corpore præcede-
re debere purgationem: hæc namque, vel ipso Gal.
teste lib. 5. de sanit. Tuend. cap. 6. antè non sunt as-
sumenda, quàm totū corpus inanitum fuerit: cum
enim ea vel ita antipharmaca, vel antidota dicantur,
quod totius [vt aiunt] substantiæ diffidio im-
mutent venenatam illam naturam, frangant, obui-
dantque, atque prorsus extinguant, & euacuent à
corpore per sudores, atque cutaneas excretiones;
nemini dubium esse potest in corpus nostrum hæc
minimè præstari posse, nisi prius inanitum fuerit
corpus; non enim ad cor vires suas emittere pote-
rūt, nisi meatus sint expurgati: neq; à corpore per
cutaneas excretiones venenum expellere poterūt,
nisi pariter totum sit euacuatum: quin neq; euacua-
tionem per cutim ullam esse molendam, nisi totū
corpus inanitum fuerit ex Gal. 18. meth. 4. & 11.
meth. 10. at nec rarefaciendum prius quàm sit euacu-
atum. 21. meth. 9. colligitur. At inquit, id fieri
sanguinis missione. Verū quomodo vim argu-
mentis fugiunt, qui illam respuunt; at omnes sal-
tem fatentur in multis non conuenire, vt in peste
ex prauis etibus, & in cæphalitis corporibus, in qui-

Alexiphar-
macis im-
puro cor-
pore non
vtendum
prius, quā
sit expur-
gatū cor-
pus.

bus expectari non potest cōcoctio; faciendū igitur quod iuber Gal. 4. de tūend. val. 4. quod alienū à natura est, vt ad pristinā bonitatem redigi nō possit, protinus euacuetur: Huius sententiæ fuisse Gal. colligere possumus ex lib. 1. de differētijs feb. 4. vbi dicit impura corpora in principio statim esse purganda, & ad sanitatem deducenda, quod manifestis verbis confirmat 2. in 6. de morb. vulg. 29. in Simone, in quo late pustulae efflorescebant, idq; in libris methodi medendi demonstratū esse affirmat, quod vel 5. meth. med. c. 1. 2. cōstat, vbi habet. Ceterū ij in peste faciliē sanati sunt, propterea q̃ praeexficcatū ijs, purgatumq; corpus totum fuerit, quippē quod euomuerint ex ijs nonnulli, & omnibus venter profuerit, atq; cū ita euacuati essent, qui eūasuri erant ijs pustulae, quas exanthimata vocant magis toto corpore cōfestim multae apparuerint, vlcerosae quidē plurimis, omnibus quidē sic, & quibus verbis, vel ecceis manifestū est purganda esse corpora ab initio in peste. Quid n. per purganda esse corpora significat, nisi in principio esse euacuanda medicamento purgante? Nonne praeterea constat excretiones has pestilentes nullas ferē esse criticas, sed symptomaticas, quae in principio, vel augmento accidunt? at nihilominus prae purgatū esse debere scribit corpus, antequam apparerent non igitur expectantē coctionem. Secutus est hanc sententiam Auic. lib. 1. Fon. 4. T. 4. capit. 4. cū inquit, summa curationis huius febris est exsiccatio, & illa fiat cum purgatione, à qua incipere debemus, & Auer. 4. Theisif. trac. 3. capit. 1. qui in principio pilulas ex limbo columbino, aloe, & agarico commendat in peste, & Rasis cum 3. continetis, tituluq; de peste, quos postea secutus est

Aucr.

Auer. 2. Collect. 36. ex recentioribus etiam plerique
 ferè melioris notæ, inter quos Manardus Ferrariensis
 5. epist. 3. & 13. epist. 1. & Victor Trincauellius
 in lib. de febre pestilentiali in hanc venerunt sen-
 tentiam. Quod experientia etiam confirmare pos-
 sum; Mihi enim, & socijs in magna hac pestilentia
 magnæ huius urbis feliciter cessisse, sciunt, & præ-
 fecti sanitatis, & ciues nostri, publicèque etià nos
 laudant pro bonâ, & sedula præstita opera, cum
 purgante medicamento ab initio ferè curationis
 usi fuerimus. Quod, & Gentilis ille Fulginas sibi
 experimento contigisse testatur prima, quarti, ubi
 inquit, Ego vidi socios nostros viros expertos, qui
 in prava pestilentia, prima, vel secunda die, vel in
 quarta ad summum quam citiùs poterant, dabant
 pharmaca euacuantia exolendo materias, sicuti
 rhabbarum, vel agaricum, & aliquando dabant
 medicinas vigoratas cum paucâ Scammonea. Et
 vidimus plures euasisse per manus istorum, quam
 per manus illorum, qui non purgabant, nisi
 cum leuibus clysterijs, & quandoque sola cassia.
 Neque rationes, quas contra adducunt, multum
 videntur, quòd enim aphor. vigesimo secundo obij-
 ciunt, iam docuimus aut suburgente compre-
 hendi; aut sanè verè materiam illam crudam
 dici non posse, quòd nullam coctionem admittat.
 Neque caliditas medicamentorum verenda est,
 quæ non auocauit Gale. ab eorum usu ob maio-
 rem utilitatem, in surgente materia; minus autem
 nos impediēt in pestilenti, in qua sepe minor estus
 subest, potissimum cū mitiora quàm plurima me-
 dicamenta, minus calida, vel vix caliditatem attri-
 gentia, & simplicia, & composita nostris ijs tem-
 poribus sint inuenta. Neque verenda sunt mala,

& incōmoda, quæ sequi docet Gal. tū 1. aphor. 23. 24. & 2. aph. 9. vbi quis crudā materiā in principio, & non preparatis vijs eduxerit: ob maiora, n. mala fugienda in turgente materia, vt non veritus est statim euacuare, ob eandē etiā causā nos in peccatē eadē præstābimus: Neq; a lui profusio, quæ in peste Hipp. æpore vbi superuenirent, mortē inferre solebant, debent nos ab exhibitione medicamentorū in principio detertere: nā, & si in ea constitutione id eueniebat, in alijs nō sēper est cū pestē coniunctū: sed verō etiā nulla vis est argumenti; nā fluxu illo multi interierunt, quod nimis oppressa, ac irritata natura fluxus exoneratē tētabat, sed, & succumbebat, & materia quasi effrenis facta plus iusto fluens vires deijciebat, vnde mors subsequēbatur, at statim purgatis humoribus periculū hoc evitābimus, sed argumentantur præterea auctoritate Gal. 9. de simpl. medicofacult. cap. de terra lenia: vbi inquit, illos, qui terræ lemniz, aut boli armeni, assumptione curati non potuerunt, plerōsq; interijisse. Quasi verō siue manifestis hæc agant qualitatibus, siue occultis in usum hæc tutō duci possint non præmissa purgatione; cū iam Gal. auctoritate constitutum sit anupharmacā, & anridotatō autō exhiberi non posse impuro corpore. Pestifera autem, ac virulentæ materiæ cum veneno cōparatio, quæ probare nitentur in principio nō esse purgandum, nulla est, neq; conuincit. Assumpto enim veneno, cū materia ea in ventriculo contineatur, vomitorijs quam primū expellere tentamus; aut, si id obtineri non possit, emollientibus, lenientibus, vel lubricantibus per inferna subducere conamur. Itā in peste cū primū cor afficiatur, omni ingenio omnipō tentandum est. Anobis

liffima parte illam reuocare, ac quamprimum ex corpore pellere.

48. Caueat autem medicus, ne, quod in Peste, Pestilētes constitutum est, in ijs febribus, quę, quod in signis febres line rem habeant putredinem, quā vulgares febres peste co- putridę, quodq; in aliquibus symptomatibus, pe- ctione ex- stiferas veras æmulentur. Pestilētes dicuntur, quę- pofcunt, les sunt, quę maculas, quales pulicū morsu, aliasq; nec in pri- cutis efflorescentias iunctas habent, idem ob- cipio in ijs feruandū censeri, cum enim eo vsq; non sit in eis- purgandū. progressa putredo, vt ad pristinam bonitatē reuo- cārē nō possint humores, aut sanē cum per coctio- nem ad quandam temperiem, & mediocritatem reduci possint, vt mitescēte eorū ferocia, aut a na- tura, aut arte à medico pelli possint, expectanda, omninō erit eorum concoctio, sicq; non in prin- cipio, sed in declinatione erunt vacuandi.

49. Quamuis autem eorum opinionem recepe- rimus, qui in Peste in principio humores esse pur- gandos censuerunt verē cathartica medicamen- to, inter quos diximus fuisse Arabes, & inter hos Zoarem, & Auerroem, recipi tamen horum duo- rum opinio non debet, qui validissimis vtendum, & calidissimis medicamentis censuerunt, nam Auenzoar 3. Theisr. c. 4. cōmendat medicamen- tum ex euphorbio, & aliud ex fimo columbino. Auerr. vero 3. collect. Cocchias exhibet. Medio- cria enim nec impensē calida potius in vsum duci debent, tum simplicia, tum composita, in quibus etiam si scammonij, non nihil excipiat, adeo ta- men a ijs ingredientibus corrigatur, vt ad medio- critatem reducat.

50. Virrū stibij, quod rātopere probatur aliqui- trū in pe- bus nullo modo admitti debet, quod venenata sua ste pessimū quali-

Subij. vi.

trū in pe-

ste pessimū

quali-

qualitate maiorem in humoribus inducat malignitatem, & ferociam, tum, quod experientia compertum sit infelicissimum evenire omnes in hac nostra pestilentia, qui consilio empiricorum eo vti sunt, ad vnum interijisse.

Pelle laborantib. nō sēper conveniūt purgatio, & sanguinis missio.

γi. Neq; tamen is ego sum, qui multorū practicum et errorem sequar, utriq; hoc magnū auxiliū in peste, vti & in reliquis febribus putridis exercentiū, cū Hipp. altero solūm vtendum suadeat aliquandō, aliquandō autem utroque, aliquandō autem neutro.

Sudorum puocatio in Peste in principio pessima.

γa. Sudorum in vera peste, pestilentibusq; etiā alijs febribus promotio, si natura dūce suscepta fuerit, vixura est, & per placet, itā displicet omnino cū natura prorsus desit, inersq; nullatenus munere suo fungitur, videturq; malo propē succūbere: Intēpestilina enim, & audax nimīū est eorū curatio, qui miseros agrotātes frustrā fatigāt, aliās excitatis toto corpore sudoribus, aliās adhibitis cucurbitulis, alione quouis *ἐκκυστήριον* auxiliorū genere, quod aliud nihil faciāt, quā inaniter egrotantiū corpora vexare, incertaq; pro certa curationē suscipere: Quæ omnia otiosorū sunt hominū, atq; vires, valetudinē, vitāq; alienā pro nihilo habentiū; quantiūvis igitur robustæ fuerint egrotantiū vires, nunquam admittenda sudorifera hæc ab initio crediderim, nec medicus Galenicus unquā maturabit expulsionē per curam tentare, expectabit potius, dū aliquid ipsa per se natura molatur, animadverteretq; curiosē quorsum ipsa vergat, quæ parte insensa materiz quærat exitum, alioqui naturæ motus anrevertere, incerta pro certis aggredi, contraria moliri, & ab incepto reuocare non sine vitiō discrimine possit: quātū ne ita

Sudores in peste quando promouendi.

tim quidem per eas partes euacuare debet, sed solum vbi imperfectè operetur natura.

53. Theriaca, & Mitridatica magna compositio, vt semper, nisi aut æstus ingens, aut in tēpore, aut in corpore fuerit, ad præseruanda corpora à peste à me cōmendantur, ità pro eadē curanda non ità frequēs earū vsus esse potest: quamuis enim ad cohibendum excellenrē illū gradū putredinis, ac ad extinguendā virulentia conuenirent, si tamē ardens febris subit, æstusq; maximus in humoribus, & corpore, non ita tutò concedi possunt, ne dum veneno obstitimus, ità febrilē calorē augeamus, vt vel ex eo solo mors ipsa subsequatur, quacunq; verò de causa mors subsequatur, idē est. Obseruandū igitur erit, si præualeat bilis in corpore, in eaq; putredo illa virulenta sit concitata, præstare semper postposita Theriaca, & calidis, siccisq; antidotis alijs cæteris vti, quæ refrigerandi, & siccandi facultate præter alexipharmacam prædita sunt, vt acido citri, lapide bezahar, margaritis, & similibus. Si verò quod in plurimis obseruauī, calor febrilis sit mitis, nulloq; modo æstuaus, peccetq; aut pituita, aut melancholia, in ijsq; concepta potissimum sit putredo, virusq; indē enascatur. tutò & Theriaca, & Mitridatica compositione, & similibus antidotis vti licebit, quibus, & si calor febrilis non nihil adaugeatur, maior tamen erit ex illorum vsu utilitas tum in euincenda vi veneni illius, tum in attenuanda materia, & ad eam propellenda.

54. Vt lapillis præiosis, & gemmis non omnino fidē detraho, Zaphiro, Smaragdo, Hyacinto, &c. quòd multis, & magni quidem nominis viris eorum vsus receperis sit, & in multis, & magnis antidotis receptus alio sciam, vti in electario de gem-

Theriaca
in peccatū
vendum, &
quomodo,
& quando
abstinendū.

Lapillorū
pretiosorū
vsus neq;
oīō reijciē
dus, nec
passim ve
fit, recipiē
dus.

mis dicto, & alio à Conciliatore nomen sortito, ita nec eisdem multum tribuo ob eas rationes, quæ à doctissimo Io. Baptista Syluatico Primo medicinæ professori in Academia Ticinensi amico singulari in lib. huic rei dicato propositæ sunt.

**Puluisculo
gũ cardia-
corũ vñs
non cũ ci-
bis, sed ie-
iuno sto-
macho re-
cipiendus.**

55 Si quando tamen in vñm medicum ducen-
di sunt, communis error erit fugiendus, ne antè ci-
bum immediatè eiusmodi puluisculi exhibeantur,
vt nec margaritarum: ex illis enim cibo commix-
tis cementum quoddam obstructionibus gignen-
dis apertissimum in stomacho generatur: Præstabit
igitur, si modò ijs vti voluerimus immediatè an-
tè dulcoratas potiones, aut stillatarios liquores sũ-
mo mane solitos propinari illos concedere.

**Auri vñs
per os lau-
dandus.**

56 Auri vñs, & ad animi marores, & ad atrabi-
larios affectus antiquis, & recentioribus cõmen-
datur, quòd, cũ spiritus recreet, cor nobilissimũ vis-
cus roborare potest: neq. n. Desseñij opinionè re-
cipio, qui non nisi in aurea Alexandrina recentiorũ
Græcorũ antidotũ aurũ recipi, aut proponi asserit;
cũ alioqui, & Nicander antiquissimus, & Poeta,
& Medicus auro per os asũ pro in Alexipharmacis
vtatur. Et Diosc. lib. 5. c. 69. de argẽto viuo, auri li-
matã scobem mirabili esse auxilio scribat. Modus

**Auri per
os assumẽ-
di. Varij
modi.**

verò, quòd vti oportet, est, vel eo in tenuissimũ pol-
linẽ redactò, & cõminuto hoc pacto: Defecauissi-
mũ, & purissimũ aurũ eligatur, & cõtusum in so-
liorũ formã aqua rosacea aspersa sub Porphyrite,
aut matmore ad linimentũ instar redigatur sunt
etiã qui pãnonicos ducatos, vñ potè ex puriore au-
ro sub lapide pictorũ lenigatos quã tenuissimè ac-
cipiãt. Alij aspero liñeo cõtinuè affricant, & aqua
madefaciũt, in qua descēdat. Quòd si chymica in-
dustria in liquorẽ soluantur, mēsumis igneas in so-

non

nō habeat partes, fortasse magis cōmēdari posset.
 37 Stultū verò mea sentētia est aureas monetas,
 anulos, aut catenas intrā capōnes, iuscula, aut stilla-
 titios hquores, aliosue quosuis coquere cum in his
 nihil aliud absumat, quā multarū manū su-
 dor adhērēs: nihil .n. pōderi penitus detrahit post
 illorū elixationē: nec etiā quicquā aurum aque im-
 primat, nec etiā saporē, odorem, aliudue adiciat.

38 Placentas Iacobi Carpenſis ex arsenici cri-
 stallini partibus duabus, vna autē parte rubri ex al-
 bumine oui, & tragaganthæ mucagine exceptis,
 quas facculo sericeo, aut ex aliqua tenuissimā tex-
 turæ materia obvolutas, & cordis regioni apposi-
 tas, sanos à contagij labe immunes, omninòq; ille-
 sos seruare, ægris verò ad salutē magnū momentū
 attulisse creditū est, neq; recipio, & lōga expientia
 in nostra hac pestilētia ductus oīo reiiciēdas cōsu-
 lo: neq; .n. expiētia cui ij tā operē innitebātur pol-
 liticis respōdit, quinimò grauissima aliquib. sym-
 ptomata induxerūt, vt in aliquib. etiā mortē p̄cipi-
 ti quodā impetu cōcitarint. Vidimus seruos, qui in
 magno illo D. Greg. Valerudinario ægris, & iſectis
 hoc morbo operā nauabāt, & Chyrurgos hac pla-
 cētā alioqui munitos breui fatis cōcessisse, quini-
 mō multosvi huius remedij ī graua adeò sympto-
 mata, animi deliquia, syncopales febres, tremores
 cordis incidisse obseruatū est, vt si p̄ illud vim pe-
 ris effugisse somniarēt, in vehemētiore fortasse ac-
 ridētia, & mortē ex remedio incidisse certò cogno-
 uerint; multa q; exēpla in hac nostra pestilentia af-
 fere possem, nisi, & ratio ipsa id psuaderet, nō .n.
 p̄ aliqui asserūt, cōferre poterūt, q̄ arsenicū occultio-
 re vi venenis tanquā venenū obsistat: cum arse-
 nicū non occultiore vi, sed corrosione constet ef-

Aureas
monetas,
& torques
iuribus in-
coquere
absurdum.

Ex arseni-
co placētē
pro corde
ī peste de-
testandæ.

se lethiferū. Ex quo etiā colligitur nullā eorū esse rationē, qui ea ratione asserunt cōferre, quod con in Peste primò affici solitū veneno sēsim assuefaciat, vnde nec tā repēre, nec sine negotio potest cēca, violētaq; perniciē corripit; cum ratio hęc nullā sit, quod, & experiētiā habeat aduersantē, nec a se senicū hoc modo inter venena cōnumerari possit.

Lentiū decoctum in pens, vt & in variolis improbandum.

§ 9. In variolis, & morbillis curandis cū decoctū lentiū passim apud medicos Arabes maximē cōmendatū etiā apud multos in vsum veniat, cū abusiui potius illū censēā, hoc loco non ab re esse credidi, etiā huius erroris inter medicas istas cautiones meminisse. Arabes igitur omnes scriptores, inter quos præcipui Rasis 18. continentis, & 10. ad Almaforē c. 18. & Auic. 4. can. cap. de curandis variolis ad materiā ad cutim expellendā, & ad euocandas variolas ex lentibus solis, aut ex iisdem, lacha, caricis, tragagato, & huiusmodi decoctum parabant, idq; cetera omnia præsidia ad hoc munus obcupedū parata superate scripserūt; quo etiā multi ex recentioribus in pestiferis, & pestilētib; febribus ad materiā ad cutim propulsandā, ac ad sudores per mouēdos passim vti solēt: Verū nō satis ego coniungere possum, qua ratione lētes, aut sudores promouere possint, aut in variolis, peste, pestilētib; febribus cōcedi; nā si earū naturā rectē consideremus, eas mali esse succi, atq; melancholici sanguinē generare dicemus; in actiuis qualitatibus mediā, in passiuis siccā temperiē in secundū gradu sortiri; in secundis verò qualitatibus variā, imò contrarias habere facultates; nām prima earū adhuc integrarū, & non deglubitarū elixatione fieri alius solet, quod in extrema superficie virtutis irritandi, & deuorandi aium; cū ē contra-

Lentium qualitates.

itera-

iterata decoctio, aut tota comesta aluum adstringat, vnaq; opera collectos in vetriculo, & intestinis succos siccet, vt quæ vires corticis internas, & integrâ lentium substantiâ recipiat, quæ vim habent adstringentē, vehementius tamen lens in cibo sumpta simul cū cortice adstringit, minus verò decorticata. Hæc sunt, quæ de lentium natura ex Gal. Græcis, & Maunitanis scriptoribus colligere potui. Gal. quidē 3. simpl. c. 18. octauo eiusdē cap. de lente, primo de cōpos. medic. local. c. 8. Primo de alim. c. 1. & 18. secundo eiusdē c. 18. & 44. quinto in sextum Epid. 33. primo de victu in acut. com. 18. 4. eiusdē c. 4. & lib. de salub. dieta cap. de lente. Orib. 2. synopl. cap. 2. & primo collect. c. 18. & Aet. lib. 1. cap. de lente. Paul. lib. 2. cap. 79. & lib. 7. cap. de lente. & Aëtuar. lib. de spirit. animal. nutrit. cap. 5. Hos secuti sunt in omnibus Arabes, præterquam in temperamento, quod frigidum, & siccum statuunt, fortasse Hipp. sententiam secuti sexto Epid. sect. 3. tex. 33. vbi lentem frigidissimū cibum statuit, quæ in re etiam à Gal. eo loco arguitur Hipp. quod in actiuis qualitatibus medium tenere idē colligendū sit, quod, & adstringēti, & soluente facultate sit prædita. Cū alioqui duplici ratione frigidum cibum cōstituere potuerit Hipp. primò, quod cū adstringens sit facultas in pluribus partibus, & in maiori mole substantiæ magis frigidum cibum potest constituere; quod si potiones è contrâ ex lente factas consideremus, quæ soluit prima nempe illa coctio validius calefacere dicemus, quàm secunda refrigeret, quod qualitates calidæ facilius in aqua excipiantur, quàm quæ terrenæ sunt, & frigidæ. Secundò fortè frigidissimam statuit lentem Hipp. non ratione quali-

Lens quomodo frigidissima Hipp.

tatum

facum primum, sed quòd, cum humorè, & sanguinem progignant melancholicum, etiam quatenus cibi sunt, frigidissimæ dici poterunt, quòd succum producāt in nostro corpore frigidissimū. Quæ cum ita sint de primis, & secundis lentium qualitatibus statuta, non video quomodo Mauritanorū sententia hac in re admitti possit. Nam, si primum eorum decoctum non delibatis ijs præbeamus, cum alium moueat, potius à peripheria, ad cētram humores trahemus. Quòd si decoctitas, ut Auic. iubet, imponamus, cum tale decoctū valentèr alium suprimat, atq; sanguinem melancholicum reddat, valentèr q; adstringat, atq; obstruat maxime tragacantho, & caricis admixtis quando ad cutim per sudores, vel aliquo alio modo humores virulentos expellere queat, non satis intelligo, cum austera qualitas, quæ in lente perferitur etiā Gal. teste 3. alim. 13. in terrea maxime parte cōsistat ex Gal. 5. de simpl. medic. facul. 6. 20. Vnde adstringēti qualitate, & obstructions augebit, & crassitiem humorū, qui ex ea generantur; magis impinget, præterea si crasū, & melancholicum succum generat, si flatulenta est, & earatione sæpenumero morbos committiales excitat; ut quid in peste conuenire vllus vnquam affirmare audebit? Quæ ratione etiam ex tragacantha, & laecha decoctum, aut syrupus ab Auic. paratus ad materias ad cutim propellēdas in variolis reijci debet quòd humores noxios potius intus obsepiat, quàm foràs expellat, & corporis poros obstruat, non laxet.

128

LVD OVICI SEPTALII

MEDIOLANENSIS,

ANIMADVERSIONVM,

& caurionum Medicarum,

Liber Sextus, conti-

nens eas,

*Qua ad morbos particulares à capite ad mem-
bra naturalia pertinent.*



In capitis dolore ab aestu, sole, igne,
& similibus curando, cū oxirhodina
in vsum veniant, & frontalia, illa
semper magis laudantur, quæ ex al-
to delapsa super futuram corona-

lem decidunt, maxime si ad interna, & cerebrum
intemperies peruenierit, quæ aestate actu frigida
esse debent.

2 In istis stuppis, vel duplicatis linteolis ap-
plicandis caueant, ne crassiores applicentur, aut ex-
siccare parti nimis adhaereant, contrarium enim
effectum pariunt, excalesciendo, & insensibilem
evaporationem prohibendo.

3 Oxirhodinis narcotica nō misceantur, vel le-
niora: frontalibus autē etiā valentiora misceri pos-
sunt: ad cerebrū enim vix, & refracta ut per hanc
partē perueniunt; per illam verō futura viam pre-
bente, integris viribus ad cerebrum perveniunt.

Oxirhodi-
na in capi-
tis dolo-
re profunt
magis si ex
alto deci-
dant.

Oxirhodi-
na applica-
ta ne sicce-
tur nec ex
crassa ma-
teria appli-
centur.
Oxirhodi-
nis narco-
tica vix ad
miscenda,

Narcotica
in capitis
dolo-
re ra-
tione dolo-
ris nō adhi-
benda, sed
aliqñ rōne
vigiliarum
Narcotica
in dolore
capitis per
se p os nō
assumēda.

Refrigerā-
tia insigni-
ter quē ca-
put nō se-
rant.

Dolēte ca-
pite ex in-
tēperie ca-
lida aceri
portio in
oxirhodi-
nis sit par-
ua.

Acetum in
oxirhodi-
nō sit acer-
rimū neq;
ex potētissi-
mo vino.

Dolore ca-
pitis ex in-
tēperie ca-
lida sine
tūmēte ma-
teria tota

4 Quinimō in oxirhodinis, & similibus nun-
quam narcotica admiscenda esse censeo ratione
dolorum, sed cū vigilie inde succedant, unde
maxime vires collabascant, in vsum aliquandō ve-
nire possunt; sed tamen futuris aut nulla, aut debi-
lia applicari debēt, sed fronti potius, & tēporibus.

5 Multoq; minus somnifera hæc per os erunt
sumenda in intemperie calida sine materia ratio-
ne doloris, cū n inde nullum vitæ impēseat peri-
culum; nec vllus sibi ob capitis dolorē manus in-
tulerit teste Gal: vix aurium, & oculorum dolo-
re; ob diuturnas tamen vigilias sumi poterunt.

6 Animaduertendum autem aliqua esse corpo-
ra, quorum cerebrum ferre non potest vsum insi-
gniter refrigerantium: Pueri ob excessum humi-
ditatis, ne congeletur, aut incrassetur, indeq; in
morbos comitiales, & similes incidant, tūm, & ob
subtile nimium carnū; senes ob imminutum ca-
lorem, & excrementorum copiam; mulieres mol-
les, & candidæ; & qui catarrhis sæpē tentantur; &
qui laxas nimium habent suturas ex ijs sunt.

7 Aceti pars in doloribus mitigandis ex intem-
perie calida sine materia, nō maior sit quarta; cū
nullus hic sit vsus repulsionis, sed ad refrigerandū
addatur, & ad penetrationem, cuius levis portio
sufficiet, cū n, & calidæ in eo partes reperiantur.

8 Ob id acetum neque acerrimum sit, neque
ex potentissimo vino, igneas enim multas partes
sic continebit.

9 Oleum ibidem rosatum ex oliuis, in eo dolo-
re calido, maturis sit, ne, si ex acerbis sit, cutim cō-
stipet, ac distillationem impediat, potestum cū
repulsione non ogeamus nulla affluente materia:
in tali enim casu omphacino vti licet.

10 Siroileum rosatum eo anno paratum, & oleum sit eiusdem anni: illud quidem ne rosatum vis refrigerans exoluatur: hoc autem ne ex vetustate calorem contrahat.

11 In dolore capitis à frigida materia, quæ admittiorē reddendū dolorem applicantur, non sint fetentia, grauiue odore prædita, replere enim crassiss vaporibus cerebrum solent; & dolores augere.

12 In doloribus capitis ex morbo gallico errhorū vsus nullus sit: siuē enim ex bile sit, siuē ex pituita putri, vlcera in penitioribus nasi partibus exijs excitantur, & subinde ossium nasi corruptiones.

13 In acutis febribus, si quando vehementissimī dolores capitis superuenerint pulsatiles cum rubore faciei, non statim oxirhodinis repellentibus vtendum, potissimum signis coctionis presentibus: sæpē enim superueniunt instāte crisi, & sanguinis e naribus profluuiū proficuo: quo in casu si in frigidantibus repellatur, optimo opere naturæ impedito, aut augefcit morbus, aut in cerebro firmatur materia, & cerebri morbos inuincibiles parit.

14 Quod si etiam crisis immineat dolore magno superueniente, sed non per sanguinem narium sed per vomitum, quod quomodo discernatur ex lib. de crisi colligi potest, tunc repellentibus, quin & adstringentibus vii licebit, ne per vomitum cerebro repleto dolor per idiopathiam reddatur.

15 Non recipienda est communis multorum consuetudo pilulas ad humores à capite trahendos institutas exhibentium statim à cena: aut enim cibos corumpunt, aut illorum vis retunditur, aut simul cum cibo e ventriculo effusa sine suo fruantur: Præstat igitur, aut incensatis concedere

tum sit ex oluis maturis.

Oleū in oxirhodinis rosatū sit recens.

Fetentia nō sit quæ capiti applicantur.

Errhorū pernicioſa in doloribus capitis ex morbo gallico.

Doloribus capitis etiā vehemētissimis imminente crisi

fugienda repellentia.

Crisi imminente quādo à capite repellendum.

re repellendum.

Pilule à capite trahendos cibos non dandæ.

aut summo mane exhibere, somno vna, aut altera hora concesso.

Masticato-
ria nō cō-
cedenda in
dolorē ca-
pitis à bile
vel seroso
humore ca-
lido, & sal-
so.
Berhina, &
sternutato-
ria mala la-
borantibus
oculis.

Vesicantia
optima et
capiti ap-
plicata in
vehementi-
ssimis dolo-
ribus, &
contuma-

16. Si dolor capitis sit à bile, vel à seroso humore calido, & salso, tenuiq; masticatoria suspecta erunt; periculum enim imminet, ne in pulmones violentèr influxa, aut phthises producat, aut pulmonum alia vicia.

17. Si item oculi imbecilles sint, & fluxionibus obnoxij, berhina, & sternutatoria fugienda sunt.

18. In contumacibus, & diuturnis doloribus, ubi non cederent alijs, & potentibus quidē remedijs, antiqui, & Græci, & Arabes ad pustulāria, rubificantia, & dropages, sinapismosue attrahētes confugiebant, ut ab internis enocarent crassā materiam, atq; attenuatam per insensibile euaporationem euacuarent; sed cum cutis capitis crassior sit, quā ut liberū humori aditum concedat, neque illa sensu patens fiat euacuatio humorum, ego sepius sum experitus sum præstare de crassis capillis vesicantia imponere aut parti dolenti, aut toti etiam capiti, siu enim attracta ad externa materia euacuatur, maximè ea, quæ tenuior est, & calida, & acris, vix enim, etiamsi diuturnus dolor à crassa materia fiat, fieri potest, ut vehementia doloris adsit, nisi porro aliqua illius humoris sit admixta.

De Phrenitide.

Phreniti-
cis itamē
vena scē-
da.

19. **V**ix in phrenitide lenienti per os assumen-
do ad deturbanda excrementa in ventri-
culo, & primis venis existentia, prima die locus
datur, sed molli clysmate injecto, si eius etiam
commoditas deus, mittendus est sanguis scēta in
brachio vene: cum enim influxus iam desierit, aut
maiori

maiori ex parte factus sit, frustra hoc auxilium reuulsorium tentamus.

20. Caue autem ne in Tralliani, & aliorum errorem incidas, qui cum ob maniacos motus sanguinem è brachio destrahere nequeunt, venam frontis secant; si enim copia adsit sanguinis in laborante, ut in huiusmodi morbo maiori ex parte contingit, tantum abest, ut laboranti opem feras, ut potius, attracto ad partem laborantem sanguine, morbum adaugeas; reuellendus igitur ponus, aut scarificatis cucurbitulis, aut, quod melius esset, venis sedis apertis.

21. Neque etiam in hoc casu ad animi usque deliquium mittendus est sanguis, quod plerisque placuisse video; quod, cum repellentibus frigidis ab initio etiam, si simul refrigerato toto, ac a capite retracto adeo multo sanguine calido, sæpenumero aut phrenitis hectica inducatur curatu inpossibilis, aut lethargus subsequatur.

22. In vena frontis secanda restrictio illa gula, quæ fit, ut vena intumescat, aut non multum sit violenta, aut quam breuissimo tempore perficiatur; ne quodam modo ad superna repulso sanguine, ubi ad cerebrum, & meninges peruenerit, morbum adaugeat, aut sanè, eodem in crassato, eundem magis contumacem efficiat.

23. Cucurbitula, quæ bregmati, fronti, & reliquis capitis partibus post euacuatum corpus affiguntur ad extrahendam materiam, arentes non sint, & cum flamma, sed ex aqua calida, nec longiori tempore hæcant; & si subiacens pars in ruborem abiit, leniter eam scarificabimus, si minus, spongijs ex aqua repente substratum, & eliquatum locum fouebimus.

Phrenitis.
cis si i brachio vena secari non potest, non secanda est ea, quæ in fronte.

Phrenitis.
cis sanguis non mittendus ad animi usque deliquium.

In frontis vena secanda blandè gula adstringatur, aut breui tempore.

Phrenitis.
cis cucurbitulae apponitis, quod faciendum.

Phræniti-
ci in prin-
cipio pur-
gandi:

24. Cauendum in hoc morbo, ne in eorum et-
rorem incidamus, qui ab initio non esse purgandū
consent, sed expectandam esse coctionem, matura-
tio enim putredinem iā factā supponit, quā corri-
gat; quo in tēpore, factō iām apostemate, morbus
euinci vix potest: eodē igitur, vel altero die purgā-
dū, vel ex Hipp. præcepto 4. aph. 20. imminet enim
periculum ne tota illa cferenis materia se in partē
laborantem effundat, apostema perficiat, & vires
prosterнат: neq; tamen crudam etiacuabimus ad-
uersus præceptū Hipp. primō aphor. 22. vel enim
turgens erit, vel nundū putrefacta, sic nec cruda
sanguinis admixta bilis intrā propria concepracu-
la adhuc consistens, vt fecisse Hipp. videmus 2.
acut. 10. cum fluentem humorem ad pleuram sta-
tim ab initio medicamento purgātē subduxit tan-
quam nondū putridū, aut crudum, sed coctum.

Rhabarba-
rū in phræ-
nitide ijs
qui durio-
ri sunt al-
uo nō mul-
tū in vsū
ducedum.

25. In ijs qui aluo duriori sunt, rhabarbaro non
itā faciliē vtendum: si enim simul cum bile nō edu-
citur, cferuescentem magis bilem reddit: facilli-
mēq; supernis partibus ob igneas partes cōmuni-
cari solet; & ob hanc vnam causam Avic. grana-
quatuor, aut sex scammonij medicamētis ex rha-
barbaro indidisse in phræniti de curanda censē-
dum est; quicquid dicant græculi quidam acro-
res Mauritanorum scriptorum reprehensores.

Repellē-
bus solis a,
liquēdo vt
sequuntur
ita princi-
pium.

26. Quamuis in hoc omnes fere conueniāt si m-
pliciter refrigerantibus, solisq; repellentibus pri-
ma tantū die esse vtendum, vt repellatur in-
fluens succus, ætus, & partis, & influētium humo-
rum tēpetetur, dolor sedetur, & afflicta parti ro-
bor addatur, sequentibus verō diebus miscenda
esse aliqua cōsoluentia, sēpissimē tamen aliter fa-
ciendum esse, quod urgeant in augmento adeo

symptomata, æstus, dolor, vigilia, & mania, vt frigidissima etiam progressu temporis in vsum duci debeant, Aræteus admonuit.

27. Cauendum tamen ne nimis assidue ijs vtamur frigidissimis, aut narcoticis: nā dicebat Auer. 3. collect. 1. caput rursū calefit, ac non citrà pericula refrigeratur, periculum enim impendet, ne quē dormire volumus, postea excitare non possimus, vt ait Celsus: sæpè enim in lethargū calamitosum abire solet ex sola mala curatione phrænitis.

28. In topicis, etsi acetum in aliqua portione admiscere expediat, vt, & refrigeret, repellat, & penetrationem adiuuet; neque tamen multum admiscendum est, ne siccatione vigilias concitet, neque acrius, quod calidæ partes, & siccæ nimium præualeant.

29. Neque tamen placet, quod à plerisque recipitur, vt aceti loco acido citri, aut limonum vtamur; nimium enim adstringit, & ob acerbas, terrestresque partes neque peruat, neque admissorum penetrationem adiuuat: quinimò externos meatus contrahendo resolutionem humoris in ahjs temporibus omnino impedit.

De Lethargo.

30. **E**ssè in lethargo, si per se, & cum febre stupuerit, sanguinis euacuatio per sectā in brachio venam viribus consentientibus omnino cōueniat, si tamen, quod sæpius euenit, vel ad continuam febrem subsequatur, vel ad phrænitim sæpè etiam malè curatam, omittendam censeo, neque solum de iectarum virinum ratione, sed ob materiam potissimam à sanguine sciunctam.

31. Si hoc exerceri nequeat ob aliquam cau-

In phræniticis non diutius frigidissimis vtendum.

Phræniticis acetum parçè applicandum.

Aceti loco in oxirhodinis acidum citri, vel limonum non indendum.

Lethargicis quādā letada vena, & quādā non.

Lethargi-
cis cucurbi-
tulæ si ap-
plicentur
quomodo
applicadæ

nam, caput tamen repletum sit, & nō nihil sanguinis admixtū cognoueris, cucurbitulæ in vsum venire poterunt, non tamen dorso, & humeris, aut lumbis, vt Mauritanis visum est, sed colli lateribus potius ponē aures propē venas, applicitæ illæ enim subtilem, magisq; fluxilem sanguinem trahentes rebellem magis, & frigidam, difficiliusq; dissolubilem reddent in cerebro contentam materiam, quod si ē proximioribus eo auxilio eandē trahere contēdemus, impactæ etiam frigidæ materiæ aliquam à cerebro euellamus portionem.

Sternutatio-
rijs nō vte-
dū in prin-
cipio

32. Cauendum maxime ne ab initio huius morbi ad excitandum à somno, sternutatorijs vramur, ex intemptiuo enim huiusmodi remedio magis funditur materia, magisque subindē impingitur, vnde, & contumax morbus fit magis, sæpēq; apoplexiæ sequuntur.

Errhina in
Lethargo
optima in
multis ra-
mefugien-
da.

33. Errhina in veterano optima sunt; in ijs tamē qui lūgo collo sunt, & angusto pectore, vno verbo dicā, qui proni sūt ad phthisim, & qui sæpē morbis oculorum tentantur, in vsum traduci non debent.

Lethargi-
cis repellē-
tia, parcē
applicadā,
& sine ad-
stringētib.

34. In repellentibus applicandis, quæ non nisi ab initio, & etiā non sūmē frigida, administrāda sunt, adstringentiū vsus omnino interdicatur, ne, & crassior pars humoris influxa reddatur, & eiusdem euacuatio, quæ per insensibiles meatus fit, impediatur.

Vesicantia
in lethargo
optima, &
quibus par-
tibus ap-
plicanda.

35. Dropaces, & sinapismi, vt in vsum venire debent ad attenuandam materiam, eamq; à cētro ad circumferentiam attrahendam, ita vesicantia magis commendari debent tūm spatulis, & humeris appposita ad extrahendam à cerebro pituitam, & aqueum humorem irrigantem, tūm derafo capite verrici, & super suturam coronalem.

De

*De Cautionibus in Iasa, aut deperdita
memoria curanda.*

36 **L**icet abolita, aut imminuta memoria in solâ
frigida intemperie referri videatur à Gal. 2.
de symp. causis cap. 7. & tertio de loc. affect. 4. &
& 5. cum tamen frigiditas hæc nonnunq; vera sit
cerebri intemperies frigida simplex sine materia,
aliquandò verò cum materia potissimum pituita;
aliquandò verò ex defectu caloris parti infixi, aut
spirituum à corde immisforum, & hoc causas quàm
plurimas omnino inter se distinctas, quin, & sæpe
contrarias habeat, ut à summo externo frigore am-
bientis frigiditate positiua inducete, aut ab exter-
no calore innato calorem, & spiritus unde pars vi-
uens calefcit, absumente, in hoc morbo curando
procatarticas, & mediatas causas medici animad-
uertere debebunt, nec semper medicamentis pur-
gantibus curationem instituent, aut caput purgij,
sternutatorijs, erhinis, masticatorijs utentur, cum
hæc solum in usum commodè veniant, cum obli-
uionem producit frigida materia, similem in ce-
rebro intemperiem introducens: ubi verò simplex
fuerit intemperies frigida, & internis, & externis
validè excalescentibus, & siccantibus erit agen-
dum. Quod si non positiua frigiditate teneantur,
sed defectu caloris innati, aut spirituum parte fri-
gida reddita obliuio sequatur, anstaurantibus spi-
ritus uti oportebit; in remedijs verò habenda erit
ratio causæ antecedentis: cum enim hæc aliquandò
calida fuerit, ut in illo cuius meminit Gal. qui, cum
incolendis vitibus diutius sub sole constitisset, &
inedia usus esset in hunc affectum incidere, & in
conflatore vasorum vitreorum qui ex forpatis im-
mensa calore memoriam amiserat, qui eum in

Memoriae
deperditæ
remedia
non semper
calida, sed
varianda
pro varie-
tate causa-
rum.

Memoriae
deperditæ
quomodo
à frigido
fiat cum sæ-
pe frigidus
curetur.

In memo-
ria d. p. di-
ta curanda
ratio eua-
cuatione
opus est.

co medici calidis vterentur, & morbus in deterius rueret, embrocis frigidis capiti à me applicitis, & irrigatione ex decocto frigido facta? & cibis optimè sanguinem, & spiritus instaurantibus ad sanitatem est restitutus: In alio autem, qui ob metum, in memorię deperditionem inciderat, solum confirmato animo, ac spiritibus vino, & cibis optimi succi instauratis curatio perfectè est adimpleta: Non igitur semper purgantibus utendum, non semper caput purgantibus, non semper excalescentibus utendum erit in curanda memoria aut abolita, aut diminuta.

In Comate, & soporosis affectibus.

Comate la- **¶** In ijs affectibus, ubi aliunde ad cerebrum deborantibus, vel latis aut crassis vaporibus, aut serosis humoribus affectiones exarcentur, non verendus est oxirrhodini, neque statim ad calefacientia, & interna, & externa erit deueniendum, quinimò aceti quantitas est augenda, vel duplicanda ad olcutoriatum completum, vel ex Auic. & Rasis sententia ad diem usque tertiam, quin, & acriori in ijs aceto utendum est, ut citra refrigerationem validius repellere possit: Neque placet Possidonij sententia ab Actio relata, qui primis illis diebus camamelino ex

In comato aceto utebatur, cum ab initio repellentia sola sint **sis primis** adhibenda, non autem diaphoreticis sit utendum: **diebus ma-** sed postquam affluerit materia, quo etiam tepore ol. cam. realia addi debent valentiora discutienti, & sic **melinu ex-** cantu facultate prædita, ut castoreum, abrotanum, **aceto ap-** ladiendula, serpyllum, verbenaca, & similia.

Comatosi **38** In Topicis in hoc morbo applicandis non **someta ex-** adeo curus est usus fomentorum ex oleis, aut decoctis,

coctis, quia humectatio sæpe actualis ex oleis, & oleis non
 embrochis quandoque vincit virtutem medica- tutò adhi-
 mentorum incoctorum, nisi valida facultate sic- bentur.
 cante prædita sint; qualibus etiam si vtamur, pau-
 ló post lineo, aut canabino panno caput erit ab-
 stergendum.

In Pernigilio; siue vigiliarum excessu.

39 **N** Narcoticorum exhibendorû hora eligen- **Somnifera**
 da, cum dissideât inter se scriptores, alijs post **qua hora**
 cibum è ventriculo lapsum, & antè exhibitionem **exhibenda.**
 alterius per tres horas concedentibus, alijs cū cē-
 na, alijs verò post cenā per horam. Ego sic censeo,
 si ex somniferis fuerit vehementioribus, quæle est
 philonium vtrumque, & recens theriaca, præstabit
 priorē sententiā sequi, ne coctio turbetur, & cibis
 admixta nimium refrangantur, cum omnino me-
 dicamentosa sint, & nullam nutriendi facultatem
 habeant: si tamen maximè necessitas vrgeat etiam
 à cena per horam concedi possunt, vaporibus ci-
 bi facilius deducenribus vim somniferam ad cere-
 brū: sic hora somni pilulas ex cino glosso aliquan-
 dō propinamus: si verò somnifera fuerint leuiora,
 aut etiam alimenti aliquid contineant, & cū cibo
 exhiberi possunt vt emulsionēs seminum papau-
 ris albi ex aqua lactucæ, violarum, nenufaris, & si-
 miliū, tyrsi lactucæ zucharo conditi, aut sanā cō-
 na per horā, vt syrupus de papauere, de nympha
 ex aqua lactucæ: sic enim blanda illa effusio ex
 cibo eleuata humidiori illi, & aliquo modo frigi-
 da admixta sæpè numero somnum conciliat, atque
 immoderatas illas vigiliās ex fumida, & sicca ex-
 halatione productas, aut ex calida, & sicca cerebri
 intem-

intemperie factas demulcet, & somnum conuenientem introducit.

Somnifero 40. Quotidianus tamen, & frequentior illorū
rum vſus, niſi nimius partis calor id perſuadeat, fugien-
dus eſt; ne, dum cerebro ſuccurrere tentamus, &
eſſe nō de-
bet. illius ſymptomati, aut contrariū introducamus af-
fectum, aut ventriculi coctionem imminuamus.

Somnifera 41. Pueris parce admodum ſomnifera hæc per
parcius in os ſunt concedenda; rariuſſe fortaiſſe valentiora ex-
pueris in trinſecus applicanda, ſolent enim quàm maximè
vſum du- amemoriā labefactare.

enda. 42. Non priuſ in anito corpore, aut repleto ni-
Somnifera miſiū capite ſunt in vſum ducenda, contumaces
repletocor enim humores, & ad euacuationem ineptos, per
pore, aut os ſi exhibeantur, omnino reddunt; ſi verò capiti
capite non apponantur, in comatoſos affectus ægros deducūt.
adminiſtrā da.

Somnifera 43. A tenui admodum cœna exhibeantur, vt blan-
danda poſt da euaporatione cibi meliùs officium ſuum com-
cœnam par plere queāt; ita tamen, ne aut coctio cibi impedia-
cam. tur à frigidiſſimate, aut viſ remedij à mole obruatur.

Narcotica 44. Cave, ne in principio paroxiſmi narcotica
non danda exhibeas; ex ijs enim ſæpè ſuffocatur calor natura-
in princi- liſ, atq; impeditur, ne calor febrilis quamprimū
pio paro- expandatur.

xiſmi. In Congelatione.

In catalep 45. In Catalepiſi, ſiue Congelatione cūm videam
ſic correptiſ- 45. I. Practicos oēs ſtatim ab initio calefacientibus,
calida im- & ſiccantibus vt, in errore eoſ omnes verſari exi-
penſe fu- ſiſmo: cūm enim in ijs peccet materia melācholi-
gienda. ca, ab eaq; morbuſis producat, ſi in principio, &

augmento morbi calidis ijs impenſe, & ſiccis vie-
mur, craſſior reddetur materia, ſiccior & ad diſſo-
lutionem ineptior; præſtabit igitur calidis tempe-
ratè vt, ac humectantibus, vt materia attenuetur,
fluxilis

Auxillis reddatur, & ad euacuationem magis apta, quin, vt per sensum effugientem euaporationem d'scuti, & euacuati queat; progressu quidē tēporis calidiora adhiberi poterunt ad reliquias matetie absumendas, & intēperiem a parte auferendam.

46 In topicis itidem remedijs in hoc loco acetum nullibi in vsum veniat: tūm ne pauci, qui superant, spiritus extinguantur, tūm etiam ne atri humoris siccitas, & acor adaugeatur.

In catalep-
si acorū su-
giendum.

In Vertigine.

47 Illud solum in hoc morbo curando obseruan-
dam, & cauendum censeo; cūm ex humori-
bus in cerebro contentis eleuati vapores, & exha-
lationes inordinato motu, & in gyrum clicantur;
sternutatoria non esse in vsum ducenda; neq; va-
lentia illa per nares attrita caput purgia: quāuis
enim aliqua matetie pars educatur, symptoma ta-
men saepe augetur, cōcitur magis, & ex motu su-
bito matetie morbus in epilepsiam mutatur.

Vertigine
sisternuta-
toria, &
caput pur-
gia fugien-
da.

In Epilepsia.

48 Nō tempore paroxysmi nō placet, quod pas-
sim a plurimis fieri video, qui statim corpus
concutiunt, quin etiam ipsum caput, saepe numero
enim magis recurrit ex eo motu ad obstruendum
matetia, & diutius perdat inuasio.

Epileptici
in paroxif-
mo nō cō-
cutiendi.

49 Fugiant etiā, & omnino caueāt, ne, dūm tur-
pitudine faciei, & distorsione, ac spumā oculū re-
tineant, capite, & facie panno cooperta, respira-
tione libera impedita, agros suffocent.

Epilepti-
cis caput
non coo-
periendum.

50 Caue ne in paroxismo vomitum prouoces,
vidi

Epilepti-
cis vomit
malus.

Epilepti-
cis in paro-
xismo li-
gnū ori nō
indendum
sed quid a-
liud.

In praefer-
uatione ab
epilepsia
quando ex
brachio &
quando ex
talo sagius
mittendus.

Epilepti-
cis ex aura
elevata, vix
mittendus
sanguis.
Vomitoria
in praefer-

vidi enim aliquos in inuasionē hoc tentātes scrip-
serunt quorundam auctoritate ductos precipitem
in mortem agros duxisse; ex violento enim illo
motu magis repleto capite, ac concitata materia
in cerebro existente ad perfectam obstructionem
faciendam deducunt, unde apoplexia sequi solet.

51. Ut mirificè placet in principio paroxysmi
ori aliquid, & medijs dentibus indere, ut hians os
esse possit, ne lingua intercідatur, spuma educi
possit, & palatum re aliqua attenuare puta mitri-
datica compositione, castoreo ex aceto, aut sinapi,
aut succo rutę perfricari possit, ita lignum solidius
immittere non ita tutum est, sepe enim uero enim in-
de excisos dentes vidi. Præstat igitur sacculum ex
corio, vel ex crassiori tela repletum attenuantibus
mylis, & validioribus quidem, sinapi, euphorbio,
castoreo, ruta, aut eius semine, & similibus ita pa-
rare, ut illius vices possit supplere; sic enim, & voti
nostri compotes reddemur sine illo periculo, &
morbo aduersabimur.

52. In præservatione ab hoc morbo hæc sit in-
secanda vena cautio, si inttent accessiones, nisi ex
suppressis menstruis, aut hæmorrhoidibus origi-
nem morbus sumat, mittendus erit sanguis ex ve-
nis brachij: si vero semel aut iterum Vere, vel Au-
tumno superuenire soleat, aut hæmorrhoides, au-
tenses sint suppressi, secanda erit vena in talo.

53. Si ex aura virulenta aliunde eleuata ad ce-
rebrum morbus fiat, nisi insignis plectora id per-
suadeat, mitti sanguis non debet.

54. Cum plerosque videam Aretæo, & Auic-
duce in præcauenda epilepsia validissimis uti me-
dicamentis purgantibus tum per vomitum, tum
per secessum, ego longa experientia ductus profi-

natione
epilepsie
seper ma-
la.

teor nunquam morbum hunc in quoque per proprium cerebri affectum productum validioribus vomitorijs curatū vidisse; sed ex ijs omnes ad deteriorē statum deductos: valentiora autem per secessum educētia aliquandō profuisse obseruui, modō non ita frequenter in vsum ducta fuerint, à frequentiori enim eorum vfu exhaustis spiritibus animalibus apoplexie sepe concitantur.

55 In confirmata epilepsia per proprium cerebri affectum si quis, de rasis capillis, vesicantibus per vniuersum caput vtatur, atque ad perisferiam humores virulentos trahat, diutius vlcusculis cutim capitis infestantibus relictis, vt per longum tempus ferosi illi humores per vlcuscula emanēt, optimē curationem instituet; contumacissimos. n. capitis etiam morbos huiusmodi ratione curatos vidimus.

Vesicantia
in capite
optimum
epilepsie
remediū.

In Apoplexia.

56 **Q**uāuis excrementis aluo referta non sit euacuandus sanguis per sectam venā, ne ad venas crudi humores trahantur, in apoplexia tamen, cum ex mora confirmetur morbus quamprimum secare venam expedit, si abundet sanguis, aut mixtus sit sanguini humor morbum faciens.

Apoplecti-
cis itatim
mittendus
sanguis.

57 Quin si indicatio secundæ venæ adsit, præstabit repetitō id agere; sic enim neque refrigerabitur corpus, aut vires imbecilles reddentur, & id obtrinebimus, quod maxime exoptat Aetius, nempe, materiam morbificam commouebimus.

Apoplecti-
cis repeti-
to sangui-
mitendus.
Apoplecti-
cis concu-
tiendi, &
per i an-
dū est cor-
pus.

58 Concuriatur blandē corpus, perficitur calidus, & potissimum brachium, vnde educendus est sanguis, vt, & reuellatur, & attenuetur, qui cras-
sior

sior per se est, & factus ex refrigeratione adhuc crassior facilius effluere possit.

59 Neq; vnus angustū fiat, quod aliquib. placeat, vt motus diutius perdoret, sed latū fieri debet; nam crassior est sit sanguis statim quasi restagnat. **60** Venam frontis, aut pone aures statim ab initio secare quod aliquibus placet, vt quam primum preesto simus, non est conueniens, nisi præ-

cesserit vniuersalis euacuatio silem per quatuor horas admitti tamen aliquando poterit, si plerumque non ad sit, & aliqua subis sanguinis copia in capite, quæ tamen duas non admittat sanguinis euacuationes.

61 In cucurbitulis in hoc morbo affigendis cautio sit, ne pars posteriori thoracis applicentur, ne respiratio impediatur, sed lumbis, brachijs, & scapulæ, quin, & occipitio, & iugularibus quandoque venis, sed post alias, & tunc omnino scarificare cutem subiectam expedit.

62 In legaturis dolorificis non diutius persistendum, ne pars gangrenam incutrat, sed partes modo stringantur, modo laxentur, præcepto Auic. vt, & maior fiat renulsiō, & motus humoris.

63 Causticum in commissura coronali, quod laudat Aetius, & alij, non multum probatur, quod præsentaneum non sit remedium, multaque alia etiam inuehat incommoda, de quibus alias.

64 Præstat euacuatio facta, neque nimum in extremis tubescence parte, cucurbitulam in vertice ponere, & repetere abrafo capite, vel validū medicamentum vesicas excitans capiti apponere.

65 In clymate inijciendo hæc sit animaduersio, si inijciatur primo, vt reuellemus, & per alium subducamus, ea quantitas erit infundenda, quæ ic

præ-

præstare possit, & hoc ijs obseruatis, quæ aliàs docuimus; si verò, ut in testibus mordicantibus, & valentè excalescentibus vellicemus, & dolorem incutiamus, in dimidiata quantitate infundendum erit, ut diutius retineatur; quòd si diutius retentum tormina, & inflammationes in intestinis excitet, balneo elicietur.

66. Vomitus fugiendus, tum quòd æger in hoc motu se ipsum adiuuare nesciat, tum quòd, cum se erigere nequeat, potius suffocaretur, tum quòd in re pleto corpore vomitus caput replere soleat.

67. Stribi igitur vsus in hoc morbo potissimùm in paroxismo est fugiendus.

68. Sed valentiora tamen deiectoria exhibenda erunt, ut pauca quantitate assumpta etiam à longinquis attrahere, & educere possint.

69. Sternutamenta, ut maximè ex vsu sunt in hoc morbo, & quidem valentissima, ita nò statim adhibenda, nisi prius corpus sit inanimatum.

70. Si caput derafum oleis calidis inungendū sit, cautio sit, ut à leuioribus prius incipiamus ad valentiora progredientes.

71. Ut verò diutius hæreant ceræ aliquid semper indendum erit.

72. In oleis chimica arte in vsum ducendis hæc sit animaduersio, non ijs solis vtendum esse, sed oleis medicatis esse admiscenda, cum enim ignea substantia consent, in superficie posita statim dissipantur, & in halitus abeunt, nisi acris, & oleaginosi quasi ligentur, ac coerceantur.

In apoplecticis vomitus fugiendus.

Antimoniū fugiendum.

Purgantia sint ex valentioribus.

Sternutamenta rora quædò administranda.

In iniectionibus ab imbecillioribus inchoandū.

Oleis ceræ addenda.

Olea stillata in vsum non veniant sola, sed oleis medicatis mixta.

In Paralyfi.

In paralyfi
quando ab
initio pur-
gandum.

73 **E**ſi monet Auic. quem omnes ſequuntur recentiores, in paralyſi in principio non eſſe purgandum, niſi tranſacta quarta, aut ſeptima, & ne tunc quidem validioribus medicamentis, quod etiam à Paulo obſervatum videmus: id tamen mea ſententia perpetuam non habet veritatem: ſi enim prima ipſa die accerſitus medicus fuerit, dum nodum nervis impacta eſt materia, dum adhuc in motu eſt, dum nodum craſſe facta, præſtabit materiam quā primū, & medicamēto ſatis valido per alvū ſubducere: At ubi iam firmata ſit, perfectèque obſtructionem fecerit, prius attenuanda erit, & præparanda, quàm euacuetur.

Paralyticis
ſudorifera:
inuſitata.

74 Maximus committitur error paſſim à medicis in paralyſi curanda, eū omiſſis urinam promouentibus ad ea, & præmptius accedunt, quæ ſudores mouent, decoctum guaiaci, ſarzæ pariliæ, & ſimilium, arte etiam per ignea artificia huberiorē ſudorem proliciētes, cum alioqui docuerit Hipp. in Coacis prænotari morbum hunc urinis repetitè multis, & abundè proruptis exolui: ſudoribus autem confectim manantibus in deterius ruere: quod cum urina craſſiora quoque educantur, per ſudores autem tenuiori exoluta craſſior magis calleſcat, craſſior reddatur, magis obſtruat, atque difficilius reddatur ad motum, & ad euacuationem.

Paralyticis
diuretica
optima.

75 Qua etiam ratione inunctiones non debent fieri ex oleis nimium calidis, & ſiccis, ſaltem ſolis: periculū enim impendet ne materia nervis adhærens nimis exſiccetur, & lapideſcat: quare illis ſemper pingua miſceri debent; vnde etiam vis ignea

Paralyticis
olea nimis
calida ma-
la.

illorum

illorum coerceretur ne exhalet, & diutius adhære-
scent, neque nimium exsiccando contumaciorem
morbum reddent.

76 Ut in paralyti curanda aliquandò vesicantia
post vniuersum corpus euacuatum spatulis, aut bra-
chijs applicari debent, vt materia à cerebro, &
principio spinalis ad externa attracta euacuetur;
ita rubificantia solum post illa, & progressu tem-
poris [Auic. triginta post dies ijs vtitur] spinæ dor-
si applicare conuenit, cum vt reliquias materiæ ex-
trahere vocemus, sanguinemque, & spiritus iterum in
partem reuocemus, vt ea reuiuifcat.

77 Cauendum tamen tunc, ne rubificantia eò
vsque adhæreant, vt vesicas, aut pustulas in cute
inducant; sic enim spiritus ad partem non reuoca-
rentur, sed dissoluerentur: eò vsque igitur sinapisi-
mi, dropacose cuti adhærere permittendi sunt,
quandiu rubida pars pressa digito non albescit,
sed rubida perseverat.

78 Cucurbitularum vsum quàm maximè com-
mendat Auic. post expurgatam corpus, capitibus
musculorum partis laborantis applicatarum sine
scarificatione, non quidem ad extrahendam ma-
teriam morificam, vt censuit Gêtilis, sed ad euo-
candos spiritus ad partem ferè demortuam: quod
vt obtinere possimus, animaduertendum cucurbi-
tulas angustis oris esse debere, cum multo igne esse
applicandas, ac diutius non esse permittendum,
vt adhæreant, ne dissoluatur quod ab ijs est attra-
ctum.

De Convulsione.

79 In spasmò, motu irruentis materiæ cessante,
vt cucurbitule modijs musculis affixæ, & scissi.

Olea stilla-
ta sola inap-
ticia.

Paralytica
vesicantia
vtilia.

Paralyticis
rubificantia
quâdo con-
ueniant.

Rubifican-
tia quousque
cuti adhe-
rere debeat
Paralyticis
cucurbitu-
læ ubi, quâ-
dò, & qua-
tenuè ap-
plicandæ.

In spasmò
cucurbitu-
læ quâdo,
& ubi ap-
plicandæ.

nificata extrahuntur sunt ita caucendum est, ne finibus musculorum, ubi tendones sunt affigantur.

Cucurbitula
la in spaf-
mo quomo-
do appli-
canda.

Cucurbitu-
lis sublati-
s pars subie-
cta fouenda.
Conuulsis
partes oēs
calidis fo-
nenda.

Conuulsis
si sudor su-
peruenit
quid agen-
dum.

Melancho-
licis purga-
tia liquida
magis co-
ueniunt.

80. Addit Arethæus in illarum applicatione par-
cè flammam excitari debere, nam, quæ à labris cu-
curbita, si cōpressio, doloris, cōuulsionisq; auctor
esse solum molliū igitrahāt, & diutius adhærēat.
81. Cauendum etiam ne pars subiecta detractis
cucurbitulis frigore tētetur, pars enim rarefacta
facile frigido aere admissa friget.

82. Custodienda aut etiam quā maxime ab
ambiente frigido partes, quæ calidis balneis pro-
ximè immerse fuerint, quæ perfrictæ, quæ irriga-
tæ, quæ denique dropacibus, sinapismis, alijsue in-
genijs ad ruborem deductæ, aut quouis modo ra-
refactæ, quod nervis frigiditas sit tribuica, mate-
riæq; cōuulsionem facientem crasse faciat.

83. Quapropter etiam superueniente sudore, ob-
dolumus, reuerentiā maxime obseruandū erit, ne
mador ille adhærēat, neue frigescat, sed oīn abster-
gendus erit, sed ne meatu aperti frigiditas ad-
mittant, neue effluens sudor virtutem exoluat, ca-
lente aliquo oleo partes erunt delinenda blandè.

In Melancholia

84. **Q**uamuis nō negandū sit, in hoc morbo me-
dicamenta, quæ exhiberi debent ad oua-
tuandū humorem, sub quacūq; forma
cōcedi posse, verissimū tñ est si liquida concedan-
tur, multo magis vtilia esse; nec in omnibus vñ
pilularum admitti posse ob siccitatem melancho-
liæ: quāuis cōtumacia materiæ ad eas nos reuocet:
nam robustius aqua cōbinata videtur, in ven-
triculo præterit, & vehementius à capite prolecat.

85 In missione sanguinis per sectam venam, quamuis sciam plerosq; Galeni auctoritate innixos hac vti distinctione, vt viribus consentientibus, & morbo magno facto secetur vena, & siater sanguis effluat, educatur ad debitam quantitatem, si subtilis, & rubens vbi ad tres uncias effluerit, supprimatur: perpetuo tamen hoc seruandum non est; aliquando enim aliqua data occasione, cum ceperit morbus, is in cerebro optimo sanguine exsiccat, si in vniuersa abundauerit sanguis, & torosa fuerint vena, sanguisque in ijs nullam conceperit labem, sed popis solum peccet, secunda quidem erit vena, & sanguis, etiam si subtilis, & rubens effluat, omnino in debita quantitate erit euacuandus, & reuellat à capite, & impediatur, quominus in nigram bilem vertatur, aut melancholiceat. Galeni igitur sententia vera erit, vbi non adsint signa veræ plethoræ; tunc enim pro reuulsione expedire secare venam, & si nigrum effundit viderimus, cum in venis magnis abundare nigrum sanguinem viderimus, effigere sinemus: si vero subtilem, & rubrum, sistemus, quod potius a prus sit melancholicum sanguinem in supernis existentem attemperare, & ad benignam naturam reuocare.

86 Foramen tamen semper amplum sit, vt, si in crassum sanguinem incidamus, promptè effluere possit, neque tumor circa scissuram excitetur.

87 Admonendus etiam est venifeca, vt dissecta vena vinculum aliquantulum laxet, ne crassioris sanguinis effusio impediatur.

Quamvis
dus sanguis
ijs, & quæ
supprimetur
dus.

sectio ve-
nae in mel-
ancholicis
fit amplius
laxandum
vinculum
incisa ve-
na in mel-
ancholicis.

In Epiphora, seu copioso ad oculos humiditatis affluxu.

In epiphora oculorum adstringentibus videntur in principio. In fluxioni bus alijs ad oculos abstinendum ab adstringentibus.

88 **Q**uamuis, cum oculi fluxibus humorum tentur, censuerit Gal. tum 6 Aphor. 31. tum 13. meth. vltimo ab adstringentiū vſu eſſe abſtinendum; in epiphora tamen multo ſecus faciendum docet potiſſimum in principio: cum enim affluxus humoris ſit externus circa orbitam, & in angulis, roborandæ ſunt partes illæ adſtringentibus, & ſiccantibus, vt, & materia in intimioribus recipiatur, & ab externa tunica quodammodo repellatur, aut ſaltem ab ea non admittatur, cui aqua ex rubi ſummitatibus, ex folijs teneris quercus ex fragris, & ſimilibus, vel compositis, aut ferrata conuenit: at adſtringens ſiccitas nunquam admitti debet, vbi humiditas ad internas tunicas, & intra corpus oculi affluit: durior enim medicamēto illo reddita externa tunica, & craſſior humor factus contumaciorem, & ſolutu difficiliorem efficiunt affectum, & ſæpè etiam actioni viſus non leuè afferunt detrimentum.

Glaucis in oculis, & vbi venæ amplæ mitioribus agendum. In epiphora errhinis raro videntur.

89 Notant recentiores viri doctiſſimi, & poſt multiplici experientia à me comprobatum eſt, in glaucis oculis, vbi etiam venæ amplæ conſpiciuntur mitioribus remedijs agendum eſſe, quod fortæſſe magis ſint peruij.

90 Maſticatorijs, & apophlegmatifmis vtendum eſt, potiſſimum errhinis: quæ tamen progrediēte morbo, & frigida affluente materia modò validiora non fuerint, in vſum aliquandò venire poterūt: ſic enim auerſio materiæ fiet à meatibus cantorum oculi ad naſum.

91 A ſternutatorijs cuiuſcunque generis omnino

ninò abstinendum : impetu enim propulsa materia à cerebro per nares, & per eosdem meatus ad oculos promouetur, & ab internis, & meatus magis aperiuntur.

In Ophthalmia.

92. **I**N muliebris lactis exuberantibus rectè emulsi, aut stillati vsu ad demulcendū vehementissimū oculi dolorē, vt principem locū inter huiusmodi præsidia semper obtinuit, ita cautio adhibenda, ne eadem lactis portio diutius parti adhaereat; sapē enim ab eſtu corrūpitur, & à vehementi calore oculi acrimoniā concipit; abstergēda igitur blandè erit, aut nouo lacte aspersa subluenda.

93. Opii vsus in inflāmati oculis neq; frequēs sit, neque multus; quāuis enim in eo praeualeat refrigerandi vis, cum tamen amaroris non nihil habeat, sapē mordet, & dolorem adauget: quòd si ex longiori mora praeualere frigiditate sensus torpescit, & subinde dolor imminuitur, tū, & per frigiditatem temperatur aestus, crassefacto tamen affluxo humore contumacior redditur morbus, curatūq; difficilior; tū, & visus actio hebetior fit, vt etiam Gal. obseruauit, 5. meth. med. cap. 2. & 2. de compos. med. secundum loca.

94. Ob quas etiā causas reijciebat Gal. 1. 3. meth. med. vltimò ea, quę vehementer adstringūt, etiā si refrigerent, & repellant in inflāmationibus oculorum, vt aesciam, & hypocistis, ne materia morbifica, quę eo influxit, exitu prohibeatur.

95. Et quemadmodum remedia in hoc morbo lenia, mollia esse debent, ita bullum lentorem habere oportet, ne pertinacius adherant; nouè si

Sternuta-
toria in o-
culorum
morbis su-
gienda.

Lacte mu-
liebri quæ
cautione
vtendū in
ophthalmia

In ophthal-
mia opij vsus neq; fre-
quēs, neq;
multus.

Adstringē-
tia valida
in ophthal-
mia fugiē-
da.

Lentorem
habentia
ophthalmi-
cis incom-
moda.

Albumina
oui. Vendi
ratio, & tū
qua cautio
ne.

pulvisculum aliquem ex pompholyge, eadē, plumbo adungamus, & rescant, acrimoniae, vel ex admixtione acris humoris, & calidi asciscant; quare licet albumina ouorum diutius conq̄assata cum aqua rosarum, vel mirthillorum, vel similiū, ac spuma semel atq̄ iterum detracta maximē omnibus probentur, ac in vsum ducantur, cum tamen tenacius adherent, vt hūc incommōdo occurramus, soleo ego ouum recens ad duritiē quandā excoquere, & detracta stana parte per expressionē ex albo aquam extrahere, & illa vti cum alijs affant in loco cauo sacchari albi, tuciae, & aquae rosarum portione imposita in modum cimenti per duplicem peciatim expressionē facta aquā, succum ne extrahere, quō in inflammationis oculis sine molestia, & maximo cum fructu vti soleo.

Emplastris in ophthalmia vtiendum.

¶ 96. Non negandum tamen cum Gal. 12. meth. med. 24. emplastrum vim habentia, & refrigerantia in lippitudine conuenire, vt diutius adherent, longiori q̄ tēpore refrigerando repellant, vbi patissimum aut ophthalmia sit sicca, aut humor effluens tenuis nec adherens, vbi verō viscidior sit, & mordens superiorem cautionem adhibebimus.

Foenugreci in lippitudine non vtiendum.

¶ 97. Obseruandū præterea Gal. & 13. meth. 12. & 4. de compos. med. secundum loc. 2. inter lenientia dolorem in oculorum inflammatione cum albumine oui, & lacte collocasse decoctū foenugreci id. verō pleriq̄ medicī parant ex semine cum alioqui id. magis sit calidum, quā conueniat in oculorum inflammatione, cum calidum in secundo gradu, & siccum in primo posuerit Gal. semen 8. de simpl. med. facul. assumi igitur preparando hoc decocto ad fouendos oculos debet herba ipsa, & eius folia, alioqui angebitur inflammatio.

98 Quinimò si illius vsu hæc sit cautio ex Gal. ibidē, ne in vsu ducatur, nisi prius ablatus sit diligenter, ne puluerem admixtum habeat; seminaque etiam erunt excutienda: sicque communem errorem evitabimus.

99 Infinita propemodum remedia, aquas, pulueres, & alia cum videam, & passim proponi scribi: placet illud hic pro cautione adnotare, qd a doctissimo Mercato lib. 1. de inter. morb. curand. cap. 20. scribitur. In oculorum curatione animadvertendum, quæ moris præscripta sint remedia, non omnibus, aut plurimis, aut semper esse utendum; plus enim boni promittunt, quam præstent; ut ait Gal. scio profectò plures in omnimodâ cecitatem deductos esse copia auxiliorum: potius, quam defectu, ne queunt enim oculi, quæ proficua sunt, citrà damnum perficere; nequãquã inordinatè, & citrà rationem, adhibentur.

100 In suffusione perfecta, quam Cataractam Barbari appellant, curanda, & acu remouenda cautio hæc adsit, ut nunquam tali curationi manum admoveamus, si tussis æger laboret; si enim acumen introducta superuenierit, perforationis periculum impendet; si verò tunicula depressa fuerit ex concussione vehementi dimota recurrat.

101 Si verò iam depressa sternutamentū imminere æger persenserit, unde aut recursus periculum imminet, aut inflammationis in oculo; summitate digiti dextræ maiore oculi angulo cōpresso, & perfertur periculū hoc evitabit impedito sternutamento.

102 Quoniam antè curationem hanc per acumen medici sæpius, ut periculum fatiāt, an satis in crassata sit, tractioni per acumen factæ cedere parata sit sine rupturâ, digito pupillam comprimunt;

Fœnugracum abluendum antequam decoquatur.

Ophthalmicis paucissimâ extrinsecâ auxilia adhibenda.

In cataracta oculi acu remouenda non adsit tussis.

Sternutamentum impediendo quo impedi possit.

Cataracta antè quam acumen depri-

cautè

cautè id facere debent, ne si valentiùs id faciant, nimis tuniculam attenuent, facilemque reddant ad disruptionem.

Cautiones in aurium morbis curandis.

Aurib. in. inflammatione laborantibus repellentia vix conueniunt.

103 **I**N aurium interna curanda inflammatione à repellentibus, & oxirhodino abstinendum omninò censeo: cum enim internarum cerebri partium repletarum soboles esse soleat materia eò detrusa, si repellatur, ad principem partem remeabit, & delirium quandoq; pariet, aliquandò verò alios cerebri affectus, quod si Gal. 3. de compos. med. secundum loc. repellentia, & oxirhodinum in doloribus aurium, & in inflammationibus earundè concedere visus est, id intelligendum potius est de phlogosi, quàm de vera inflammatione; si tamen non magna fuerit, atq; non multam in particula, & cerebro subesse materiã cognouerimus, repellentia aliqua in usum venire poterunt.

Aurib. remedia applicata non sunt frigida.

104 Qualiacunque tamen hæc fuerint, quæ ad leniendum dolorem, & refrigerandum infunduntur, etiam si æstus maximus in parte fuerit, nunquã frigida applicari debebunt, nã cum sanguinis sint expertes aures, facilè ad sibi cognatam intemperiem frigidam flecti possunt: repellentia igitur semper cum Gal. adhibebuntur.

In aurium doloribus à manu frigida insigniter calefactione in usum duenda.

105 Quod si dolores contigerint à frigida materia partem extendente, quæ actu calida sunt, & potentia omninò instillabuntur: sic enim, & frigida intemperie euincemus, crassam materiam magis discutimus, & penetrationem adiuuabimus.

106 In tinnitu aurium à lue venerea alioqui natura sua rebeli, & vix sanabili cauti sunt medici.

neque

neque vehementioribus remedijs vtantur: longa enim experientia obseruauit maiori ex parte, dùm tinnitum huiusmodi nimis obstinatè euincere tē-
tassent, omnimodam surditatē induxisse: si quod autem remediū illi auxilio est, vrina asini, in qua per noctem maduerit lignum guaiacū, & portio Castorei, & mēthastri fasciculus distillata, & auribus instillata, aut per euaporatorium excepta, maximè id pręstat, aut oleum Guaiacinum gossipio exceptum, & auribus impositum.

Tinnitui aurium ex morbo gallico ualentiora non applicāda.
Tinnitui aurium ex morbo gallico remedium.

De Catarrho.

107 **Q**Uamuis optimè sciā ab aliquibus etiā pręstantissimis in arte medica uiris catarrho cuiusdo cauteria proponi inurenda ad futuram coronalē; quo loco illi cōmittitur fagittalis, vt, & caput expurgetur ab excrementis, & ab infernis ad superna, & extrā corpus eadem reuellantur: Quoniam tamen vix credi potest crassiora illa excrementa ascendere posse; ascensa uerò per futuras permeare: uerisimilius autē est externè producta per eas descendere posse, omninò reiicienda, & ab usu medico repellenda esse uidentur; quod enim aliqui sibi fingunt suspendi, interceptiq; materiam, ne ad pectus fluat, ridiculum est: quo modo enim suspendi queat, quod graue est, nullo retinente, ne mente quidem concipi potest, cū uerò hic neque oclusio ad sit uasis alicuius, neque deligatio, aut compressio, neque etiam humor intercepti dici potest: at uerò neque reuulsio est, cū nulla forē sit distantia; neque deriuatio, cū hac ad latera fiat: quare nullus eius erit usus. At abusus adest: quis enim denudato cranio periculum

Cauterium in coronali futura in catarrho pessimum.

culum non cognoscat? quis adusto perieratio securitatem pollicebitur? quis inflammationis, & externæ, & internæ periculum non verëbitur adusta parte, vbi membranæ externæ cum internis per nervos, per fibras, per venas, per arterias iunguntur: At verò si experientia agendū est, scio ob multa pericula visa doctissimos Montanum cons. 36. pro nobili Veronense 143. & 170. Hieronymum Mercurialem in tomo 3. consiliorum sæpius, & post omnes Fabium Pacium in eruditissimis commentarijs in lib. meth. med. lib. 5. cap. 13. & in appendice ad lib. 7. omninò genus hoc auxilij detestatos fuisse. Ego verò liberè affirmare possum quadraginta horum annorum spacio, quo in magna hac vrbe medicinam facio, nullum ex ijs, quibus cauterium hoc inustum est, vidisse à tali remedio adiutum, sed aliquos etiam inflammatione in parte excitata esse periclitatos: potissimum primis annis iuuentutis meæ; quo tempore aliqui adhuc ex ijs vivebant, qui barbaram sectantes medicinam frequentius genus hoc auxilij in vsum ducebant: sed subsequenti tempore, medicis spe sua fraudatis sæpius, exolescere iam illud, & post hæc gargarismi meritis cepit.

Catarrho ad pulmones, & thoracem irruente gargarismi periculi.

Gargarismata fugienda repleto thorace.

Asthmatici aut tibi obnoxij gargarismata fugiant.

108 Vbi ad pulmones, & thoracem, quin, & ad fauces irruit materia, siue tenuis sit, siue crassa, gargarismi nunquam in vsum veniant; ex motu enim attracta materia sæpe suffocationis infert periculum.

109 Quin, & vbi partes spirituales iam repletæ sunt materia crassa, à gargarismis abstinendū, cum non leuè inde suffocationis subsit periculum.

110 Quòd si homo tibi, aut asthmatici obnoxius fuerit, idem genus auxilij fugiet.

111. Solùm tunc conuenient, cùm fluens materia acris fuerit, & aut exulcerationis in partibus gulæ, aut anginae periculum impenderit; tuncq; & blandè id erit præstandum, & additis refrigerationi adstringentibus.

112. Quoniam aliquos esse scio, qui ut contumacem, & molestum morbum breui tempore securare posse ostendant, statim nulla virgè necessitate ad sistendū catarrhum accedunt, theriacam nouam, philonium, pilulas de cynoglossa, & similia exhibentes, animaduertendum erit ijs uti eos non debere antè humorum expurgationem, & resolutionem, & tunc neque facilè ad hæc veniendū; nè in crassata materia, & refrigerata, si diu ijs in cerebro cõtineatur, cerebrales aliquos magni momenti morbos pariat. Ad ea tamen erit veniendū, si graua urgeant symptomata, ut si ita effusdatur humor in pulmōes, ut grauissimā tussim, metum suffocationis, exulcerationis, vel rupturæ venæ æcissima vi afferat; tunc enim misso sanguine, si opus sit, vel etiam ilico, & antè purgationem sistere licet hunc effluentem morum.

De Angina.

113. Quoniam in hoc morbo missionem quidā sanguinis per sectam venam omnes necessarium auxilium esse fatentur, sed in loco deligendo variasse video; alijs ex brachijs semper emittendum censentibus auctoritate Hippocratis de vict. acut. 30. & quod sectis in brachijs nō solū vniuersum corpus propriè euacuatur, sed simul etiā nō parū sanguinis à faucibus reuehitur; alijs vel partibus infernis saphena, vel ex vena tali, quæ lucentem sanguinem infuxionis initio non solum

Gargarismata in catarro quādo conueniant.

Catarrhi non sistendi narcoticis nisi magna virgē necessitate.

Angina laborantibus quæ vena sit secanda

ad contraria loci laborantis, sed, & fontis transfundentis, & ad distantia regulæ à Gál. traditæ reuelendū esse ostendant: cum igitur laborans pars sit collū, fons autē transfundens sit iecur præcipuè sanguinis officina: si sanguinem miserimus sectis venis in brachio tantū abest, vt ad contraria sanguinem retrahamus, vt potius ad partē laborantē auocemus: Vena siquidem caua inde lata in duos ramos scinditur læuū, & dextrū; qui in iugulares, & axillares diuidūtur: at à iugularibus externis laryngis vasa ortū ducunt: sanguine igitur ex venis brachij tracto certum est ad venas iuguli etiam trahi, sicq; potius morbū augeri attracto sanguine ad laborantē partē: vicinia, & inflammatione sanguinē trahente. In hac controuersia cæseo. Ego omninò animaduertendū esse, an corpus maximè affluat sanguine siue natura, siue ob antea actam vitā, siue ex solita aliqua euacuatione suppressa; tūc enim cæseo sanguinem, vel ex vena poplitis, vel malleoli esse detrahendum: eadē autē die vrgente morbo, vel sequenti iecoraria, vel cephalica erit secanda, & si non cesserit morbus, rubor autē adit faciei, ampliū etiā veniendum erit ad sectionem venarum, sub lingua. Quos si tanta non premat sanguinis copia, intactis venis inferiorum partium, præstare crediderim statim cubiti venas secare; moxq; ad supernas incidendas accedere.

In angina laborantibus iteranda sanguinis missio. ¶ 114. Repetenda autem, & ex brachijs sanguinis missio est, non solum quod magis reuellat, minusq; vires debilitet; sed quod obseruatum si sepius ad partem laborantem affluxus nouos fieri, aut partē aliqua, vt onere, quo premitur, leuetur, transfundente, aut ob dolorem, & calorem laborante partē attrahente.

115 Cum autem aliqui ex molestia medicamentorum, aut quod natura medicamenta abhorreat, facile medicamenta euomunt, præstat semper portione uti, quàm bolis, aut pilulis: si enim contigerit pilulas, aut bolos euomi, cum cõfertim, & magno impetu ad angustias oppressi ab inflammatione transitus propellantur, suffocationis, & strangulationis periculum non leue afferunt.

Anginosæ
potiones
potius dā-
dæ, quā in
solida for-
ma.

116 Qui ad discutiendum in inflammationibus aliarum partium ex arenibus puluisculis parantur sacculi, in angina nunquam in usum ducantur, quod densando externam cutim potius curationem impediunt, humentibus igitur potius est agendum.

Anginosæ
sacculi ex
discutiēti-
bus mali.

De Pleuritide.

117 Quamuis in Pleuritide curanda secta vena maiori ex parte expectanda sit coloris in sanguine mutatio, ex Hipp. & Gal. præcepto 2. acur. i. modò æger ferre possit: sic. n. & antecedentē inflammationis causam auertemus, & coniunctam amouebimus: id tamen perpetuò aut in quacunque Pleuritide obseruandum nō est aliàs enim docuimus seruandum id esse, ubi vena, quæ secatur, proxima est loco affecto: propterea dolore descendente, & infimam thoracis partem occupante talis non expectatur mutatio: nam tales partes, ait Galenus, nutrimentū suum hauriunt a vena sub corde: & cordis partes nimium inanitemus, antequam sanguinem inflammationem facientem euacuaremus.

In Pleuride dolo-
re descen-
dente in
sanguinis
missione
nō est ex-
pectanda
coloris mu-
tatio.

118 Quin ne semper quidē in Pleuritide partes supernas occupante mitti edulque sanguis libet, quò coloris in eo fiat mutatio: sæpe enim

Neq; viri-
bus debi-
libus.

dām

hum. coloris expectamus mutationem, vitales vi-
res occidunt, nec eger valebit ea e pectore vacua-
ro, quæ aut resudant, aut disrupta vomica in pul-
mones defluxa collecta sunt.

Neq; im-
pacto par-
ti sangui-
ne.

Et euenit etiã, vt etiam si vitales vires con-
sistant, non expectari possit vlla coloris in sangui-
ne mutatio, si infederit loco firmi, et sanguis, & in
densiorem membranam infederit.

It. Pleuris
ride forib;
q; vteodü,
& quibus

Licet Pleuritidis curationem primò tẽtan-
dam doceat Hipp. 2. acut. fomentis, vt, an ijs cu-
rati morbi possit, tentemus, & dolor mitescat, id
tamen neq; sepe, neq; in quauis Pleuritide, aut in
qua libet corporis cõstitutione, aut quouis fœtu pre-
stari potest; si. n. iã morbus auctus est, aut vehemẽs
est inflãmatio, & dolor, & assue magnus, aut cor-
pus multo sanguine repletum non alio huiusmodi

remedio vti licet, quàm aqua repente, ne maior
effusus dolor, aut affluxus materia ad locum fiat.

In Pleuri-
tis dolo-
re ascen-
dente fo-
tus sint hu-
midis.

At magna etiam in ijs foribus, quæ ad de-
mulcendum dolorem in vsum veniunt, adhiben-
dis, cautio ne opus est; si enim ad supernas partes
perungat, & versus clauiculam dolor, cum, & ma-
teria acrior, & maxime calida esse soleat, calidis, &
humidis; Cur potius res erit transigenda: si ad in-
feras vergat dolor, qui etiam non adco pungens
esse solet, quiq; non leuem flatuum copiam adiun-
ctam habet sicca etiam in vsum duci poterunt, &
faciẽ commodius attenuant enim magis, exsiccat,
& digerunt, ex humidis autem attenuatur quidẽ
materia, sed crassiores flatus ex simili materia
excitati non ita commodẽ discuti solent.

Dolore de-
scendentes
sicci.

Sæculi fo-
uentes sint
lentes, audi

Sicut ij forus vt ex multiplici materia pa-
rari solent, ita ea magis præfertur, quæ leuis sit, sic-
cissimum cæteris præfert Hipp. panicum, furfures,

semit.

semina, & flores discutientes; salis autem etiā portio aliqua ob exsiccationem licet admisceri aliquādo possit, minùs tamen illius addendum, quàm soleat, tùm ob gravitatem, tùm ob acrimoniam.

123 Quòd si ex fotu etiam dolor mitescat, non proinde tamen statim eujctum esse morbum censendum erit; aut à genetosis remedijs cessandum, puta missione sanguinis, sæpè enim ad primum fotus blandimentum mitescit in phlegmone dolor quòd pars tensa laxetur, sed reuiuiscit mox ardentius noua affluxa materia: quare si, & febris, & spirandi difficultas etiā perseuerent, nō erit cunctandū; sed affluēs materia quā primum erit reuellēda.

124 In hoc morbo maximè pleriq; medicinam profitentur, arcana remedia promunt externa, internatim externis nullū cōmitti posse errorē oēs sibi persuadent, vnguenta ex dialthæa subtili, butiro veteri, & cumini puluere parant, alij ex calce, & alijs, cerata, & cataplasmata; alij ex pice, & reb. alijs quā plurimis calefacientib. cū ægrotantiū detrimēto: cauenda hæc maximè erunt, potissimū in principio: calore. n. fluxiones cōcitant, atq; humores trahunt, alia verò præterea etiam laxant.

125 Obseruandū præterea, quod optimè annotauit Aræteus, si post deuictum hunc morbū, paululūm etiā tussis superfit, & corporis adsit aliqua caliditas, quæ aliquandò magis infestet, quam primum dandam esse operam, vt, quæ reliqua est, materia discutatur; aut enim quæ relinquūtur recidiuas faciūt, aut ad suppurationē conuertuntur.

126 Non sunt hoc loco prætereunda præstantissima duo remedia, quæ doloribus ijs lateralibus adeò vtilia esse cognoui, vt multos, qui iam iā suffocari videbātur, ab huiusmodi piculis eximerim.

Mitescēte dolore nō statim desistendū a Veris remedijs.

Externis non indistinctè vtendum.

In pleuriticis reliquæ absu mendæ.

Pleuritico- rum tria præstāissima remedia.

L

Pri-

Primum est, si post missum sanguinem exhibuerimus tres uncias melli ros. solutivi, & tantundem butiri recētis: quod si etiā progressus fuerit morbus difficile autem suppuretur, aut disrupa vomica ægris periculum immineat suffocationis, maxime etiam conferet. In eundē vsum feliciter vtor quinq; uncijis olei amigdalorum recentis, cū uncia vna mannæ. In eundē vsum duco infra scriptum. Recipe olei oliuarum optimi, & maturi onc. viij. aquæ fontis lib. i. excoquantur simul sine cooperulo in vase terreo vitreato ad consumptionē totius aquæ, & post olei illius onc. vij. dentur, dolorem mitigat, suppurationem adiuuat, aluum blande mollit, ac non ignescit, aut in bilem vertitur.

De suppuratione.

In Empie
mate non
potest ma
teria à me
dico p al
uū expur
gari.

127 **C**VM suppurati ex disrupa vomica vix alia via recte expurgentur, quàm per tussim, sreatu, non multum spei in euacuanda ea materia per aluum reponere debet medicus, quod ope medici hoc vix fieri possit; præstat id quandoque natura, quæ nobis incomptas vias inuenit, & ad salutem ægri struit: audacis tamen potius est officium: cum non per alias vias excerni per aluū possit, quàm per cor, & iecur sibi transitum materia parante; quod periculi plenum negotium semper censui: syncopem enim, dùm per cor transit, inducere poterit: cùm verò etiam hepar attinget, & intestina, & dysenteriam mordaci vi concitabit, & sanguificatrice hepatis facultate læsa hydropem faciet: salubriter id quandoque à natura tentatum scimus: id Arethæus testatur, & nos in purulento ex Pleuritide iam iam ex suffocatione moribund

do vidimus in magno hoc valetudinario, qui cum oregmone laboraret, & propemodum strangularetur, sudores iam frigidi adessent, liuesceret omnia extrema, potissimum facies, subito alui fluore superueniente, maxima saniei copia effusa, breui tempore conualuit: raro igitur cum id faciat natura, cum eadem nobis incognitas vias sibi struat, cum praeerea non sit per loca conuenientia, omnino non erit imitanda à medico; potissimum quia si leuiori purgante vtemur, noxij nihil euacuabimus, sin validiori, vires imbecilles reddemus in quibus solis salutis spes posita est, vt, & ferendo morbo sint idonei; & materia per tussim sreatu expelli satis possit.

128. Per *Urinam*, licet quae in thorace, & pulmonibus continetur materia difficillime, & minus tuto educi possit; promouentibus tamen lotium, tuto vti possumus, vt saltē materia, quae in vomica adhuc continetur, quaeq; & denuo colligitur; per vesicam excerni possit: quod sciamus venam azygos interdum inferi ramulis arteriae aortae; interdum cauae venae bifurcatae ad renes interdum venae adipali, vel emulgentibus, & propterea frequentior etiam est per vesicam eiusmodi materiae euacuatio, & proinde etiam imitanda, cum etiam sit per vias conuenientes.

129. In vitione, & sectione facienda in Empycis haec sit cautio, ne à rptione vomicae statim fiat, sed cum Hipp. in Coacis praedictionibus differenda erit in decimum quintum diem, vt, & materia coctione vltiori mutescat magis, qui ab effusione extra locum, vbi maturauerat, iterum alteretur, & vltiori coctione melior reddatur, post quem diem, si inustio fienda, omnino maturandum. Placet enim Oribas. 9. synopseos cap. 3. celeriter eua-

Suppuratis diuretica conuenire possunt, & cur.

Empyci qñ vrēdi, aut secādi

cuandā esse, neq; multū cunctantū, ne vires col-
labascant, in quo casu omninō à tali actione absti-
nendum est, ne in illud incommodū incidamus, in
qd cū certo mortis periculo incurrūt, qui in ascite
ad sectionē nunquā veniunt, nisi cēteris remedijs
omnibus primū in vsum ductis, & iam viribus
exhaustis, & morte prae foribus stante.

Suppura-
tis vom-
itus pericu-
losus.

130 In suppuratis vomitus plenus est periculis
si enim eodem tēpore vehemens tussis, & excrean-
di necessitas superueniat; simulq; euomātur impe-
tu multo ex ventriculo crassiora, vix evitari po-
test suffocatio, conspirante ad suffocationem, &
æsofago, & arteria aspera: tūm præterea quod,
constrictis musculis abdominis in vomitu, puris
copia multa in pectore repleto coarctata, magis in
regione venosæ arteriæ compulsa, sæpè cor ita suf-
focat, vt statim mors subsequatur.

Suppura-
tis vom-
itus quo-
modo pro-
vocādus.

131 Proderit tamen inanem vomitum. etiam
digito prouocare, non tamen promouere: sic enim
à rectis abdominis musculis ab infernis partibus
compressio diaphragmate materia paratior faci-
lius propelletur.

In Asthmate.

In asthma-
te atte-
nuantia,
& impen-
se calida
mala.

132 CVM maiori ex parte difficultates ex re-
spirationis à crassa, & viscida materia in-
spirationalibus partibus contenta producantur, sæpè
etiam non leues errores à medicis committi so-
lent, dū illam præparantes ad euacuationem
attenuantibus valentioribus vtuntur, & impense
calidis; exhausta enim sæpenumerò parte tenuio-
ri, crassescunt nimium reliquæ, & morbum red-
dunt incurabilem.

133 *Quin, quòd quandòq; ex nimia arefactione pulmonum fiat, coarctatis, & quasi in globum ductis pulmonum alis, magna diligentia adhibenda erit, ne, dùm attenuare, abstergere, & incidere materiam, quæ vt plurimùm anhelationem producere solet, tentamus, siccitate in parte adaucta, ægrum in mortem præcipitem agamus.*

Asthmaticis sicca, fugienda.

134 *Vrinam promouentia tutò in hoc morbi genere in vsum duci non possunt, potissimùm si valida fuerint; sæpè enim euacuatis tenuibus partibus, quæ supersunt crassiores redditæ difficilior rem reddunt curationem.*

Asthmaticis diuretica mala.

135 *Quàmuis, quæ in thorace continetur materia vix medicamento purgante euacuari possit; quoniam tamen maiori ex parte aliundè potissimùm à capite effluit, & suffocationem auget, optimum erit medicamentis antecedentem illam materiam, vbi præparata fuerit, euacuare, at id in magno paroxismo præstare periculi plenum est negotium, ne aut superueniente vomitu æger suffocetur, aut deiectis viribus vitalibus, animalis, quæ per rissim excernit succumbat.*

Asthmaticis purgatiua quomodo in vsu ducenda.

136 *A vomitorijs potissimùm in vehementi suffocatione abstinendum erit; quidquid dicat Rasis; imminet enim periculum suffocationis absolute; mirum enim in modum nifus ille pectus affligit, metusq; adest, ne materia in æsophagum ad ducta asperam arteriam opprimat.*

Asthmaticis vomitus malus.

137 *Ius galli veteris ex agarico, sena, cgnico, adianto, marrubio, hyssopo, passulis, seminibus discentibus, quod passim paratur; & à Mauritanis primò in hoc morbo, & colicis doloribus ad eò malum, & commendatur, quòdq; ab antiquis, & recentibus præmaticis passim vsurpatur, quòd experientia*

Asthmaticis ius galli veteris malum, & cur.

non correfpondeat, & rationi aduerfetur, tanquā noxium reiiciendum eſt: cū enim ſæpius in magna hac vrbe à doctiſſimis medicis in uſum ductum cernerē, potiſſimum ex deſcriptione Benedicti Faentini in Empirica, cū, & ego aliquoties, irritò ſucceſſu, in huiusmodi morbis exhibuiſſem, cur fruiſtraremur noſtro fine indagare cēpi; atque ob multas rationes obeſſe ſæpius, prodeſſe vix vnquam mihi perſuaſi, ex longa enim ebullitione nitroſæ illæ partes, quibus maximè prodeſſe ius illud galli veteris crediderunt, tanquam terreſtres ſubſident, atque in percolatione reiiciuntur; viſcidæ autem, glutinoſæ, craſſæ, tūm, & perpingues ex cute, pedibus, alarum extremis, muſculofis denique, & neruoſis partibus promanantes maximè remanent, vnde non ſolū non adiuuabit materiæ ex pectore excretionem, ſed craſſiore, & viſcidiorē materia, & antecedere, & coniuncta reddita contumaciorē, magiſq; rebellem ad excreandum reddet: quod ſi non iuris ſubſtantiam, ſed quæ illi incoquuntur conſideremus, ne ſic quidē in huiusmodi morbo cum multa piritæ copia conueniet, quæ enim prò ſoluenda aluo induitur agari-cis, ſena, ſemina, cartami, omnino, cū pauciſſimam admittant ebullitionem, vim omnē ſoluēdi amittunt, ex longa ebullitione igneis partibus diſſolutis; quæ verò attenuantia etiam adduntur, vt capillus veneris, & alia, cū in ſuperficie vires ſuas ſortita ſint, ex eadē illas amittunt: alia verò, vt origanum, botris, ſarfara ex longa ebullitione putrilaginoſa redduntur, atque omninò exoluuntur.

Sudorem
motientia
in Aſthma

138 Sudorifera in hoc morbi genere, qualia ſunt decocta Guaiaci, chinæ, ſarzæ pariliæ, ſaffras, vt concedi poſſunt in aſtmate ad abuſum.

dam

dam materiam antecedentem, quin, & coniunctam, ita maximè cauendum est, ne ingruente magna suffocatione in vsum veniāt: suffocantur enim magis ægri, & aucta necessitate spirandi, quandoque magna sequuntur pericula, & venarū in pulmonibus disruptiones, quin, & mors ipsa.

139 Cū tamen exsiccati facultate insigni polleant hæc, nonquam in vsum venire debent, nisi admixtis ijs, quæ dulcore, & asperæ arteriæ possint ablandiri, & humores in pectore, & pulmonibus contentos ad excretionem magis paratos reddere.

140 In paroxismo ne medicamento purgante vtantur medici, ne irruens materia attracta vi medicamenti non ad ventriculum, sed ad locum imbecilliozem, & solitum subito ægrum interimat suffocando.

141 Sic quoque eodem tempore non est siccandum, ne suffocetur æger; blandiendum enim potius eo tempore teste Gal. quàm curandum.

142 Quin ne clysteribus quidem tunc locus est neque enim prostratis iniici potest citrà suffocationis periculum.

143 Vomitus etiam, vt diximus, eo tempore euitandus; neque enim materia in spiritalibus contenta euacuabitur, sed quæ in ventriculo: quæ cū per œsophagum vi expellitur, ita arteriam asperam comprimit, vt suffocet.

144 Eodem tempore supinus viterur decubitus, nam, vt ait Arethæus, strangulationis periculum affert.

145 Fricatio etiam pectoris eodem tempore omnino fugienda.

146 Quin ne fouendum quidem pectus spon-

ticis quomodo, & quā conueniant, & quā non.

Asthmaticis sudorifera in vsum non veniāt sine dulcibus.

In paroxismo Asthmatis medicamentū purgans non est propinandum.

In Asthma te blandiendum egro in paroxismo.

In paroxismo asthmatis ne clysteribus quidem vtendum. Nec vomitus vtendum.

Non stet supinus. Non fricatus dū pectus. Nec fouendus dū pectus.

gijs cū laxatibus; calor enim ille, sæpè flarib. excitatis, & symptoma auget, & quandoq; suffocat.

In Astmate sæpè mutanda medica-
menta.

147 Quāuis in omnibus ferè morbis illud Hipp. verissimum sit, non esse mutanda benè instituta remedia stante eo, quod ab initio visum est; in hoc tamen, communi omnium scribentium opinione, quamuis ad eundem scopum spectantibus eadem seruanda sit intentio, varianda tamen erunt remedia.

De sputo sanguinis.

In sputo sanguinis quæ venæ secandæ. Sanguinis sputo exrerētis mē-
sibus quæ venæ secandæ. Secta venæ in talo in sputo sanguinis affatim esse sanguinē detrahendum. Sanguinē reiectatibus cucurbitulis par ti affixa-
quādo cō-
uenit.

148 C Vm in sanguinis per tussim reiectione soleant medici statim optimo consilio ad missionem sanguinis per sectam venā in brachio potissimū dextro ex iecoraria recurrere, animaduertendum sæpenumerò id in mulieribus euenire ex suppressis menstruis purgamentis, aut alia cessante euacuatione, quæ per hæmorrhoidas; & in eo casu si sanguinem ex brachij venis extrahemus, pessimè nostro egrotanti erit consultum; potius enim fluxioni addemus occasionem, ad superiora ratione vacui sanguinem attrahentes: præstabit igitur, secta vena in talo, ad inferna retrahere sanguinem, mox repetitis vicibus ex brachio etiam conueniet eundem corruare.

149 Sed vt in reliquis occasionibus in hoc morbo, dum ex venis brachij sanguinem euacuantes repetitis vicibus, & in non multa quantitate id præstamus, ita dum ex talo sanguinem ob eas causas detrahimus, copiosè, & affatim id præstabimus vt vera fiat reuulsio.

150 Conantur aliqui in sanguinis per os reiectione cucurbitulis, aut illū ad loca, vnde effluit,

reuo-

reuocare, aut in ijsdem retinere felici interdum, successu, aliquando cum egrorum calamitate, propterea distinctione opus est: nam si ab externa aliqua causa in his partibus vas fuerit disruptum, indeque per os sanguis reieceretur, si cucurbitula fluxum retinebimus, phlegmonem in parte sine dubio concitabimus, quod si non roso, aut disrupto vase, sed recluso id fiat, tuto cucurbitulae tunc ad moueri parti poterunt.

151 Cauendum maximè ne, quod plerique faciunt, à reiecto sanguine per disruptam venam glutinantibus statim utamur; ut enim hoc aliquando confert, si effusus à vena sanguis in pulmones, aut thoracè per tussim sit totus euacuatus: ita si illius portio adhuc conclusa, & fluitans remaneat circa pulmones, tantum abest ut glutinaria iuuare possint, ut potius ægrum præcipitem ducant in mortem: viscidior enim reddent sanguinem, & crassiorem, sicque ineptum magis reddunt ad excretionem, unde suffocationes, anhelitus interceptiones, febres vehementissimæ, inflammationes partis laborantis, & subinde mors: grumi igitur prius erunt incidendi, & excernendi, & tunc glutinantium usus erit ineundus.

152 Quod de glutinantibus dictum est, ad exciccantia, & adstringentia omnino etiam erit deducendum. Videas enim plerosque statim ac insipientem sanguinem incidunt, non etiam penè perspecto vero loco laborante, an thorax, & pulmones illum per se euomant, an à capite ad spiritalia loca sanguis feratur, neque grumi adhuc adhæreant, & an sanguis adhuc ibi fluitet, adstringentia, & quidem valentiora iniungere, & etiam lambendo propinare, unde lethales suffocationes oboriuntur.

153 Præ-

Glutinantia in sanguinis sputo quando cōueniāt.

In sputo sanguinis adstringentia quando vtilia, & quando nō.

Adstringē-
tia suspe-
cta in spu-
to sangui-
nis cum
febre.

In sputo
sanguinis
ex acri hu-
more sta-
tim pur-
gandum.

In sputo
sanguinis
valida me-
dicamēta
fugienda.

Aloes san-
guinē re-
sectantib.
mala.

Rhabarba
rū in spu-
to sangui-
nis suspe-
ctum.

In sputo
sanguinis
quādo va-
lentē sic.
cantibus
vtendum.

153 Præsentē febre vehemente in adstringenti-
bus, & agglutinantibus temperati esse debemus,
potissimum si aut ab inflammatione, aut etiā inde-
pendens sit: non minus enim ex ea imminet pericu-
lum, quā ex sanguinis eruptione.

154 Vbi ab erosionē vasis, vel etiā a pertione ex
acriori sanguine, ac bile referto sanguinis fiat re-
iectatio, purgandus ab initio. statim erit biliosus
ille humor, ne, dūm attēperare illū prius tentaue-
rimus, copia sua, & acerrima qualitate perfectum
producat symptoma; neq; enim putrefactus est, vt
coctionē indigeat, & cum tenuis sit, medicamen-
torum attractioni facillimē cedit.

155 Medicamenta tamen non sint valentiora,
quod ea calida cum sint, acrimoniam in humori-
bus adaugeant; & valida motione potius fluxionē
concitent; hinc, quæ scammonium continent, fu-
gienda erunt, non solum ob eam causam, sed etiā
quod venas aperiant.

156 Qua etiam ratione, & aloes, & ex eo pa-
rata medicamenta in vsum duci non poterunt,
& quod venarum ora aperiant, & acriora sint,
quā par sit.

157 Quinimodò rhabarbarum aliquandō in hoc
symptomate noxium esse solet; cum enim igneis
suis partibus altius se se insinuet, & sanguini mi-
sceatur, quod vel ex loco impēsē flauo ab eius as-
sumptione perspicue colligitur, vbi fortē non pro
ratione bilis educatur, acutior, & calidior sanguis
redditus morbum magis acuet, & deteriorē reddit.

158 In sputo sanguinis ex vasis, aut pulmonum
erosione illud maximē animaduertendū, an plus
sanguinis expuatur an puris: si enim plurimum
sanguinis, adstringentibus maximē reserit agen-
da:

da:

da: sin verò multum puris, & parum sanguinis excernatur, potentèr siccantibus erit vtendum citrà multam adstrictionem, alioqui pus perdit pulmo- nes, sic Gal. 5. meth. 6. solis Trochiscis Andronis Polyide, vel ex carta combusta vtebatur: Vndè, & cum pus merum excernitur, solis similibus Trochiscis vtemur.

159 Non placet eorum sententia, qui Themisonis, & Thessali sententiam sequentes in rupto, vel aperto vase sincerum acetum ad sorbendum, & lambendum concedunt, vt aut adstringant, aut grumofum sanguinem incidant: certissima enim vtentibus illo sincero imminet perniciēs; partes etenim certissimè exasperat, ac vbi per asperam arteriam transit, tussim excitat, vndè nouum fluorem promouet: dulcorandum igitur erit, aut melle, aut saccharo, atque sic in vsum ducendum.

160 In Topicis adhibendis placet Tralliani consilium, vt emplastra frequentèr mutantur, ne incalescant; id enim inquit, sanguinem eò vocat, propterea irrigationes potius placent.

161 Frigidissima tamen actu hæc esse non debent: præterquam enim quòd talia omnia pectori inimica esse censuit doctissimus senex, si externæ etiam partes rubræ, & calentes fuerint, sanguinem ad interna propellendo fluore concitabunt.

162 Quàmuis quæ valentèr adstringunt, & exsiccant vrgente morbo maximè commendentur; cautè tamen etiam hac in re agendum est, & incrassantia erunt admiscenda; vt amyllum, far, & lac; quod immoderatus siccantium vsus tussim excitet contumacem, sed inanem, vndè aut noua fluxio sanguinis promouetur, aut venæ magis lacerantur.

Aceti solius vsus in sputo sanguinis suspectus.

In sputo sanguinis Topica sepius mutantur. Frigidissima actus non debent, quæ thoraci applicantur. Siccantia valenter in sputo sanguinis emplastricis admiscenda.

De Phthysi.

In phthisi
à lacte as-
sumpto dor-
miendum.

163 **C**um inter omnia præsidia, quæ in phthisi
in usum veniunt, lac primû sibi locû ven-
dicet, vt multa de specie lactis, de quantitate, de
tẽpore, de modo, ac mixtione optimè à Gal. 5. &
7. meth. med. proposita, & recentioribus plerisq;
recipienda, & cõmendanda iudico, ità illud, quod
ab omnibus ferè recentioribus additur, nusquam
tamen à Gal. traditû, nõ recipio, vt à lacte assam-
pto non dormiant ægri: cum enim per quinq; ho-
ras antè cibum velint exhibendû esse ægris lac, si
sõnus inhibeatur, & præstantissimo auxilio tabidi
destituentur, sõno nempe matutino, potissimum,
cû exsiccati sæpè noctes insomnes ducere soleant,
aut ob tussim molestâ somnus impediatur, si etiã
eo tẽpore à somno arceamus, & siccitatem augebi-
mus, & vires vitales imminuemus; per somnû au-
tẽ, & vires instaurabimus, & corpus siccatum hu-
mectabimus, & coctionem lactis in ventriculo ac-
tulerabimus. Neq; enim valet ratio Mercurialis,
quod somno maiores fiant euaporationes; quod
in tabe, siuè hectica febre, siuè catharro, & pulmo-
nis vlcere blanda illa euaporatio lactis maximè ad
somnum maiori ex parte deperditum conferat; in-
verà autem phthisi cum distillatione acri, & salu-
ginosa, & vlcere pulmonis temperata hæc euapo-
ratio utilis erit, ac acriorum exhalationum calo-
rem tẽperabit: plûsq; utilitatis somnus ille cõfe-
ret tussim cohibẽdo, quã damni euaporando; ma-
ximè cû tussis concussione lactis concoctio im-
pediatur.

In phthisi
blandè al-
uus mol-
lienda.

164 Cum phthisi consumptis, si alui fluor su-
perue-

peruenerit, lethale fit, maxima cautione vtendum est, si in ijs alius non deiciat, in vsu subducentiũ; blandè. n. omninò agendũ, neq; cassiam, prunorũ dulciũ decoctũ, manã, mel violatũ, aut ad summum mel rosatũ solutiũ transcendere debemus.

De Tussi.

165 **Q**uod scriptũ sit ab aliquib. & doctis quidẽ viris, efuriat, sitiãt, vigilet, qui rheumata curat, in curanda tussi, quàm plures agrotantes vigilijs macerant, vt fluxiones impediãt, pessimo sanè consilio: vt enim superfluum somnum cerebrum nimis replere concedimus, ita immoderatas vigilias multò maiora incommoda afferre experimur, potissimũ cum per eas vitales vires corruant, quæ in huiusmodi morbo maximè necessariae sunt: vigilandũ sanè est, cũ à cerebro adeò affluit materia, vt subitè suffocationis periculũ immineat, & tandiũ vigilandum, quandiũ tale imminet periculum: secũs in tussi moderata; dormiendum enim vt concoquantur humores, & quiete pectus firmetur; si enim Galen. 1. de hum. cap. 28. vt citat Rabi Moyses 23. sect. aphor. scribit tussim, sternutationem, & singultũ curari aliquando, cũ homo sustinet, atq; se se ab ijs, quantum fieri potest motibus efficiendis abstinet, [quoniam cũ motus iste fiat à voluntate, sed irritata, potest quis interdũ volens non tussire,] cur etiã somnum non commendabimus, in quo omnes sistuntur fluxiones, & tussis quasi suspenditur?

In tussi
quomodo
vigilandũ,
& quando.

166 In vsu pilularum in tussi ad euacuandam materiã in capite existentẽ non placet aliquorum sententia, inter quos fuit doctissimus Mercurialis, qui Pilulæ in tussi malè post coenã dantur.

qui voluerunt eas exhibēdas esse per quatuor, aut
 quinque horas post cenā: quando vētriculus nondū,
 vt ait Mercur. ex toto vacuus est, qm̄ tunc magis
 supernatāt, & facultatem mittunt in pulmones, &
 asperā arteriam. Cū ē contra illud certissimū
 sit ex hoc modo exhibitionis multa sequi incom-
 moda; nā aut cū cibo citius subducentur ad intesti-
 na, quā oporteat, aut sanē semicōcoctū cibū de-
 ducunt ad inferna, aut omniū fiet confusio quare
 præstat aut incenatum illas sumere, aut sanē sum-
 mo mane ieiuno, & vacuo ventriculo deuorare,
 procurato somno per vnā, aut alterā horam.

De cordis palpitatione.

In cordis
 palpitatio
 ne quādo,
 & quate-
 nūs sāguis
 mittēdus.

167 **I**N grauissimo hoc morbo curando cauendū
 maxime, ne Gal. verbis 5. de loc. affect. 2.
 vbi asserit omnes, qui passi sunt palpitationem
 cordis à sectione venæ iuuamentum accepisse;
 quem secutus Auic. 1. Tertij tract. 1. cap. 7. in om-
 ni cordis morbo, scribens, vtilem esse sanguinis
 missionem, quispiam adductus in omni cordis pal-
 pitatione sanguinem per sectam venam euacuet;
 neque enim in omni, neque semper Galen. sectio-
 ne venæ vtendum ibi cēsuit; sed omnes, quibus su-
 bito, cū sani essent, sinē vllō alio accidente cor-
 dis palpitatio superuenit, sanguinis educationem
 iuasse: hos verò, quod integra, & inculcata vale-
 tudine fruerentur, à sanguinis copia forsan, & ca-
 lidioris, in eum morbum incidisse mihi sit verissi-
 mile: quod quilibet etiam ex Gal. 2. de causis puls.
 cap. 2. colligere poterit, cū dicit; Accidit etiam
 pulsuum inæqualitas interim ex sanguinis copia;
 qui aut in venas, aut arterias ipsas sit infusus; atq;

hæc

hæc quidem sanguinis missione sedatur facillimè
hactenùs Gal. Causa est, quia copia illa in venis ar-
terias illis vicinas præmit, & coarctat; quæ si venæ
sectione tollatur, tumorem, extensionēue venarū
tollit, locumq; subindè dat ad motū arterijs; vnde
verissimū est, cuicumq; cordis palpitationi ex hu-
morum copia in venis existentū optimum esse
præsidū sanguinis per venā detractionē; quod cō-
firmavit etiam Gal. lib. de venę sect. aduersus Era-
sistratēos c. 4. quemadmodū etiam, si aut æstuatio,
feruorue sanguinis, siue erysipelas, aut cor ipsum
tentare aggressus sit, aut etiam venas, arteriasque
vicinas inuadens, & palpitationē inducens ad hoc
auxilium aggrediendum nos inuitat. Præcepit hoc
Gal. 13. meth. cap. 11. & lib. aduersus Erasistratēos
c. 8. At vt hæc verissima sunt, ita afferendum est, in
vera illa cordis palpitatione, quæ illi cum alijs par-
ticulis cōmunis est, quæq; morbificæ solius causæ
soboles est, nō conferente facultate, quæ maiori ex
parte ex statu est, diminuto calore; ùm etiā in non
vera, quæ cordis ppria est, si vel ex frigido humo-
re, qualē describit Hipp. vel si alio lib. de sacro mor-
bo, cū scribit: si porrò ad cor progressum fecerit
affluxus, palpitatione apprehendit, & anhelationes,
& corpora corrumpuntur, aliqui etiā curui fiunt;
cū enim descenderit pituita frigida ad pulmo-
nē, aut ad cor, perfrigeratur sanguis, venæ autem
violenter perfrigeratæ ad pulmonem, & cor assi-
liunt, & cor palpitat, nullo modo sāguinis missio-
nē conuenire: quin ne tunc quidem sanguinis per
sectam venam euacuatione vtendum est, cū cor-
dis palpitatio à virulenta materia cor impetente
sit, aut à vapore, fuligineue venenosa. Quod si
Auic. in omnibus cordis affectibus venę sectionem
vtilem

utilem esse dixit, nō propterea tamen in omnibus causis euincendis morborum cordis utilem esse pronanciauit, sic etiam in palpitatione conueniet, at non semper, neque in quacunque palpitationis causa commendanda.

In palpitacione cordis ubi in sanguinis abundātia mittendus sit sanguis quē cautio adhibēda.

168 Sed illud in euacuando sanguine per sectā venā maximē animaduertendū, si maximā in corpore laborantis hoc morbo subesse sanguinis, & humorū abundantia cognouerimus, quā non tantū vires præmat, sed & ipsa quoq; vasa distēdat, tutō nos ad illud auxilium descendere non posse, nisi sanguinis motum cor versus abundē proficiſcentis simul compescamus, ac ab ipso corde reuelamus: cū enim cubiti vena, quē secunda est, ab axillari, axillaris autem non longē ab ascendētis venæ cauæ ramo proficiſcatur, vnde in cor ramus insignis coronarius diuaticatur, abundantiorē sanguinis copiam ex vena caua hauriri continget; ex qua quidē re fiet, vt plurimus sanguis cor versus iter arripiat, sicque cordis viscus magis suffocabit, ne igitur in hoc incommodē incidamus, eo ipso tempore, quo in brachio venā tū detur, vtriusq; hypochondrijs optimū erit cucurbitulas affigere dextro quidē, quod indē vena caua exoriat, sinistro autē, quod illic plurimæ terminentur arteriæ, quæ spirituſum à corde sanguinē reuellere poterunt: sic enim fiet, vt quæ iam inuasura erat cor sanguinis copia, cucurbitulis admotis reuellatur, quæ verò influxit, vena secta exhauriatur.

Cucurbitula in palpitacione cordis quā applicanda.

169 Quodd si humoris, & sanguinis tanta non adfuerit copia, aut sola sufficiet sanguinis per sectam venam euacuatio, aut sanē post illam applicari poterunt.

170 At ubi insignis adfuerit sanguinis abundantia,

dantia, in vtriusque brachij cubito venam aperire
vtilissimum erit, si verò non adeò magna fuerit,
sinistri tantum sufficiet sectio.

171 Quòd si, ne sic quidè affectus cessauerit,
arteriosum, & spiritibus plenum subtilissimum in
arterijs potiùs abundare iudicabimus; & tunc
cum Gal. de cur. rat. per sang. mis. 22. sectione ar-
teriarum opuserit.

172 Sed in eo casu non magnas, sed exiles po-
tiùs eligemus secandas, quales sunt ea, quæ per di-
gitos excurrunt: licet .n. parvæ sint, maximù tamē
iuuamentum afferunt; atq; faciliùs inducta cic-
atrice sine aneurismatis periculo coalescunt.

173 Cucurbitulas scarificatas dorso affixas cor-
dis palpitationem curare scribit Rases 7. continē-
tis. At Auic. 4. fen. primi Doct. 5. cap. de cucurbitu-
lis, easdem dorso applicatas aliqua quidè bona
facere scribit, sed, & ventriculum lādere, & cor-
dis tremorem inducere: si tamen cautio adhibea-
tur, vtrunque optimè obseruasse dicemus, quid-
quid dicat Mercurialis noster in sua Praxi capit.
proprio, cum sciāmus peritum Medicum nunquā
repleto corpore cucurbitulas ante totius expurga-
tionē applicaturū. Distinctione igit potius alia op-
est; nam si ex humoribus palpitatione cordis pro-
ueniat, si dorso è regione cordis, vt plerique fa-
ciunt, cucurbitulæ applicentur, id in manifestam
ægri perniciem fiet: augetur enim circa cor san-
guinis copia ob calorem, & dolorem, docebat
enim Galen. 14. meth. 17. vbi in ijs sit plethora
non magis ex pulmone in pectus aliquantū excre-
menti partem transferri, quàm ex toto corpore
in vtrumque. At vbi palpitationis cordis status
fuerint in causa, euacuata materia, vnde eleuan-

In palpi-
tatione cor-
dis quæ ve-
na secāda.

Arterio-
mia in cor-
dis affecti-
bus quādo
conuenit.

Arteriz
quæ secan-
dæ in cor-
dis palpi-
tatione.

Cucurbitu-
læ dorso af-
fixæ in asse-
ctibus cor-
dis quādo
profunt.

tur, cucurbitularum applicatio dorso, è regione cordis præstantissimum erit remedium. Quinimò applicari etiam commodè poterunt, ubi cum flatu frigidus quispiam humor coniunctus fuerit; nam ventosus spiritus admota cucurbitula digeretur; qui verò reliquus est humor, facilius evacuatione detruderetur.

In flatibus 174 Flatibus etiam cordis palpitationem inducentibus semper humorum, & in ventriculo, & intestinis; & flatuum ibidem collectorum maximè habenda est ratio, atque ij, inde subducendi; quod ijs inanitis sæpissime solutos etiam eos observaverimus, qui circa cor obversantur.

In palpitatione cordis ex flatibus, 175 Fugendum verò quàm maximè illud, de quo nos Gal. 12. meth. ultimo admonuit, si adhuc in ijs partibus succi, ex quibus flatus eleuantur continerentur, à nulla re magis esse metuendū, quàm à calore, quò de eos colliquet, atque in flatum vertat, sed digerere non valeat; crassa enim, & glutinosa dum calefiunt, flatuosum spiritum gignere solent; Galen. teste ibidem.

Repellētia 176 Vbi ad cor aut efferuescens sanguis, aut bilis affluat, ut phlegmones, vel erysipelatis periculis ad sit, quibus in corde productis desperata cordi applicanda, omninò salus esse solet, statim à sanguine misso, ubi dum mittitur, circa cordis regionem repellētia adhibere cōvenit, quæ quàmvis in morbis pe-

Corde laborate ex crassis humoribus 177 Cloris omninò fugienda esse constitutum sit; in hac tamen affectione, cum ad quamcūq; partē materia fluens repellatur, ea sit ignobilior corde, nec inde adeò subito mors imminet, nulla interposita mora applicanda sunt.

Ex sudoriferis 177 Vbi ex crasso sanguine cor huiusmodi morbis laborat à diureticis, & sudoriferis erit abstinen-

stinendum ; nam hæc exhauriunt serum sanguinis, & sanguinem crassiores reddunt.

178 Verum si aquosus humor, & serosus morbum illum producat, nihil est, quod facilius vim huius morbi possit euincere.

179 In flauiscentia palpitatio vehementer resoluenda damnanda sunt, nam spiritus vitales nimis exhauriunt; quod si in usum ea ducere necessitas cogat, adstringentia aliqua erunt admiscenda.

Si ex serosis optima sunt. Dilectantibus flatus in cordis palpitatio ne miscenda sub adstringentia.



LVD OVICI SEPTALII

MEDIOLANENSIS,

ANIMADVERSIONVM,

& cautionum Medicarum,

Liber Septimus, com-
prehendens eas,

*Quae in reliquis à spiritualium partium morbis
sunt observanda*

De dolore ventriculi.

Dolere ven-
triculo ob
inflamma-
tionē pur-
gantia fu-
gienda.

Quae va-
cuantia in
vsum du-
cenda.

Rhabarba-
rum in do-
lore vētri-
culi inflā-
matorio fu-
giendum.



IN Inflāmatorio dolore inflāmatio-
nē partis, aut Erysipelatosum affe-
ctū insequente genus omne medi-
camenti purgantis fugiendū erit,
nisi simul affluxā ad ventriculū bilē
cognouerimus; in quo casu purgātia omnia euita-
bimus ob innatā caliditatem, & ne nouae fluxioni
ad partem iam dolore laborantem detur occasio,
concedemus tamen lenientia, abstergentia cū re-
frigeratione aliqua: tamarindi, serum, syrupus
violatus, & similia concedi poterunt.

2 Rhabarbarum multis in hōe familiare om-
ninō fugiendū, nam, & igneis qualitatibus nocet,
& biliosi humoris affluxum solet concitare.

3 Opium, & opiata licet in omnibus ventri-
culū

culi affectibus fugienda sint: urgente tamen dolore inflammatorio cū lenientibus ea admisceri tantum pauca quantitate possunt; sic enim neq; actionem impediunt, dolori succurrunt, & intemperiem imminuent: etenim sic Gal. de compos. med. secundum loc. circa medium, examinans medicamentum quoddam Asclepiadis ad stomaticos, quod recipit plura medicamenta, & inter hæc aloem, & opium, reddensq; vtriusq; rationē inquit, aloem viciatos humores expurgare, & infernē per aluum euacuare: opium verò sensum obstupesciēdo mitigare molestiam ortam ex acrimonia humorum: erat itē opij ad reliqua medicamenta dosis vnius ad viginti quatuor; quam etiam non improbat.

4. In inflammatorio dolore ventriculi, aut incipiente Erysipelate aquæ frigide potum, aut frigidi applicationem, vt conuenire aliquandō concedimus, itā id faciendum ab initio maximē censemus; affluxa enim materia, si frigida exhiberetur, morbus curatu difficilior redderetur.

5. In doloribus autem ventriculi, & intestinorū à frigida materia, aut à statu ex ea genito, si contumaces fuerint, & multa subsit materia hiera licet à Gal. cōmendetur, & à plerisq; medicis, quoniam tamen tardissimē operatur, ac sæpē dū ob viscidā materiā tunicis ventriculi adhæret, attenuata, & in halitus conuersa materia ventrē distendit, & dolorē auget, necessarium esse cēseo medicamentū aliquod purgans admiscere, quod, & materiem adiuuet subducere, atq; hieræ vim intendat, vt diaphenicū, electuarisū electeoph, & similia; neq; multū dubitandū est, ne ad partem laborantē fiat multus materiæ affluxus; cū enim tā multa adsit crassa, & viscida materia vim omnium medicamen-

Opiata in dolore ventericuli inflammatorio quādo concedenda.

Ventriculo dolente ob inflammationē frigide potus & extra appositio qñ conueniat.

Ventriculū in dolore ex frigida, & crassa materia, hiera aliquod medicamentū purgāsmiscendum.

ni reliquo totū habet, & impedit, ne à longinquis tra hāt, materiā autē etiā in eo existentem, & attractā, quamprimum subducāt, itā vt minima ventriculo noxa inferatur ex affluxu materię, utilitas verò maxima ex causę morbosicę euacuatione, potissimum sedato dolore.

De ventriculi imbecillitate ex frigida intemperie.

Puelli ven- **I**N puelli bonę constitutionis, aut catelli per-
triculo ap-
plicandi ne
somnia in-
terruptant.
pinguis applicatione regioni ventriculi pri-
ma hæc sit animaduersio, quod, cum in tarda co-
ctione ex frigida intemperie, nihil sit quod magis
coctionem adiuvet, quā longus, & nō interrup-
tus somnus, animaduertant patientes, ne ex in-
quietis sit puer, qui ex assiduo motu somnum pa-
tientis interrumpat: maius enim indē damhū ex
impedito somno sequeretur, quā utilitas ex blādo
illo calore, quod etiam ex catellis magis verendū;
potissimum si patiētes ex ijs sint, qui, & facillē ex-
pergiscantur, & difficillimē in somnū relabantur.

Puelli in
applicatio
ne cauendū
sudor.
7. Secundò illud etiam animaduertendum est,
sæpenumerò ex hoc complexu sudorem excitari,
qui nisi assiduē detergatur, noxam affert magni
momenti: quare vel ab eo desistendum erit, vel
intermedio subtilissimo linteolo in eo petseue-
randum.

Ite pollutio nocturna. **S**unt etiam aliqui adeò in venerem proni,
vt ex eo amplexu in somno polluantur, aut ad ve-
nereos congressus concitentur, in quibus omninò
ab huiusmodi remedio est abstinendum.

De Nausea, & vomitu.

Etsi quamplurima ad vomitum attinentia superius proposita sint, hoc tamen loco aliqua non sunt omittenda magni momenti, quæ in vomitu exercendo pro nausea, & vomitus curatione maximè sunt, & animaduertenda, & cauenda. Primum igitur sit, quòd licet in aliquibus, quibus, aut ob ventriculi imbecillitatem, aut ob affluxum aliunde humorum colligitur materia in ventriculo, concedendus sit vomitus, frequentius tamen id non erit præstandum, sed semel, aut bis in mense, ne, & in malam consuetudinem deducamus naturam, partem imbecillio rem reddamus, & membrum coctioni ciborum, & nutritioni inferuiens sentina excrementorum efficiatur.

10. Cum vomitu materia expellitur siue sponte, siue leui vomitotio [nunquàm enim fortè in hoc casu vtendum est] non erit longiori tempore in eo insistendum; cum alioqui cupiditas euomendi sæpè perseneret, ne ex nixu, seu vomendi impetu, aut vena aliqua in pectore, aut in gula disrumpatur, aut affluxus nouus materiæ potissimum biliosæ concitetur, infra igitur potius subsistendum.

11. Repetita etiam potius euacuatione, & interpolata id fiat, quàm vnica.

12. Quinimò prior magis protrahi potest, posteriores autem breuiores sint, licet cum aliqua vehementia maiori, illud quidè, vt multa materia expelli possit, hoc autem, vt crassior pars, & quasi amurca, aut sex in fundo ventriculi subsidens educi quidè possit, sed nulla alienæ materiæ ad partem attractione.

Vomitum fugiendus, frequentior sed vrgente necessitate fiat semel in mense.

In vomitu non diutius insistendum.

Vomitum potius repetendus quoad in eo insistendum. Vomitum reuertitur quales esse debent.

**Vomit⁹ qui
sigulomē-
se sunt nō
habeāt diē
statutum .**

13 Si quis, non ex nausea necessitatem vomendi commonstrante ad vomendum promoueatur sed quod se id effugere non posse experimēto cognouerit, statutum in mense diem, aut terminum non præfigat, sed nunc plures, nunc pauciores dies interponātur, ne in præuā, & ineuitabile consuetudinē itā deducatur, vt si statutū terminū aliqua data occasione trāscēdat, in morbos aliquos incidat.

**Vomitū q
abstinēdi .**

14 Quamuis autem data hac occasione vomitus euacuandi sint, si tamen ad vomendum inepti fuerint, aut si perpingues fuerit, aut angusto miūm pectore, aut si aliās sputo sanguinis tentati fuerint, aut si cerebro admodum imbecillo, aut oculis debilibus præditi sint potius per inferna purgabimus.

**Vomēdum
quādo ie-
iunovētri-
culo, & qñ
ā cibo .**

15 Vt cōcedendum vomitoria, quæ vehementia sunt quibus humores expellūtur à toto corpore, aut saltem à lōginquis attrahuntur ieiuno stomacho esse exhibenda, ita in leuioribus concedēdis, quæ contentos in ventriculo humores euacuat, ea distinctio adhibenda est, quod si quis ad vomēdum non itā facilis est, præstat à cibo vomitum proritare, potissimū si crassi fuerint humores: si verò ad vomendum fuerit facilis, nec humores multum rebelles sint, præstabit id ieiuno ventriculo tentare, aut leuiculo auxilio iuuare.

**Crassis hu-
moribus in
ventriculo
existentib⁹
ā cibo vo-
mendum .**

16 Quinimò si non solū crassus fuerit humor è ventriculo euacuandus, sed in pauca quantitate licet malus, post cibum erit vomitu eiiciendus; admixtus enim cibō facilius expelletur, etiam qui in fundo vētriculi consistit, quod alioqui non itā facile ventriculus in se se contrahens illum eleuare, & propellere poterit.

**Vomituri
non nimis
repleantur**

17 Cauenda tamen magna ventriculi ex cibo reple-

repletio ei, qui cibum ad vomendū assumit, difficilior. n. redditur vomitio, quod vētricus se ad expellendum, quod illi molestum est, vix tanta posita repletionē contrahere potest.

18 At ne statim quidem ab assumpto cibo aut euomendum est, aut vomitorium sumendum, sed tantum temporis interponendum, quantum sufficere posse coniecieris, vt humori noxio admisceri possit, agitari, circinuiolui, & versū os ventriculi subleuari; id verò sit spacium vnus horæ, aut ad summum duarum: id autem semper intelligendū est de vomitu ad euacuandum excrementa, quæ in vētriculo cōtinentur, & de leuib. vomitorijs; quid enim in vomitu vniuersum corpus euacuante, & in vehementibus vomitorijs obseruandū sit, & aliàs dictum est, & ab Auic. petendum.

Vomitoria assumpto quando a vomitu abstinendū.

De siti immoderata.

19 **V**T sitis ex immoderata caliditate, & siccitate ventriculi, aut etiam cum præsentia humoris calidi, & sicci aquæ frigidæ largo sæpè pota curatur, & æstus extinguendo, & bilem ob multam aquæ copiam ingestā subducendo, ita maxime obseruandum erit, si sitis hæc inexhausta ex salsa pituitæ adhæsu parietibus ventriculi, vel eiusdem in fundo illius mora producat, frigidæ potum non fore vtilem, quod contumacem magis causam reddat, & crassiorem, eam verò etiam facile potus præterfluat: præstabit igitur vti aqua calida, quæ magis penetrat, attenuat, diutiusque in ventre cōmoratur, potissimum si quippiam illi admixtum sit, quod attenuanti facultate præditum sit, sed & in pauca quantitate, & non excedens.

Siti immoderata quando frigida bibenda, & quādō calida.

De

De Colera.

Cholera
laborātes
quandō p
superna,
& quāto
per inferna
adiuādī.

20 **Q**uāuis in hoc affectu, & per superna, & per inferna humores excerni soleant, & impetu tali, ut fræno potius, quā stimulo opus sit, quoniam tamen aliquandō irritationes quidem adsunt, sed pro multitudine materiæ non complētur, ideò adiutricem manum medicus porrigere debet: at tunc ambigitur an suprā an infrā. Prīmō igitur considerabimus an natura ad vomendum ægri sint faciles, & an consueta sit aliquandō talis euacuatio, tunc enim per eam patrem adiuuari poterunt hac distinctione adhibita, si cibi corrupti talem morbum produxerint statim vomitus excerni posse, ut etiam si biliosi humores ab hepate, aut vniuerso corpore fuerint transfusi, quod biliosa per superiora facilius excernantur: sin verò aut ad vomendum natura ineptus fuerit, aut crassior fuerit mater, præstabit abstergentibus subducere.

vomitōria
in cholera
sint ex le-
nibus.

Vomitōria
in cholera
varianda
pro varie-
tate mate-
riæ.

Manna, &
Zuccharo
parata su-
specta in
cholera.

21 Sed si vomitorijs agendum, ea omninò euitentur, quæ vel aliundè attrahendo vomitu attractam expellunt.

22 Sed cum blanda illa multiplicia sint, aqua tepida, hydræleum, mulsa, oximel, quæ varia ratione id præstant, quomodo ea in vsum ducemus? si biliosa sit, & mordax, ut etiam syncopem inducat, aquam tepidam, vel ius pulli simplex, vel hydræleum potius eligemus, si crassior fuerit materia, & pituitæ admixta, præligenda erit, aut mulsa, aut oximel cum aqua: si putrefactus cibus, omnia hæc conuenient.

23 Per inferna, si opus sit, idest si moueatur imperfectè, si biliosa fuerit, à manna omninò abstinen-

stinendum, & abstergentibus ex melle, aut saccharo; statim enim in corruptelam trahuntur, & bile-
scunt; sed serum lactis omnium erit præstantissi-
mum remedium; aut cassiæ succi portio, quæ ardorem cohibet, mordicationem comprimit, & blande subducit: quod si pituita putrefacta id excita-
bit, aut bilis crassa, nihil præstantius erit melle ro-
sato, aut solvente ex sero lactis, aut facto cum infu-
sione rosarum rubearum.

24. Ut vomitoria in alijs morbis curâdis in mul-
ta quantitate assumi debent, ut etiam mole natura
ad vomendum proritetur, ita in hoc morbo ini-
tâ copia sufficiet, vel Aretheo teste, quod disten-
to nimium ventriculo, & difficilior exitus humo-
rum actuum reddatur, & maior vis, & dolor sto-
macho inferatur.

25. In repellentium, & roborantium usu hæc
ad sit cautio, nunquam statim ab initio ea in usum
duci possent enim ex copia ciborum, aut humorum in
ventriculo, & vicinis partibus talis morbus perue-
nerit, non prius ea concedi poterunt, quam mate-
ria illa maiori ex parte sit euacuata: quod si aliun-
de affluerit, nisi vires exoluantur, permittendum
etiam erit, ut pars illius euacuetur; ne illius impe-
tu represso, aut febris exitialis concitetur, aut ad
membrum aliquod princeps repat; sed non dierum
numero hæc mouenda erunt, quod morbus acutis-
simus sit, & aliquando vno, aut altero die ægros
interimat, sed horarum dumtaxat, ut vnus quan-
dòq; aut duarum horarum spacio viderim tantam
humorum copiam euacuata, ut vires concide-
rint, & corpus quasi consumptum, & depressum,
vnde quaq; apparuerit.

Vomitória
in cholera
non sine
multâ quã-
titatis.

Repellētia
in cholera
quandò, et
quomodo
in usum
ducenda.

De cardialgia.

Cardialgia labora-
tibus in
principio
repellētia
cōueniūt,
nō adstrin-
gentia.

26 **Q**uāvis quæ adstringunt aliquo modo etiā repellant, in hoc tamen morbo in principio repellētia conuenient, at nullo modo adstringentia: illa enim affluentes ad os ventriculi humores mordicātes, potissimum in febriū principio affluentes repellunt, adstringentia autem licet id præstare possint, affluxos tamen quasi retinent, atq; parti impigunt; secus tamen euenit, si repellens aliquod per os assumatur; repellit. n. deorsum, præcipitat aduenientem, corrugat, adstringit & indurat, vt facillimè munita parte interna vim affluentis humoris retūdere possit, atq; repellere.

Cardialgia labora-
tibus qñ
vomitoria
& quādō
deiectoria
cōueniāt.
In subdu-
cēdis acri-
bus, & bi-
liosus hu-
morib⁹ in

27 In vomitu promouendo in hoc morbo hæc adsit cautio; si fluctuet materia, & proinde per interstilla inuadat, neq; noua affluat, tutò vomitorio licet blando vti possumus, vt hydræleo, aqua repida vel sola, vel cū syrupo acetoso, vel oximellite: quod si vel ab hepate, vel aliundè affluat bilis, potius reuocanda erit à superioribus, & per inferna subducenda,

Cardialgia lenio-
rib⁹ vtēdū.
Subducen-
tia biliosus
humores i
Cardialgia
quæ magis
conueniāt
& in qua
forma.

28 In biliosis, & acribus subducendis ijs humoribus licet Gal. & Trallianus aloë, siue hieræ vtantur, vt si qua tunicis oris ventriculi materia adhæserit, detergi possit, alij autem rhabarbaro: placet tamen magis blādioribus vti, maxime cū tam leniora cōmodissima nostro æuo inuenta sint; sic decoctum tamarindorum, syrupus ros. sol. cassia, vel ex prunis paratum medicamentum, aut etiā addito fero lactis magis conuenient.

29 Placet tamen magis bolo vti, quàm liquido medicamento, quod diutius in ventre morā trahens non solum commodius subducet tales humo-

res, sed simul contemperabit illorū acrimoniam, in quo genere, & cassiam, & pulpam tamarindorū supremum locum obtinere censerem.

30 Quod si à pituita fiat acida, quod rarissime accidit, etiam si vsus hieræ à me commendetur, q̃ humores illos attenuet, & simul subducatur, quoniam tamen, & tardissima est in actione, & sæpè à materie visciditate euicta etiam magis retardatur, unde sæpè symptoma adaugetur, optimum esse censeo, illi aliquod medicamentum admiscere quod vim illius acuet, & quam primū medicamentū cum infestantibus humoribus deorsum ducat.

Hieræ pro
cardialgia
miscendū
semper ali
quod me-
dicamen-
tum.

De Nausea.

31 **M**ultos video in nausea omni statim, aut euacuantibus per vomitum, aut per secessum uti, felici aliquando successu, aliquando infelici: quod ut euitemus obseruandum erit, an inanis omnino sit nausea, an cū aliquo vomitu: si inanis coniectandū, an aut infarcti tunicis sint humores, aut admodum adhærescāt; tunc enim omnino præstabit illos attenuare, abstergere, & incidere, ut præparati possint educi facilius: quod si in capacitate ventriculi contineantur, & symptoma maxime urgeat, statim aut vomitu educendi adiutato motu, si ad vomitum faciles sint, aut per secessum erunt abitergentibus euacuandi.

In nausea
quādo hu-
mores vo-
mitur, &
quādo per
secessum
sint eua-
cuandi; &
an prius
præpara-
di.

De hepatis intemperaturis.

32 **I**n calida hepatis intemperie neq; semper ab initio medicamēto purgante vniuersū corpus; & recur expurgandum est, q̃ doctissimi quidā viri ex Archigene, & Gale. 8. de compos. med. sm loc.

Hepatis in
calida intē-
perie quā-
do purgan-
dum, &
quādo nō.

loc. ad finem colligunt, neque semper ab hac abstinentium victus sola ratione, & alterantibus ad frigidum contentis, quod ex Tralliano, & Auic. alij censent; sed distinctione utendum: si ex procatarrhica aliqua causa subito talis intemperies introducta sit in corpore alioqui sano, detracto sanguine vena secta, & refrigerandi totius, ac hepatis causa, & reuertiendi eiusdem a parte laborante, statim ad alterantia veniendū erit, quod si corpus bile prius repleti fuerit, & paulatim intemperies sit introducta, aliudsq; radices egerit, & quasi habitū contraxerit, non solum sanguinis missione erit utendum, sed medicamento aliquo blando, calidi humores iam inde geniti erunt prius expurgandi, mox refrigerantibus erit agendum.

33. Neque verò in hoc casu fugiendus est usus manne cum sero, aut syrupi rosarum solutiui, quo doctissimo Massariæ visum est ob eam rationem, quod cum dulcia sint, periculum sit ne bilefiant; valet enim argumentum in ijs, quæ alterando diutius in corpore moram trahunt, non autem in subductorijs, quæ & magis euincant, quam euincantur, & bilem subducendo potius refrigerant.

34. Rhabarbarum potius mihi suspectum est in hoc casu, cum enim tardius operetur, igneas, aut multas partes habeat, quibus penitiores partes facile adire potest, & iecur magis excalescere poterit, ut ex lotio, quod statim ab assumpto medicamento flauicem assumit, & rufum conspicitur, quilibet cognoscere potest.

35. In externis applicandis ea adfit cautio, ut refrigerantia, & adstringentia sint moderata, tum actu, tum potentia, ne viscus scyrrhum contrahat, neue calor, & vapores, qui inde exhalant, retineantur,

omni quod
apertum
venerit
de rebus
omni loco
omni loco
omni loco

aduenit
Hepatis in
intemperie
calida manne
non sus-
pecta.

omni loco
omni loco
omni loco

Hepatis in
intemperie
calida rha-
barbarum
suspectum.
Hepatis in
intemperie
calida refri-
gerantia,
& adstring-
gentia im-
pense sus-
pecta.

tur, ne etiam claudatur via sanguini, aut denique putredini detur occasio.

De frigida hepatis intemperie.

35 **I**N calidis, & siccis externis applicandis ea sit animaduersio, ne nimium in ijs excedant; sit enim sexennero, vt humidioribus partibus absumptis, aut exsiccatis scyrri hi in parte concitentur;

In hepatis intemperie frigida calida, & sic ca suspecta

De hepatis obstructione.

36 **I**N topicis in vsum ducendis. Primò hæc adfit cautio, ne attenuantibus vnquam vtamur, nisi longo intervallo post cibum assumptum, vt nõ modò in ventriculo cibus in chylum mutatus sit, sed in hepate etiam iam mutatione in sanguinem nactus sit, qua propter cum à cena ad prandium, multo maius temporis intervallum intercurrat, quàm à prandio ad cenam commodissimũ tempus iudicamus esse, si fiat per horam antè prandium.

Hepatis in obstructio neattenuantia curatè prandium applicada.

37 Animaduerremus præterea, antequàm linimentis, aut inunctionibus vtamur, semper viscus esse fouendum decoctis attenuantibus, & discutientibus cum spongia, vt, & inunctiones altius penetrare possint, & materia ab actuali, & potentiali calore attenuata, aut per se dissipari possit, aut medicamentis è corpore duci.

Linimentis fofus calidi cù spongia premit tenet.

De hepatis inflammatione.

38 **L**icet reperiuerint extrinsecus appositam medicamentam in inflammationum principio

Hepate in flammato repellentia in principio antè sectione venę nõ conueniunt.

prio adhiberi soleant; in hepatis tamen phlegmone non prius applicanda erunt, quàm sectione venæ euacuatū sit corpus, & pars materiæ reuulsa: si. n. secus fiat, vel si ob abundantiam repellere non poterunt, rebellis magis reddetur tumor, & contumax, crassior reddetur materia, & duritie contracta scythum excitabit, vel repulsa ad cor, & spiritualia membra impetu ruens mortem statim inducet.

In inflammatione hepatis in caua parte purgandū, sed in declinatione. In inflammatione hepatis in principio non purgandum.

39. Laborante concava hepatis parte, licet facilius sit medicamento purgante materiam euacuare, id tamen cruda existente materia, & in principio fieri non debet, sed concocta, & in declinatione. Quamvis autem in phrænitide aliquandò ab initio ad reuellendum euacuandum sit medicamento purgante; sicut docet in Pleuritide descendente ad hypochondria dolore Hipp. 2. acut. quia, ut aliàs docuimus, nondum cruda est materia, sanguis nempe biliosus, in hepatis tamen inflammatione nullo modo id præstandum est: quòd, cum pars illa laboret, humores, qui à venis vndequaque euomuntur ad iecur, etiam si aliqua ex parte euacuentur, per partem tamen laborantem feruntur ad ventriculum, & imbecilliores reddunt, & reduiæ crassiores remaneat, magisque impinguntur.

Hepatis gibba inflama ante diuretica lenienda aluus.

40. Quæ in gibba hepatis parte sit inflammatio, & quæ ad eam partem affluxa est materia, licet per lotium commodius expurgari communi omnium doctorum sententia posse constitutum sit, antequàm tamen diuretica hæc in vsum ducamus, optimum censemus leniente aliquo medicamento, aut etiam abstergente materias in primis vijs contentas euacuare, ne vsu ducentium per urinam, quæ in prima illa corporis regione

con-

continentur, ad penitiora deducta inflammatio-
nem adaugeant.

41. Licet autem in principio inflammationum
aliorum partium simplicia repellentia in vsum ve-
nire debeant, in huius tamen viceris phlegmone
aliqua etiam attenuantia calida admisceri possunt,
& debent, non eam solum ob causam, quod frigi-
da, & adstringentia ad penitiores partes facilius
deuehant, sed etiam quod cum viscus illud vnde-
quaq; angustissimis venis sit refertum, & illius sub-
stantia ex illis ferè solis sit composita, vt proinde
parenchima optimè dicatur, si frigida sola, & ad-
stringentia aut exhiberentur, aut applicarentur
facillimè adstrictis venulis, & crassata materia
scyrhus in parte concitaretur, aut sanè tumor per
se incurabilis fieret.

42. Vt proinde etiam hæc eadem hepatis nō val-
de frigida actu applicari debeant ob easdem cau-
sas, tum etiam ne naturalis facultas noxam aliquā
contrahat nativo calore quasi extincto.

43. Si tamen nulla adhuc affluerit materia, sed
affluxus certò impendeat, vt in casu, ictu, aut exter-
na aliqua causa, pura repellentia etiam cum aliqua
adstrictione concedi poterunt.

44. Quinimò in Erysipelate vero eadem pura
concedi possunt; cum & materia sit tenuissima, &
calidissima, vt periculum non sit, ne nimis crasse-
scat, & obstruat venulas.

45. Vnde etiam frigida actu repellentia ea ap-
plicari regioni hepatis poterunt; cum, & intensi-
sima sit ibi caliditas, quæ etiam medicamento in-
tensionem refringere faciliè poterit. In quo
etiam casu pauxillum aceti indendum erit, vt fri-
gidissimi medicamenti penetratio adiuuari possit.

In hepatis
inflammatio-
ne repellē-
tibus atten-
uantia in
principio
miscenda.

Hepate in-
flammati-
actu frigi-
da fugienda
Hepate in-
flammati-
sine mate-
ria, repel-
lentia sola
conueniunt.
In erysi-
pelate hepa-
tis repellē-
tia sola co-
ueniunt.
In erysi-
pelate hepa-
tis frigida
actu appli-
canda.

In hepatis
inflammatione in-
declinatione puris
resoluentibus non utrum
dum.

46 Et quemadmodum ratione partis ab initio dictum est non puris repellentibus utendum esse sed attenuantia aliqua esse admiscenda; ita in declinatione non puris resoluentibus utendum docuit Gal. 13. meth. sed non nihil adstringentium admiscendum erit, ne laxata nimium parte tonus illius destruat.

De hydrope.

In hydrope serosi
humores ab initio
purgari possunt,
sed a leuioribus
inchoandum.
Post hydrogoga valē-
tia ventriculus roborandus.

47 **Q**uamuis illud, & verissimum sit, & Galeni auctoritate confirmatum lib. quos, & quando purgare oportet, serosos humores ab initio purgari posse, quod nulla in eis expectari debeat coctio, quod nullam coctionem admittant, cauendum tamen erit validis uti hydragogis statim ab initio, sed leuiori aliquo medicamento erunt prima excrementa educenda, & sic viæ ad validiores euacuationes præparabuntur.

48 In valentiorum hydragogorum usu semper maxima ventriculi habenda est ratio: cum enim maiori ex parte tonum illius labefacient, si frequenter, ut à multis solet, exhibeantur, nisi que ab illorum exhibitione ventriculi habeatur ratio, imminuta aqua flatus augebitur, & in deteriore speciem hydropis, & curatu difficiliorem, si Auerroci credimus, agrum nostrum inducemus.

In hydro-
pici attenuantibus
utendum, ut
humores per vias
vires ducantur.

49 Ut verissimum est serosos hos, & aqueos humores nulla coctione esse præparandos, ita, cum potissimum per lotium sint euacuandi, viæ, per quas promeare debent, infarcti sunt liberandæ, in quæ usum, & decocta, & syrupi attenuantes, & abstergentes, & incidentes maximè conuenient, ut crassiores, & limosi humores vias obstruentes, & ef-

fluxum

fluxum vrinæ ad renes, & vesicam impediētes præparentur, ac faciliè educi possint.

50 Nectamen in horum vsu diutius insistentum est, ne dum id tentamus, morbificam causam adaugeamus.

51 Hoc autē maxime in vsu vrinam promouētium est animaduertendum, & cauendū: vidimus enim quàm plurimos, dū obstinate nimis per lotium humores hos serosos deducere potionibus ijs tentarent, nec obseruarent, an copia vrinæ augeretur, mortem ægrotis suis accelerasse, potulenta illa materia in corpore retenta, & in morbificā causam mutata.

52 Præstat igitur per tres, quatuorue dies periculum facere, & potionibus rem hanc tanquam aptioribus aggredi: quod si prò voto hæc non succedant, aridis res erit transigenda, succis concretis puluisculis lotium promouentibus, Trochiscis, & similibus.

53 Rhabarbarum, quod in hydrope laborantibus à plerisq; commendari video, vt fortè alijs pro roborando hepate admixtum concedi potest, ità si frequentius in vsum ducatur, aut commansum, aut in pulueris formam assumptum ad euacuandum nunquam probari à me potuit, quod calia aptum non sit euacuare, qualia opus esset, quod que docuerit Gal. lib. de purg. med. facul. capit. 2. quæ flauam, vel nigram bilem purgant, importuna esse, & inutilia hydropticis.

54 Non ommittēda est Gal. animaduersio ex Asclepiade 9. de compos. med. secundum loc. & à Tralliano repetita: cauendum esse à frequentioribus, & iteratis vacuationibus; quod hidragoga hæc per se noceant hepati, corpusq; vniuersum

In hydro-
pici in æ-
tenuantibus diu-
nō insitēdi.
In hydro-
pe in iu-
reticis nō
diu insitē-
dū, & quā-
do.

Potulenta
in hydro-
pe alcite
laxè sus-
pecta.

Rhabar-
bū hydro-
pici inu-
tile.

Hydropti-
cis repeti-
tæ sapius
hydrago-
ga noxia.

reddant debilius, & plùs obsint, quòd profint; itaque satius est testante Alex. lib. 9. cap. 2. paulatim, & tutò vacuare, quàm festinandò, perturbandoque vnà cum morbo ægrum de medio tollere: præstabit igitur euacuata parte materia per secessum hepar per aliquot dies roborare, moxque vacuationem repetere.

Hydropicis viscantia cruribus applicata periculosa.

55 Quamuis duos hydrope laborantes sanatos viderim vesicis in cruribus per se excitatis, & disruptis, & multa aqua per eâ partē euacuata; exhibitis postea multis hepar roborantibus; nullos tamen vnquâ spacio hoc quadraginta annorū, quo in magna hac vrbe medicinam facio, curatos vidi, quibus à medico vesicantia cruribus admora fuere; sed ferè semper gangrenæ subsecutæ sunt curatu impossibiles: vt optimè etiam doctissimus Massaria longa experientia obseruauit.

De lienis obstructione, & duritie.

Splene obstructo nō validis attenuantibus agendū. Splene obstructo, & duro molliē dū primo post re soluedū. In Splenicis æterna molliē, & resoluēdū.

56 **I**N splenis obstructione non statim resoluentibus, quin ne quidem attenuantibus validis medicamentis est agendum, cum enim viscus hoc semper feculentis, & crassis succis refertum, sit periculum impendat ne subtilioribus, & liquidioribus partibus absumptis, crassiores, quæ remanent, per ea quasi lapidescant, & verum scyrrhum inducant.

57 Principio igitur emollientia adhibenda sūt, & fluxilem materiam reddentia, post autem discutientia tatò adhibere poterimus.

58 Sed cautio hic opus est, non esse vtrunque hoc officium semel tantum præstandum: sed repetitis vicibus nunc emolliendum, nunc quod emolli-

emollitum est, & fufum difcutiendum, iterumque quod iam emollito fubeft, iterum emolliendū, & mox refoluendum, donec tota moles diffipetur.

59 Nec placet quod plerisque vfitatum fcimus, ab initio emollientibus atrequantia admifcere, vt illa incommoda euitemus; cum enim eodem tempore duorū illorum operationes perfici nequeāt, fed attenuantium, & difcutientium ob caloris efficaciam actio multo citius abfoluatur, in illud femper incommodum incidemus, quod difcuffis fubtilioribus partibus, quæ fuperfunt ficciores euadent, ac difficilius superari poterunt.

60 Nullo modo Hæc. Mercur. fententia in obftructionis lienis curatione lib. 3. de cogn. & curâ di. humani corporis affectib. c. 21. recipienda eft, cū in lienis affectibus curandis, nunquā neceffariū effe cēfuit, vt medicamentis laxantibus cōmifceantur adftringentia ob eam rationē, quodd, cū viscus illud admodum fit ignobile, fua natura debet effe laxum, & latum, vt facile recipere poffit humores melancholicos; cum fententia hæc e directo repugnet. 13. meth. cap. 17. fed maxime, fecundo ad Glauc. cap. 5. & ratio id docet; cum enim viscus fit, non parui momenti multum refert nimum, ne fit laxatum; fic enim illius tono perfracto, facultatibusque naturalibus redditis imbecillibus minus recte sanguinem defecare poterit, & hepatis, corpusque vniuerfum expurgare: minus tamen, quam in hepate curando hac in re, erimus folliciti, & in minori copia emollientibus adftringentia admifcebimus.

61 Frustrā obftructum, aut duritie tentatū lienem curare conantur ij, qui diureticis id aggrediuntur; cum enim nullus ab hoc viscere ad vias

In spleneticis mollioribus attenuantia non miscenda.

Splenicis laxantibus aliqua adftringentia miscenda.

Lienem vix per lotum expurgari potest.

vrinæ sit transitus Gal. etiam teste 13. meth. 17. id frustra tentare censendum est; in quo medicum frustrari sine congruit: per secessum igitur ea materia ducenda est; quod si quando aliqui per lotium copiosum curati visi sunt, ut de Bione scriptum est secunda sect. 2. Epid. id vel tanquam rarum, & per vias occultas factum recenset Hipp. vel sanè alijs adhibitis remedijs emollientibus, & dissipantibus, & per alium subducentibus, cum multa feculenta per venas superesset materia, qua foueri, aut renouari tumor ille poterat, per vrinam ea subducta præseruatio potius, quam curatio facta est: quod imitari medicus poterit, ubi nigras, aut crassas, feculentasque vrinas adesse cognouerit, diureticis enim toto tunc vti poterit ad antecedentem materiam per eam partem vacuandam.

De ictero.

Icterici in principio non purgandi, sed præparandi.

Quoniam icterici valentioribus medicamentis purgandi.

Quoniam valentiora purgantia curanda.

62 **I**cet Gal. noster, lib. quos, & quando purgare oportet docuerit tenues, & serosos humores nulla expectata coctione ab initio esse euacuandos, non propterea tamen in icteritia biliosi succi sunt statim euacuandi: neque enim semper tenues sunt, neque serosi dici possunt: præparandi igitur ante euacuationem, & si putrefacti, omnino concoquendi vel ex Ruffi sententia apud Aetium.

63 At verò cum bilis quam minima copia, aut nulla ad intestina transmissa ex obstructione vesicæ fellæ torpida remaneat ex pultrix facultas intestinorum, valentioribus semper medicamentis erit utendum.

64 Cauenda tamen valentiora hæc medicamenta erunt, si aut ex hepatis inflammatione sympto-

ma hoc superuenerit, aut motu critico, sed imperfecto vndequaquē bile dispersa eueuerit.

De colicis doloribus.

65. **I**N vsu anodynorum in hoc morbo illud primò animaduertendum est, in initio, si in vsum ducantur, antequam euacuata sit materia, non esse admiscēda valenter discutientia flatus, & rutaceū oleū, aut olea, quibus ruta, bacchæ lauri, & similia incocta sint etiā ex Gal. præcepto 12. meth. 8. cum enim ob copiā materiæ assidue flatus generentur, non valentia illos discutere, sæpè dolores augent.

66. Errant multò magis qui ijs oleis vinum potens, aut sapam statim ab initio admiscēt, & clysteribus infundunt, cruciatus enim sæpè augentur excalefactis, & attenuatis nimium crassis, & frigidis humoribus, & in halitus eleuatis.

67. Et quemadmodum calidiora hæc potentia siue intrā, siue extrā in principio non laudamus, ita actu etiā nimis calida concedenda esse negamus.

68. Animaduertendum etiā ne clysteres indantur repleto adhuc ventriculo; sic enim cibus attraheretur ante tempus; magisq; impingerentur crudi humores in intestinis; augetentur dolores, & curatio redderetur difficilior.

69. Stupefacientia, quamuis in omni dolore colico conuenire possint, frequētius tamen in vsum duci possunt ubi materia morbum faciens calidior sit, & acris: non solum enim sic sensum obeundimus, sed etiā causæ morbum facientis rationem habemus.

70. Si quando tamen ijs vtendum est, cōvsque

In colicis doloribus in initio valētèr discutientia noxia.

In colicis clysteres ab initio cum vino, vel sapa noxii. Colicis calida valdè actu mala.

Clysteres colicis ne indantur repleto ventriculo.

Stupefaciētia in colicis optima potissimū si a materia calida.

Ovis in
colicis vi-
ritus val-
etibus.

Colicis in
doloribus
purgatio
fit in col-
icis.

non sine differenda, donec vires vitales: iā collaba-
scant, & quā nō longē abfit ab interitu: solet enim sa-
penter tunc sine dolore dormiēdo vita terminari.

71 In colico dolore ex pituita si quis recentio-
rum dogmata secutus lenientibus solis, aut ad sū-
perius iterantibus admixtis aloë, aut hiera Gāl. qō-
tentusā purgantibus veris abstinerit, tandē ho-
morū acria facta, aut egros mori cum maximis
cruciatibus facit, aut alterius medicis accessione,
qui cum grecis omnibus, & Mauritanis validiori
medicamento purgante, & abstergēte propinato
materiam ab intestinis deturbabit, ac ea ratione
dolores aut imminuet, aut tollet, exstimationis
non parum iacturam faciet: nō valente enim le-
niente medicamento viscidam, & crassam pituitā
deturbare, & hiera ob tarditatem actionis diuini
in intestinis commorante, & sapissimē non valen-
te pertrā hīre, sed materiz illi crassæ adherēte ele-
uatis hīs validissimi dolores excitantur, & au-
gentur. Quare præstaret vrgenti dolori quampr-
imum edacta materia succurrere, & ijs vti, qui
cum attenuantibus mixta citō materiam subduc-
re possent: neq; impedit, quod ad locum affectū
materiam deducamus: nam neque verē locus af-
fectus ita levis est, ut hunc transitum non admittat.
quoddam hoc à natura sint instituta intestina; & ita
quæ materia ad eas partes ducitur, simul etiā cum
præexistente euacuatur, si affecta esset pars, si
exstimatione tentaretur, tunc maximē peccaremus,
si talem in eo casu euacuationem procuraremus.
Neque cruda hæc materia dicenda est ea crud-
re, quæ ab initio præcepto Hipp. euacuari non de-
bet: de ea enim ea sententia intelligenda est, quæ
ex putredine facta, coctionem requirit, quæ

tridis

tridis crudis debetur humoribus, quales sunt humores in febribus putrescentes. Hec extra venas est, in locis ad euacuationem institutis sine genere illo putredinis, ita ut solis attenuantibus aliquibus, & abstergentibus tam per os sumptis, quam infusus præparari ad euacuationem possit, quinimò infusus per clysmata parata via, & attenuantibus medicamentis disposita materia, si etiam purgantibus attenuantia admiscuerimus, qualis est hiera, integrè omnibus satisfacere poterimus, sic enim subducta materia, & discussis, quin & expulsis flatibus, aut dolores soluentur, aut certe mitiores fient.

72. Olei vel ex amigdalibus, vel ex semine lini usus, ubi multa adfuerit materia crassa, inutilis, sæpè numero esse solet, retinetur enim aliquando, & viscidiorè materiam reddit, & licet tanquàm antidotum quâdoque mitiores reddat dolores, quoniam tamen materiâ peccantem subducere non valet, solent non curari dolores, sed sæpè denuò insurgere.

73. Aperta igitur via, & subducta parte materiæ aut enematis, aut medicamentis purgantibus, si adhuc urgeant dolores præstantissimum esse solet præsidium.

74. Sed si vereamur aut ob crassiè materiæ, aut ob eiusdem quantitatem, ne possit præterfluere, admiscendû illi erit non nihil abstergentiû, ut mellis rosati solutini, aut et purgantiû, ut diaphanici, vel electuarij, elæscoph dissolutorû cum aqua aut glandiû perficorum, aut anisorum, aut similium.

75. Quod si à flatibus dolores prouenerint sine multa copia materiæ, nihil est quod magis ex usu esse soleat eodè modo ab initio aut per se sumptis, aut, quod melius esse sæpius experitur, cum prædictis.

76. In usu vomitoriorum cauti sint maxime, si enim

In colicis
vñs olei,
nō euacua
ta materia
prius, inu-
tilis.

Oleum in
colicis qu
optimum
præsidium

Olea in
colicis ad-
auuanda cū
abstergen-
tibus, aut
purgantib.

In colicis
à flatu olea
data etiam
ab initio
utilia.

enim ventriculus, & supernæ partes intestinorum repletæ nimium fuerint, ex vſu maximè erunt, vt medicamentis ad deiiciendum ingeſtis locus datur pertranſeundi: quòd ſi totus dolor, eiufq; cauſa infernas partes obſideat non ſolùm fruſtrà tentatur vomitus, ſed aliquando ſit cum ægrotantiũ certa perniciẽ: voluolofi enim ſæpè fiunt, ac cum certo mortis periculo etiam ſtercora per eam partem euomunt.

Cucurbitulæ magnæ appoſitione regioni vmbilici ea adhibenda eſt cautio, vt ea ex illis ſit, quæ ſunt in medio perforatæ: ſit enim ſæpenumero, vt, cum pars ſubiecta mollis ſit ac pinguis, multa illius moles introrahatur; quæ ſubtractione cucurbitulæ impedire ſolet: vnde vel diutius reſtenta in ſphacelum ſubiectâ partem deducit, aut ſi frangatur, vt hoc in eodem modum euitemus, aliquando ex vitrorum fragmentis cutis vulneratur.

Vmbilicis pluribus poſitiſſimum mollibus, & per pinguib; hiantes ferè ſint vmbilici, & ex vi ſuper poſitæ cum igne cucurbitulæ pinguedinis aliqua portio aliquando trahatur per eam partem, conſuſo oriſicio illi, vt prius ſuperponant paruum ceratũ putæ ex ceruſa cocta, vt tale in eodem modum euitent.

Colicis ex flatu anodyna ſtatim, & interna, & externa concedenda ſunt, vt cruciatus illi mitigentur, etiam ſi nondum materia, vnde eleuantur, ſit euacuata, ita ea fugienda, eſſe cenſeo cum Gal. 12. meth. quæ inſignitè calcificiando diſcutere quàm maximè valent; attracta enim materia maiorem locum occupans in teſtina magis diſtendit, ac flatibus adauctis dolores auget.

80 Cucurbitula etiā in ijs doloribus ex flatibus, ubi urgeat symptoma, uti possumus; sed cessato dolore vel mitiore reddito, materia, vnde eleuantur, subducenda est, alioqui redeunt, ut optimè Gal. 12. meth. c. 8. si tñ non adeò urgeat dolor, ut omnē ad se trahat indicationē curatiuā, præstabit euacuationē præmittere, præsertim si multa subsit materia, aut adhuc noua affluat ex 12. meth. 19.

Colici ex flatu antè cucurbitula vñ. purgandi.

81 Contingit aliquandò, ut colici dolores adeò vehementes sint, ut omnem medicorum operam eludant, ac quocunque auxilio adhibito potius augeantur, in casu ad contraria erit transeundum: Cùm enim colici dolores maiori ex parte à materia frigida fiant, aut à flatibus distendentibus, sit aliquandò, ut, aut ratione dolorum, aut vigiliaru, aut meritis ob contumaciam aut incalescant nimium intestina accedentibus etiam calidis, & intra, & foris apposis remedij, aut phlogosi quadam tententur, aut etiam vera inflammatione incipiant affici, aut multa præexistens bilis ibidem transfundatur, vnde ad contraria erit transeundum, & insignitè refrigerandum, quod mihi anno præterito contigit primo in nobili hispano pedicatum duce egregio, post in N. à secretis Illustrissimi, & Excellētissimi Marchionis Carauagij, qui, cùm colicis doloribus per aliquot dies fuissent acerrimè cōfliccati, & iam iam mors esset præforibus, nulli perferrentur arteriarum pulsus, sudores adessent resolutorij, nulla denique amplius superesset spes salutis ne quidem apud medicos etiā præstātiſsimos, accersitus, & ego, cū sitim inextinguibilem, linguæ scabriciem, nigrorem, ac duriciem, per tactus autem hypochondrij, & ventris inferiori calorem in partibus illis effluantem adesset

Colicis in doloribus frigida aqua quandoque vtendum.

se obseruasse, Hispano aquam multam nunc etiā refrigeratam bibendam exhibui, cum natura abstemius esset, & multæ aquæ potator egregius: in somnum prolapsus est, & quatuor horarum spatio cum dormiisset, dolore quodam inferioris ventris à primo maximè, ut ipse referebat, diuerso excitatus à somno miram bilis flauæ copiam euacuauit, & à doloribus liber euasit; unde collegi medicos, qui illius curationem susceperant, in causa morbi illius longè deceptos fuisse, cum calidis remedijs curationem instituisent, à frigida materia factum morbum iudicantes. Alterum autem, cum iam agentem animam inuenissem, non alia ratione statim curavi, quàm linco panis multiplicis in quadrati formam composito frigida immerso, ac mirantibus astantibus quid facerem, ventri superposito, cumque ut dormiret, iniunxissem, diutiusque etiam somno oppressus sine motu cum conquiesceret, venientes affines, & vxor, ne iam satis cessisset, cum expergescissent, indignabundus, quod tanto bono cum priuassent, quasi è lecto exiit à doloribus omnino liber.

In colicis
ex inflam-
matione
purgatio
lethalis.

82 Si ex inflammatione intestini dolorem fieri contigerit, caueat medicus ne vilo quantumvis leni medicamento subducente utatur, ne attractis ad partem inflamatam ab illæsis partibus calidis, aut prauis humoribus, aut inflammatio augetur, aut impedito transitu in voluclum desinat.

Cassia in
colicis ex
inflammatione
vtilis.

83 Cassiæ tamen solius vsum aliquando non repperem in tali casu, quod miti, blando, & humido calore sæpe inflammationem fedit, dolorē leniat, & suppurationem tumoris adiuet.

84 Quamuis venæ sectio ex brachio in colico dolore

dolore ex inflammatione decreto Gal. 12. meth. Colico in
 med. comendetur, si tamen eò vsq; morbus per- dolore se-
 uenerit, vt urinam supprimat, secta vena in talo- cta ver-
 maximè conferet, aut post priorem illam, si mul- in talo ali-
 ta adfuerit plenitudo, aut etiam si talis nò adfue- quado cõ-
 rit, si ex talo loto sanguis primò mittatur, nò erit fert.
 præter rationem, & experimenta.

De alui fluore.

85 **I**N alui profluuiò illud maximè cauendum, In diar-
 ne dùm virium maximè habere ratione vo- rhæa pin-
 luerimus consumptis carnium, & iuribus pingui- gua sulpe-
 bus laxitatem ventriculi, & intestinorum nimiam cta.
 procuremus, aluique fluorem adaugeamus.

86 Sunt sæpè numero nostrates medici in frigi- In alui p-
 do potu concedendo adeò restricti, vt malint cum fluuiò fr-
 manifesto detrimento repente aqua fluxu laxita- gidas po-
 te introducta alui augere eo cõsilio, quòd frigidu- tus sæpè
 naturæ inimicū censeant, quā iusto ægri desiderio conuenit.
 satisfacere, quod tamē natura etiā benè operante
 fit, vt & adstrictioni per frigiditatem satisfiat.

87 Inflammatione tamen vera tentatis intesti- Frigida fu-
 nis frigida potus vitandus est. gienda in

88 Cauendum in diarrhæa, quod plerisque vi- inflamm-
 deo consuerum, ne semper, aut in plerisq; statim- rione inte-
 absterforium aliquod exhibeant, vt mel, aut syru- stinorum.
 pum rosatum, aut simplicem, aut solatium cum In diar-
 lero lactis, aut mannam; cum enim aliquando be- rhæa quan-
 nè operante natura id fiat, non erit aut irritan- do abster-
 da, aut promouenda, sed totum negotium natu- gentibus
 ræ erit relinquendum: sin verò mala qualitate vtendum,
 irritata etiam id natura præstiterit, non etiam
 erit adiuuanda; ne calcaribus naturæ currenti
 addi-

additis præcipites in mortem ægros agamus: spectatores igitur potius huius motus naturæ aliquandiu erimus, & morbi morbificæque causæ potissimum rationem habebimus; Quod si naturam hinc scire, aut succumbere viderimus, neq; materiam posse pro ratione euacuare, irritari tamen partes, sæpiusq; ad excretionem ferè inaniter provocari, tentiginem inano, & inane desiderium egerendi subesse, tunc manus adiutrices porrigere conveniet, atq; abstergentibus vti, quin aliquandò soluentibus blandioribus vt manna, & syrupo, aut melle rosato solutiuo, vt quod pluribus egestionibus cum dolore, & naturæ labore euacuari tentatur, breviori tempore, & minori molestia educi possit.

De dysenteria.

In dysenteria quādo purgādū, & quando abstinēdū à purgatione.

89 **C**UM in curanda dysenteria adeò dissident sententia, an referto corpore pravis, & acerbis humoribus laborante dysenteria vera, ulceratis, aut abrasis intestinis conveniat medicamento aliquo saltem blando puta rhabarbaro, mirabolanis tamarindis, manna, syrupo rosato solutiuo, & similibus humores euacuare, an potius omninò ab ijs sit semper abstinendum; quæ res in medicina facienda maximi momenti esse constat, ego non aliam hac in re sententiam in medium proferre tēraui, quàm eam, quam nobis tradidit doctissimus Vallesius quarto. Epid. cap. 96. qui ab utraq; sententia extremè dissidens aliquandò purgandum censuit, aliquandò omninò abstinendum esse voluit: verba eius sunt, Aut in dysenterico est cum cacochymia magna exulceratio nondum magna aut cum

cum exulceratione magna cacochymia exigua ; aut vtraq; exigua; aut vtraque magna; si primùm expurgari debet: si secundum minimè, sed ad sudores, ad vrinam, aut vomitus vocandum, & instandum localibus interiùs, & exteriùs pro vlcere curando: si tertium, ne tunc quidem localibus admodum, neque purgatione opus est, sed bono victu, & facili, ad alias euacuationes derivatione: si quartum insanabilis est, facies aut nihil, aut omnia tentandi gratia, velut in re desperata. Tales enim etiam curationes aliquando profuerant; neque mihi semper displicet illud Celsi, sæpè, quos ratio non iuuat, temeritas adiuuat.

90 Debet igitur quam primùm huiusmodi humor prauus, & acris euacuari aliquo ex prædictis medicamentis, si illius magnam copiam ex oris amaro, ventris turbatione, aut alijs signis subesse cognouerimus, antequàm ex frequenti, sed pauca excretionem vlcera adaugeantur, aut vires deiciantur.

In dysenteria vbi purgandum, quàm primùm id præstandum.

91. Animaduertendum tamen si subesse copiam attrahilarij humoris cognouerimus, etiam si exulceratio adhuc magna in intestinis facta non sit, non statim purgante medicamento esse educendam; cancerosa enim vlcera, & pessima excitaret, sed attemperari, eiusq; ferocia deliniri priùs debet; quod vbi factum esse cognouerimus, omninò euacuari debet, sed blandissimo medicamento decoctione tamarindorum, vel mirabolanorum, cum syrupo, vel melle violato solutio, ijsque similibus.

In dysenteria humore attrahilario exuberante, priùs ferocia illius temperanda, quam purgandum.

92 Rhabarbarum in dysenteria ab ijs, qui Mauritanorum dogmata sectantur, quique purgandum sæpè in ea censuerunt, quamquam videam passim ad hunc finem in usum duci, potissimum vbi bilio-

Rhabarbarum in dysenteria tu spectum.

si,

vrinæ sit transitus Gal. etiam teste 13. meth. 17. id frustra tentare censendum est; in quo medicum frustrari sine congruit: per secessum igitur ea materia ducenda est: quod si quando aliqui per lotium copiosum curati visi sunt, ut de Bione scriptum est secunda sect. 2. Epid. id vel tanquam rarum, & per vias occultas factum recenset Hipp. vel sanè alijs adhibitis remedijs emollientibus, & dissipantibus, & per alium subducentibus, cum multa feculenta per venas superesset materia, qua foueri, aut renouari tumor ille poterat, per vrinas ea subducta præseruatio potius, quam curatio facta est: quod imitati medicus poterit, ubi nigras, aut crassas, feculentasque vrinas adesse cognouerit, diureticis enim tunc tunc uti poterit ad antecedentem materiam per eam partem vacuandam.

De ictero.

Iderici in principio non purgandi, sed præparandi.

Quoniam icterici valentioribus medicamentis purgandi.

Quoniam valentiora purgantia curanda.

62 **I**cet Gal. noster, lib. quos, & quando purgare oportet docuerit tenues, & serosos humores nulla expectata coctione ab initio esse euacuandos, non propterea tamen in icteritia biliosi succi sunt statim euacuandi: neque enim semper tenues sunt, neque serosi dici possunt: præparandi igitur ante euacuationem, & si putrefacti, omnino concoquendi vel ex Ruffi sententia apud Aetium.

63 At verò cum bilis quam minima copia, aut nulla ad intestina transmissa ex obstructione vesicæ felleæ torpida remaneat ex pultrix facultas intestinorum, valentioribus semper medicamentis erit utendum.

64 Cauenda tamen valentiora hæc medicamenta erunt, si autem ex hepatis inflammatione sympto-

ma hoc superuenerit, aut motu critico, sed imperfecto vndequaq; bile dispersa eueuerit.

De colicis doloribus.

65. **I**N vsu anodynorum in hoc morbo illud primo animaduertendum est, in initio, si in vsu ducantur, antequam euacuata sit materia, non esse admiscenda valenter discutientia flatus, & rutaceū oleū, aut olea, quibus ruta, bacchæ lauri, & similia incocta sint etiā ex Gal. præcepto 12. meth. 8. cum enim ob copiā materiæ assidue flatus generentur, non valentia illos discutere, sæpè dolores augent.

In colicis doloribus in initio valētèr discutientia noxia.

66. Errant multò magis qui ijs oleis vinum potens, aut sapam statim ab initio admiscunt, & clysteribus infundunt, cruciatus enim sæpè augentur excalefactis, & attenuatis nimium crassis, & frigidis humoribus, & in halitus eleuatis.

In colicis clysteres ab initio cum vino, vel sapa noxii. Colicis calida valdè actu mala.

67. Et quemadmodum calidiora hæc potentia siue intrà, siue extrà in principio non laudamus, ità actu etiā nimis calida concedenda esse negamus.

68. Animaduertendum etiam ne clysteres indantur repleto adhuc ventriculo; sic enim cibus attraheretur ante tempus; magisq; impingerentur crudi humores in intestinis; auerentur dolores, & curatio redderetur difficilior.

Clysteres colicis ne indantur repleto ventriculo.

69. Stupefacientia, quamuis in omni dolore colico conuenire possint, frequētius tamen in vsu duci possunt vbi materia morbum faciens calidior sit, & acris: non solum enim sic sensum obtundimus, sed etiam causæ morbum facientis rationem habemus.

Stupefaciētia in colicis optima potissimū si a materia calida.

70. Si quando tamen ijs vtendum est, eò vsque

Opiata in
colicis vi-
ribus valē-
tibus.

Colicis in
doloribus
purgantib.
In initio v-
tendum.

non sunt differēda, donec vires vitales iā collaba-
scāt, ægerq; nō longē abfit ab interitu: solet enī sa-
pē numero sine dolore dormiēdo vita terminari.

71 In colico dolore ex pituita si quis recentio-
rum dogmata secutus lenientibus solis, aut ad sū-
mum stercorarijs admixtis aloes, aut hiera Gal. qō-
tentus a purgantibus veris abstinerit, tandē ho-
noris iactura facta, aut ægros mori cum maximis
cruciatibus finet, aut alterius medicamentum
qui cum græcis omnibus; & Mauritanis validiori
medicamento purgante, & abstergēte propinato
materiam ab intestinis deturbabit, ac ea ratione
dolores aut imminuet, aut tollet, existimationis
non parvam iacturam faciet: nō valente enim le-
niente medicamento viscidam, & crassam pituitā
deturbare, & hiera ob tarditatem actionis diutius
in intestinis commorante, & sæpissime non valen-
te pertrāsire, sed materiæ illi crassæ adherēte ele-
uatis flatibus validissimi dolores excitantur, & au-
gemur. Quare præstaret vrgenti dolori quamprimum
educta materia succurrere, & ijs vti, quæ
cum attenuantibus mixta citò materiam subduce-
re possent: neq; impedit, quod ad locum affectu
materiam deducamus: nam neque verè locus affe-
ctus ita levis est, ut hunc transitum non admittat,
quod ad hoc à natura sint instituta intestina; & t
qua materia ad eas partes ducitur, simul etiā cum
præexistente euacuatur; si affecta esset pars, si in-
flammatiōe tentaretur, tunc maxime peccaremus,
si talem in eo casu euacuationem procuraremus.
Neque cruda hæc materia dicenda est ea cruditi-
te, quæ ab initio præcepto Hipp. euacuari non de-
bet; de ea enim ea sententia intelligenda est, quæ
ex putredine facta, coctionem requirit, quæ pu-
tridis

tridis crudis debetur humoribus, quales sunt humores in febribus putrescentes, nec extra venas et in locis ad euacuationem institutis sine genere illo putredinis, ita ut solis attenuantibus aliquibus, & abstergentibus tam per os sumptis, quam infusis præparari ad euacuationem possit, quinimò infusis per clysmata parata via, & attenuantibus medicamentis disposita materia, si etiam purgantibus attenuantia admiscuerimus, qualis est hiera, integre omnibus satisfacere poterimus, sic enim subducta materia, & discussis, quin & expulsis flatibus, aut dolores soluentur, aut certe mitiores fient.

72 Olei vel ex amygdalis, vel ex semine lini usus, ubi multa adfuerit materia crassa, inutillis, sæpè numero esse solet, retinetur enim aliquando, & viscidiorè materiam reddit, & licet tanquàm antidotum quãdoq; mitiores reddat dolores, quoniam tamen materiã peccantem subducere nõ valet, solum non curari dolores, sed sæpè denuò insurgere.

73 Aperta igitur via, & subducta parte materiæ aut enematis, aut medicamentis purgantibus, si adhuc urgeant dolores præstantissimum esse solet præsidium.

74 Sed si vereamur aut ob crassiã materiæ, aut ob eiusdem quantitatem, ne possit præterfluere, admiscendũ illi erit nõ nihil abstergentiũ, ut mellis rosati solutim, aut et purgantiũ, ut diaphanici, vel electuarii, elæscoph dissolutorũ, cum aqua aut glandiũ perficorum, aut anisorum, aut similium.

75 Quod si à flatibus dolores prouenerint sine multa copia materiæ, nihil est quod magis ex usu esse soleat eodẽ modo ab initio, aut per se sumptum, aut, quod melius esse sæpius expersus sum, cum prædictis.

76 In usu vomitoriorum cauti sint, maximè si enim

In colicis
usus olei,
nõ euacua-
ta materia
prius, inu-
tilis.

Oleum in
colicis quã
optimum
præsidium

Olea in
colicis ad-
uandã cũ
abstergen-
tibus, aut
purgantibus.

In colicis
à flatu olea
data etiam
ab initio
utilia.

enim ventriculus, & supernæ partes intestinorum repletæ nimium fuerint, ex vſu maximè erunt, vt medicamentis ad deiiciendum ingeſtis locus datur pertranſeundi: quòd ſi totus dolor, eiufq; cauſa infernas partes obſideat non ſolùm fruſtrà tentatur vomitis, ſed aliquando fit cum ægrotantiſſi certa pernitie: voluuloſi enim ſæpè fiunt, ac cum certo mortis periculo etiam ſtercora per eam partem euomunt.

Cucurbitulæ magnæ in colicis applicandæ cautio. 77 In cucurbitulæ magnæ appoſitione regioni vmbilici ea adhibenda eſt cautio, vt ea ex illis ſit, quæ ſunt in medio perforatæ: ſit enim ſæpenumero, vt, cum pars ſubiecta mollis ſit ac pinguis, multa illius moles introrahatur, quæ ſubtractione cucurbitulæ impedire ſolet: vnde vel diutiùs retenta in ſphacelum ſubiectâ partem deducit, aut ſi frangatur, vt hoc incommodum euitemus, aliquando ex vitrorum fragmentis cutis vulneratur.

Vmbilicus muniendus in applicatione cucurbitulæ. 78 Cum pluribus poſſiſſimum mollibus, & per pinguibus hiantes ferè ſint vmbilici, & ex vi ſuperpoſitæ cum igne cucurbitulæ pinguedinis aliqua portio aliquando trahatur per eam partem, conſuſo orificio illi, vt priùs ſuperponant paruum ceratum puta ex ceruſa cocta, vt tale incommodum euitent.

Colicis ex flatu valèter diſcutiendæ materia notanda. 79 Vt in colicis doloribus ex flatu anodyna flatim, & interna, & externa concedenda ſunt, vt cruciatus illi mitigentur, etiam ſi nondum materia, vnde eleuantur, ſit euacuata, ita ea fugienda, eſſe cenſeo cum Gal. 12. meth. quæ inſignitèr calefaciendo diſcutere quàm maximè valent: attentata enim materia maiorem locum occupans inteſtina magis diſtendit, ac flatibus adauctis dolores augeat.

80 Cucurbitula etiā in ijs doloribus ex flatibus; ubi urgeat symptoma, uti possumus; sed cessaro dolore vel mitiore reddito, materia, vnde eleuatur, subducenda est, alioqui redeunt, ut optimè Gal. 12. meth. c. 8. si tñ non adeò urgeat dolor, ut omnè ad se trahat indicationē curatiuā, præstabit euacuationē præmittere, præsertim si multa sub sit materia, aut adhuc noua affluat ex 12. meth. 19.

Colici ex flatu antè cucurbitula vsum purgandi.

81 Contingit aliquandò, ut colici dolores adeò vehementes sint, ut omnem medicorum operam eludant, ac quocunque auxilio adhibito potius augeantur, in casu ad contraria erit transeundum: Cùm enim colici dolores maiori ex parte à materia frigida fiant, aut à flatibus distendentibus, sit aliquandò, ut, aut ratione dolorum, aut vigiliarū, aut meroris ob contumaciam aut incalescant nimium intestina accedentibus etiam calidis, & intra, & foris apposis remedijs, aut phlogosi quadam tententur, aut etiam vera inflammatione incipiant affici, aut multa præexistens bilis ibidem transfundatur, vnde ad contraria erit transeundum, & insignitè refrigerandum, quod mihi anno præterito contigit primo in nobili hispano peditum duce egregio, post in N:à secretis Illustrissimi, & Excellētissimi Marchionis Carauagij, qui, cùm colicis doloribus per aliquot dies fuissent acerrimè cōflicti, & iam iam mors esset præ foribus, nulli perferrentur arteriarum pulsus, sudores adessent resolutorij, nulla denique amplius superesset spes salutis ne quidem apud medicos etiā præstātiſsimos, accersitus, & ego, cū sitim inextinguibilem, linguæ scabriciem, nigrorem, ac duriciem, per tactis autem hypochondrijs, & ventre inferiori calorem in partibus illis estuantem adef-

Colicis in doloribus frigida aqua quoadq; vtendum.

se obseruasse, Hispano aquam multam aëne etiā refrigeratā bibendam exhibui, cū natura abstemius esset, & multæ aquæ potator egregius: in somnum prolapsus est, & quatuor horarum spatio cū dormiisset, dolore quodam inferioris ventris à primo maximè, ut ipse referebat, diuerso excitatus à somno miram bilis flauæ copiam euacuauit, & à doloribus liber euasit; vnde collegi medicos, qui illius curationem susceperant, in causa morbi illius longè deceptos fuisse, cū calidis remedijs curationem instituisent, à frigida materia factum morbum iudicantes. Alterum autem, cū iam agentem animam inuenissem, non alia ratione statim curauit, quàm linco panis multiplicis in quādrati formam cōposito frigida immerso, ac mirantibus astantibus quid facerem, ventri superposito, cūque ut dormiret, iniunxissem, diutiusque etiam somno oppressus sine motu cū conquiesceret, venientes affines, & vxor, ne iam satis cessisset, cū expergescissent, indignabundus, quòd tanto bono eum priuassent, quasi è lecto exiit à doloribus omnino liber.

In colicis
ex inflam-
matione
purgatio
lethalis.

82 Si ex inflammatione intestini dolorem fieri contigerit, caueat medicus ne vllò quantumuis leui medicamento subducente utatur, ne attractis ad partem inflamatam ab illæsis partibus calidis, aut prauis humoribus, aut inflammatio augeatur, aut impedito transitu in voluclum desinat.

Cassia in
colicis ex
inflammatione
vtilis.

83 Cassiæ tamen folius vsum aliquando nō respuerem in tali casu, quòd miti, blando, & humido calore sæpè inflammationem sedet, dolorē leniat, & supputationem tumoris adiuuet.

84 Quamuis venæ sectio ex brachio in colico dolore

dolore ex inflammatione decreto Gal. r 2. meth. Colico in
 med. comendetur, si tamen eò vsq; morbus per- dolore se-
 uenerit, vt urinam supprimat, secta vena in talo cta ver-
 maximè conferet, aut post priorem illam, si mul- in talo ali-
 ta adfuerit plenitudo, aut etiam si talis nō adfue- quādo eò-
 rit, si ex talo loto sanguis primò mittatur, nō erit fert.
 præter rationem, & experimenta.

De alui fluore.

85 **I**N alui profluuiū illud maximè cauendum, In diar-
 ne dūm virium maximè habere rationē vo- rhea pin-
 luerimus consumptis carniū, & iuribus pingui- gua sulpe-
 bus laxitatem ventriculi, & intestinorum nimiam cta.
 procuremus, aluique fluorem adaugeamus.

86 Sunt sæpè numero nostrates medici in frigi- In alui p-
 do potu concedendo adeò restricti, vt malint cum fluuiū fr-
 manifesto detrimento repente aqua fluxū laxita- gidas po-
 te introducta alui augere eo cōsilio, quòd frigidū tus sæpè
 naturæ inimicū censeant, quā iusto ægri desiderio conuenit.
 satisfacere, quod tamē natura etiā benè operante
 fit, vt & adstrictiōni per frigiditatem satisfiat.

87 Inflammatione tamen vera tentatis intesti- Frigida fu-
 nis frigida potus vitandus est. gienda in

88 Cauendum in diarrhæa, quod plerisque vi- inflamma-
 deo consuerum, ne semper, aut in plerisq; statim tione inte-
 absterforium aliquod exhibeant, vt mel, aut syru- stinorum.
 pum rosatum, aut simplicem, aut solutiuum cum In diar-
 lero lactis, aut mannâ; cum enim aliquando be- rhea quan-
 nè operante natura id fiat, non erit aut irritan- do abster-
 da, aut promouenda, sed totum negotium natu- gentibus
 ræ erit relinquendum: sin verò mala qualitate vtendum,
 irritata etiam id natura præstiterit, non etiam
 erit adiuuanda: ne calcaribus naturæ currenti
 addi-

additis præcipites in mortem ægros agamus: Spectatores igitur potius huius motus naturæ aliquandiu erimus, & morbi morbificæque causæ potissimum rationem habebimus; Quod si naturam hinc scire, aut succumbere viderimus, neq; materiam posse pro ratione euacuare, irritari tamen partes, sæpiusq; ad excretionem ferè inaniter provocari, tentiginem inano, & inane desiderium egerendi subesse, tunc manus adiutrices porrigere cōueniet, atq; abstergentibus vti, quin aliquandò soluentibus blandioribus vt manna, & syrupo, aut melle rosato solutiuo, vt quod pluribus egestionibus cū dolore, & naturæ labore euacuari tentatur, breviori tempore, & minori molestia educi possit.

De dysenteria.

In dysenteria quādo purgādū, & quando abstinēdū à purgatione.

89 **C**VM in curanda dysenteria adedò dissident sententiae, an referto corpore pravis, & acribus humoribus laborante dysenteria vera, ulceratis, aut abrasis intestinis conueniat medicamento aliquo saltem blando puta rhabarbaro, mirabolanis tamarindis, manna, syrupo rosato solutiuo, & similibus humores euacuare, an potius omninò ab ijs sit semper abstinendum; quæ res in medicina faciendā maximi momenti esse constat, ego non aliam hac in re sententiam in medium proferre tēraui, quā eam, quā nobis tradidit doctissimus Vallesius quarto. Epid. cap. 96. qui ab utraq; sententia extremè dissidens aliquandò purgandum censuit, aliquandò omninò abstinendum esse voluit: verba eius sunt. Aut in dysenterico est cum cacochymia magna exulceratio nondum magna; aut

cum

cum exulceratione magna cacochymia exigua; aut vtraq; exigua: aut vtraque magna: si primùm expurgari debet: si secundum minimè, sed ad sudores, ad vrinam, aut vomitus vocandum, & instandum localibus interiùs, & interiùs pro vlcere curando: si tertium, ne tunc quidem localibus admodum, neque purgatione opusest, sed bono victu, & facili, ad alias euacuationes derivatione: si quartum insanabilis est, facies aut nihil, aut omnia tentandi gratia, velut in re desperata. Tales enim etiam curationes aliquando profuerant: neque mihi semper displicet illud Celsi, sæpè, quos ratio non iuuat, temeritas adiuvat.

90 Debet igitur quam primùm huiusmodi humor prauus, & acris euacuari aliquo ex prædictis medicamentis, si illius magnam copiam ex oris amaro, ventris turbatione, aut alijs signis subesse cognouerimus, antequàm ex frequenti, sed pauca excretionem vlcera adaugeantur, aut vires deiciantur.

In dysenteria vbi purgandum, quàm primùm id præstandum.

91. Animaduertendum tamen si subesse copiam attrahibili humoris cognouerimus, etiam si exulceratio adhuc magna in intestinis facta non sit, non statim purgante medicamento esse educendam; cancerosa enim vlcera, & pessima excitaret, sed attemperari, eiusq; ferocia deliniri priùs debet, quod vbi factum esse cognouerimus, omninò euacuari debet, sed blandissimo medicamento decoctione tamarindorum, vel mirabolanorum, cum syrupo, vel melle violato solutio, ijsque similibus.

In dysenteria humore attrahibili exuberante, priùs ferocia illius temperanda, quam purgandum.

92 Rhabarbarum in dysenteria ab ijs, qui Mauritianorum dogmata sectantur, quique purgandum sæpè in ea censuerunt, quamquam videam passim ad hunc finem in usum duci, potissimum vbi bilio-

Rhabarbarum in dysenteria tuum spectum.

si,

si, & acres humores abundauerint; quod tamen, & ipsum igneas partes habeat, quod in substantia assumptum, ut in hoc affectu plerumque fit, tunicis intestinorum; & viceribus adhærescens dolores pariat implacabiles, ut sæpius obseruavi, omnino fugiendam censeo, & quàmuis syrupus de cicorea Guglielmi cum eo paratus adstrictione catere fatendum sit, cum tamen à cicoreaceis igneæ illius partes retundantur, si cum decocto tamarindorum, aut mirabolanorum concedatur, non ita rejiciendum censeo.

Syrupus
de cicorea
cū rhabar-
baro Gu-
glielmi in
eadem ad-
mitti po-
test.

Rhabar-
rum torre-
factum in
dysenteria
reijciendū.

93 Sed magis etiam recentiores cōmuni errore decipiuntur torrefactū rhabarbarū in dysenteria exhibentes, adstrictionem, & exsiccationem auge-
re volentes, ut vtraq; facultate purgatoria, & ad-
strictoria adaucta melius intentioni satisfacere
possint; quod innocentius fieri torrédo putant, cū
experientia constet mediocriter torrefactum ve-
hementius, & minori dosi purgare, quàm inte-
grum; igneas tamen partes adhuc magis vigere:
& si maiorem aduersionem adhibuerimus, purga-
toria facultate penitus destituitur.

Dysenteri-
cis rãd cõ-
uenit san-
guinis mis-
tio; & cur.

94 De mittendo sanguine per sectam venam, cum grauiſſimorum virorum sententiæ è diame-
tro omnino inter se sint contrariæ, alijs maiori ex
parte sanguinem mittentibus, alijs nunquam.
Ego huius sum sententiæ, si simpliciter dysente-
riam consideremus, aut eius causam, aut multa
ex adiunctis, dolores, febres, inflammationes,
omnino conuenire missionem sanguinis, quæ, &
fluentes humores ad partem laborantem possint
retrahi, & plenitudo tolli, & securus refrigerari:
sed cum sæpiſſimè à diarrhæa producat, illius-
que etiam peripellus sit sociâ, in qua, etiam si non

fit

fit pro multitudine sufficiens, nunquam mittendum esse sanguine censuit Hipp. & Gal. 4. de rat. vict. in acut. 16. & primò ad Glau. cap. 14. quòd aut vires vitales sint imbecillæ redditæ, aut periculum imminet, ne prosternantur, rarò censendū est occasionem dari sanguinis mittēdi, potissimū, cum maiori ex parte in huiusmodi casu sciamus peccare humores à sanguine distinctos, & tales egros cacochymia laborare facillimèque tum ob euacuationem, tum ob vehementissimos dolores, vigilasque quasi perpetuas in summam vitalium virium debilitatem incidere.

95. Si tamen aliquandò mittendus erit sanguis Dysenteriæ alui fluore non magno presente, inflammata par-
cis qñ, & te, urgentibus doloribus, hepate, & toto corpore quomodo aut ob febrem æstuante, aut ob calefactos humo-
sanguis mit- res in venis, vitibus præsentibus consentientibus; tendus.
imminentis virium collapsus periculi habita ra-
tione, nec multum, neque confertim; & semel, sed
parum, per intervalla, & sæpius euacuabimus Aet-
rij, & Alexandri etiam sententia idque non ex so-
lū ratione, quòd vires non ita dissoluantur, sed
etiam quòd iterata euacuatione sanguinis melius
reuulsio perficiatur, quæ maximè in hoc affectu
expetitur, vt Gal. auctor est lib. de cur. rat. per
sectam venam capit. 2. si quidem natura toties ir-
ritata maiori cum impetu, & facilitate assuescit
materiam ad affectas partes confluentem in con-
trarios locos depellere, & quasi per alios riuos
transferte.

96. De lactis vsu in dysenteria cum videam do-
Lactis vsus
ctissimos aliquos vitos adeò dubitasse ob Hipp. in dysēte-
& Gal. auctoritatem 3 aphor. 64. & Celsi lib. 3.
ria qualis
cap. vigesimotertio vt rarissimè in tali morbo ipsū

in vsum ducant, quòd deiectiones ferè semper in ea sint biliosæ, & febres non leues maiori ex parte coniungantur, cum alioqui sciam maximè laudari à Gal. 10. de simpl. med. facul. & 3. de alim. facul. cap. 15. vbi non solum dysenterix, sed omnium ventris fluxionum acrium optimum dixit esse remedium: ceterè nullo modo febre presente, & acribus fluentibus humoribus lac conuenire simplex, & sine præparatione; at paratū, vt faciebāt antiqui, & vt docet Alex. Trallians lapidibus, ferro, aut calybe in eo extinctis frequentèr, vt & serosa absumatur substantia, & pinguis, butirosaq; corrigatur igneis absumptis, certū est nō nisi maximas in hoc affectu afferre posse vtilitates, q̄ non accendi, & in bilē verti hoc modo paratū certò sciamus; aluum autē sistere posse certū sit, tū ob caseosam materiā incrassantē, & frigidā, tū q̄ ex candētib; lapillis, aut calybe adstringentē nanciscatur facultatem.

In dysentericis clysteriū abstergeriū vsus cum cautione.

¶ 97 Cū in principio difficultatis intestinorum sæpenuerò mucositatibus quibusdam apparentibus passim medici ad abstergentia enemata deuehiant, ne adhærescente diutiùs tunicis intestinorū huiusmodi humore salso, vt ipsi putant, exulcerentur intestina; sæpenuerò etiam maximo in errore versantur: mucositas enim huiusmodi non aduentitia est, neque præter naturam, sed naturalis, quæ à natura intestinīs indita est, vt muniantur, ne à bile, quæ cū fecibus in dies euacuatur, interna intestinorū pars abradatur, quæ cū in diarrhæa ab acribus humoribus commota, & abrasa exire incipiat, si clysmatibus magis abstergetur, denudata tunica eo, quo munitur, faciliùs exulcerari poterit: diligens igitur cura adhibenda est, vt mucosi, & vitiosi humores, aut à capite, aut à ventriculo defluxi

defluxi ad intestina, à naturali mucositate intesti-
norū discernantur; quod licet difficile sit, hæc ta-
men frequētiūs cum pinguedine iuncta esse solet,
& cū aliqua rasura internæ tunicæ: & tunc nō solū
non est abstergenda, sed potius incrassanda, pin-
guioribus, & viscidioribus iniectis tentandum erit
munire loca illa, & acrimoniam fluētium humo-
rum reprimere, quod oleo rosato omphacino, aut
unguento rosato commodè præstari poterit.

98. At in eodem errore versantur ij, qui fluore
materierum cessante, dysenteria tamen perseverā-
re, & vlcere in intestinis, iisdem abstergētibus cly-
sterijs vtuntur; ex aqua hordei, vitellis ouorum, &
saccharosis impediētes hoc modo agglutinationē,
quod sæpenumerò natura viscidam in fine matre-
riam nutrire aptam, vt reponatur, quæ naturalis
erat iam abrasa, eo mittat.

99. Tanta est doloris in hoc morbo vehemen-
tia, vt nullo tentato alio remedio narcoticis sit sta-
tim vtendum non solū per os assumptis, sed etiā
per inferna iniectis.

100. In ijs tamen diutiūs non est perseveran-
dum, quoniam sæpè imponunt: cum enim somnū
conciliarint, & proinde fluxiones stiterint, & re-
frigerando, & incrassando humorum, & acrimo-
niam, & fluxilitatem imminuerint, dolore immi-
nuto morbus curatus videbitur, nisi tamē glutinā-
tibus, & siccantibus vlcus sanemus, recrudescet
morbus, & nouo dolore superueniente noua flu-
xio excitabitur, & vlcere non curato difficultas
intestinatorum denuò fiet.

101. Pinguia etiā illa, & viscida substantia
prædita, vt in acerrimi humoris fluxione necessa-
ria sunt ad internam intestinatorum tunicā vestiē-
dam,

Clysterijs
abstergen-
tibus in fine
dysenterię
abusus.

Narcotica
etiā in
principio
qñ conue-
niant.

Narcoticis
in dysente-
ria parçē
vtendum.

Dysenteri-
cis pinguia
immittere
quando v-
tile, & qñ
noxium,

dam, ne magis abradatur, & ad muniendas vlceratas partes, ne morbus augeatur, & dolores exacerbentur, ita in ijs non multum est insistendum, quod sordidum vlcus efficiant, & progressu temporis curatu difficilius; abstergentia igitur sunt interferenda.

Clysteres
nimirum ex-
siccantes in
dysenteria
omnino
reijciendi.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

102 Quæ adeo exsiccantia sunt, ut arsenicum, & trochiscos recipiant corrodescentes, & carnem in vlcibus suberescens absumere possint, ut passim à Rase, & Mauritanis proponuntur, nunquam in usum duci debere consulo: tum quod adeo quandoque valenter carnem consumant, ut reliquam intestini substantiam consumentes perforare soleat, quamuis enim passilli Passionis, Andronis, ex minio, & quæ ex arsenico etiam sæpius loto parantur, externis vlcibus prauis, & callosis applicentur, si tamen sentienti multam particulam, aut nudam, & non sordidam, non ve callosam, aut sanam applicentur, noxas afferunt inemendabiles. Et erit, qui in abrasis, cruentis, nudis intestinis, etiam si vlcere laborent sordido, audeat clysmate infundere acria huiusmodi, & corrodescentia medicamenta, quibus, & acerrimi dolores excitantur, & intestina dilacerantur, & sæpe perforantur.

Acrib. in-

fusis in dy-

senteria

q. 1 statim

faciendum.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

103 Si qua tamen acria, & valenter siccantia infundenda sunt, ut muria olluarum, aquæ naturales salmacidæ, lixiuum cum sapone, & similia, statim superindendus erit alius clyster ex oleo rosato, aut ptisana, aut decocto tursuris cum syrupo de portulaca, & ouis, ut & dolor leniatur, & tunica vestiatur.

Clyster ut

reueatur

quid præ-

bandum.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

2. 10. 10. 10. 10.

104 Quoniam autem euenit, ut injecta clyster statim aut exeat, aut propellatur statim atque injectus est, fouendus erit anus lineo panno intin-

do

fit in decocto rerum adstringentium, atq; etiam aliquo conatu manu pars erit comprimenda.

105 Quamuis hepaticis sub morbis hepatis col- Hepaticis
singulare
remedium
locari deberet, quia tamen à practicis sub dysen-
teria curatur volui præstantissimum remedium
hoc loco docere, quo si alio villo hepaticos curari
posse experientia multiplici cognoui; eoq; liben-
tius, quòd Euporiston est medicamentum, & ra-
tioni conueniens: sumitur vva rubra, quam pigno-
lam nostri dicunt; acinis est non magnis, racemis
adstrictis, vt tardiùs maturescat, & vinum nobile,
rubellum, & quod picantem vocant, facit colligi
debet dùm media est inter acerbitatem, & maturi-
tatem, quod solet apud nos esse versus diem festu
Natiuitatis B. Virg. Mariæ mense Sept. soli per
quatuor dies primò exponitur, mox in furno se-
micalificato exsiccat, & seruat ad vsum: & ve-
niente occasione quoniam emollescit in vase vi-
treato, aut ad ignem, aut in furno iterum exsicca-
tur adeò vt in puluerem duci possit. Huius 3 ij.
per duodecim, aut quindecim dies ex vini rubri
potentis onc. iij. singulo die per quatuor horas
ante prandium exhibeo, & cum hoc solo præsidio
non paucos ad pristinam sanitatem deduxi. Nec
mirum si semper non succedat, cum, vbi radices
egerit, difficillimè curetur, ex vino autem conce-
demus, si agri careant febre, quæ si coniuncta sit,
loco vini sumet decoctionem rad. cicorij crassa-
rum longa ebullitione cum expressione: in qua
si calibs ignitus sæpiùs extinguatur, meliorem
effectum producet.

De vermibus.

In vermes enecâtib. ex hibēdis quid præstandum. 106 **I**N medicinis, & per os assumendis, & per inferna infundendis semper hæc adfit cautio, vt antequam ea in vsum ducamus, dulcia aliqua aut pingua concedamus, vt ijs allekti vermes facilius ea comedere tentent, quæ propriè, & verè, & enecare, & expellere e corpore eos possunt, melle igitur, saccharo, lacte, aut pinguib. præmissis, succedent quæ enecandi vermes facultatem habent.

Vermes enecâtib. dulcia, vel pingua admiscenda. 107 **Q**uin ne hæc sola tunc danda erunt, ne à dulcibus ad amara, aut acria accedentes facta mutatione in contraria potissimum à gratis ad ingrata ab eis abstineant, cum dulcibus igitur admiscenda sunt, aut pinguib., vt aliqua similitudine ducti, ac grato sapore allekti ijs etiam nutriantur, quæ occidere eos solent.

Ante emplastra enecantia vermes clysteres dulces indendi. 108 **O**b hanc autem etiam causam obseruandum erit, vt cum vnguentis, aut emplastris ad eos occidendos vtendum erit, prius indantur clysteres ex dulcibus, aut pinguib., vt ijs allekti ad intestina inferiora alliciantur, vt ventri inferiori illis applicitis, & enecari, & expelli facilius possint.

In vermibus enecandis emplastra vbi applicanda. 109 **I**n ijs autem externis applicandis, vt quæ ex farina lupinorum, aloe, myrrha, ex succo rutæ, aut rutæ caprarie siue lalægæ, vel aceto parantur, cauendum, ne regioni ventriculi applicentur, sed circa regionem vmbilici, & ventris inferioris: illa enim sæpè ventriculo infesta sunt, & cauendum etiam, ne, si ad ventriculum ascendissent, in eo loco enecentur, solent enim ex tali occasione quam plurima, & grauissima symptomata produci: præstabit igitur ventriculum fouere adstringentibus,

&

& acidis, vt roborata parte, & deorsum pulsus vermibus, applicatis ventri inferiori remedijs illos euincere, & enecare possimus.

110 In ijs, quæ per os assumuntur, illud omnino obseruandū est, vt si ex ijs fuerint, quæ, & enecare, & e corpore propellere possunt, vt est aloes, coly-
 cinthis, & similia ea satis esse, solūq; indigere aut re aliqua abstergente, aut etiam refrigerante ebi-
 bita: at si ex ijs fuerint, quæ enecante facultate so-
 la prædita sunt, aliqua post superbibenda sunt, quæ abstergendo eos iam enecatos expellere possunt.

Vermes
 enecantib.
 per os sū-
 ptis quid
 faciendū.

De hæmorrhoidibus.

111 IN hæmorrhoidum curatione, quia vbi su-
 perfluè sanguinem emiserint, medicos in-
 contrarias sententias abire cum maxima egrotan-
 tium calamitate quotidie obseruamus: afferenti-
 bus plerisque cum Hipp. 6. aphor. 12. non omnes
 occludendas esse, sed vnā saltem esse apertam,
 relinquendam: sic enim, & immoderati fluxus san-
 guinis rationem habebimus, casum virtutis vita-
 lis impediemus, & morbis ex immodica hæmor-
 rhagia imminentibus contrahimus; neq; tamen
 morbis illis occasionem dabimus, qui ex faculen-
 to, & atro humore oriuntur, qui per illas partes
 euacuari solet: Alijs e contra cum Aetio defenden-
 ribus, vbi superfluus sit sanguinis fluxus omnes
 omnino occludendas esse; & recta victus ratione
 instituta, statisque temporibus, & expurgandum
 esse corpus, & sanguinem per sectam venam eua-
 cuandum. Ego verò huius sum sententiæ, vbi san-
 guis per eas venas immodicè effluat, ita vt, & vires
 vitales deiiciantur, pallor sequatur magnus, sub tu-

Hæmor-
 rhoidibus
 superfluè
 euacuati-
 bus an oēs
 occluden-
 dæ, an vna
 relinquen-
 da senten-
 tia aucto-
 ris.

midæ conspiciatur facies, ad malum habitum tendat corpus, omnes omninò esse, si fieri possit, occludendas, quia virtutis supra omnia habenda est ratio, neq; vllam apertam relinquendā vllò modo esse, cum in curatiuis indicationibus ab eo, q̃ magis vrget, sēper sit inchoandum: Ne verò res hæc Hipp. aduersari, & cōmuni ferè omniū medicorū sententiæ videatur, obseruandum est, sāguinis per has venas effusionem aliquandò esse consuetā, vt statis quibusdam tēporibus, puta singulo mēse, aut etiā frequentius, vel bis, vel ter in anno fieri consueuerit, aut certè vi morbi, puta in magna febre cū summa plenitudine semel, aut iterū acciderit; aut deniq; quòd cum statis temporibus moderatè effunderetur sanguis vi morbi, aut alia occasione superflua tunc fuerit. Secundò obseruandū est antiquos in immoderata ex venis sedis effusione venas illas aut ligasse, aut fuisse, aut vssisse, ita ut nunquam per ligatam, assutam, aut vssam venam amplius sāguis euacuari posset, vt apud Græcos, Arabes, & Latinos, & antiquos, & recentes cōstat; quæ tamen curandi ratio nostris his tēporibus exoleuit, puluisculis emplastricis, & adstringentibus cōtentis, aut ad summum vssione. His sic stantibus, si excessus is hæmorrhagiæ insolitus sit, & vi morbi, & plenitudinis superuenerit, censeo omninò esse suppressendum nulla aperta vena relicta: ne vena sanguinem euomente in proposita incommoda incidamus: Quòd si statis temporibus aut quantitate excedens, aut qualitate infestans, aut vtraque ratione molestus à natura per eas venas expurgari solitus, aliquando modum exceßerit, vt & vitales vires prosterantur, & alia incommoda inducantur, aut etiam singulis euacuationis temporibus

puta

puta per duos, aut tres illos dies solitæ euacuatio-
 nis superfluat, aut si frequentius exiens quàm so-
 leret, aut oporteret, illa inducat incommoda, si, vt
 illis obstitamus, occludere venas illas velimus, si
 causticis, medicamentis, ligaturis, abscissione, aut
 ferro candente id præstare quis tentauerit, cum ex
 illa curandi ratione non solum transitus præsentis
 tempore sanguini interclusus sit, sed omnis via
 etiam impediatur in posterum, per quam transire
 possit, ne in ea incommoda ægri post incurrant, de
 quibus Hipp. 6. Epid. & Gal. ibidē, & 6. aphor. 12.
 & 3. in 3. lib. de humor. necessarium est etiā alijs
 vltis, assutis, abscisis, ligatis, vnā relinquare aper-
 tā, vt per eam excrementitius sanguis, qui in cor-
 pore in dies aggregatus statis temporibus euacuari
 solet, expurgari ex mote possit, ne affectus illos
 melancholicos, maniam, melancholiā vlcera, cutis
 defecationes, & alia producere valeat, sed si solum
 puluisculis adstringentibus, emplastricis, aut, &
 vrentibus res agenda sit, & cum curationis modū
 sequamur, qui, & faciliior est, & securior, licet ali-
 quando recidivas admittat, si ad eum terminum
 euacuatio sanguinis peruenerit, qui iam descrip-
 tus est, omnino via omnis erit intercludenda, vt
 præsentibus incommodis occurramus: cum per hanc
 curandi rationem non ita obliuentur venæ, vt
 humore denuo exuberante iterum natura sibi viā
 inuenire, & struere non possit, aut ope medici, aut
 perfricatione cum rebus asperis, aut scalpello, aut
 hyrudinibus aperiri denuo venæ nequeant.

De renum inflammatione.

Renib. la-
borantibus
quæ vena
secanda.

112 **C**VM in curandis renum affectibus euacuatione sanguinis per sectam venam opus est, à qua parte mittendus sit sanguis nō vna est omniū medicorū sententia, quod Gal. lib. de cur. rat. per sectā venā partibus supra renes laborantibus ē partibus superioribus nempē brachijs mittendum esse sanguinem docuerit, infernis autem affectis, puta vtero vescica, & coxis ē vena vel sub poplite, vel in talo, cum renes penē ambigat: lib. autem 13. meth. med. in renum affectibus secandā venā esse doceat in poplite, aut talo: alijs maiori ex parte supra, alijs infra, alijs sine distinctione alterutram partē eligentibus. Ego cū doctissimo Trincauellio habita ratione cōmunicationis venarū maiori ex parte ex infernis mittendū censerem, cūm, & euacuationis gratia, nisi forte plenitudo ad vasa præsens fuerit, & derivationis certissimū sit à partibus laborantibus, & vicinis sectis illis venis sanguinem euacuari posse: At cum in inflāmatione renū, cum renulsiōne opus sit, potissimum in principio, in cōtraria retrahi sanguis debeat, & ex parte à fonte sanguinis versus superna retrahendo, potissimū si sanguinis multa copia refertum sit corpus, à iecoraria brachij dexteri, aut sinistri sanguinem extrahemus: quinimō si etiā in principio inflāmationis nō versemur, sed si affluerit sanguis, sed magna tamē adsit plenitudo, ab ijs locis sanguinē extrahemus, ne si ab infernis euacuetur, cum ex motu sanguinis in venis, qui in fonte est, & in supernis confertis versus locum incisum affatim affluens per locum affectum, & vicinas partes transiens, &

dolores

dolores augeat, & inflammationē quod si inflammationē nō fuerit, sed aliquis ex alijs affectibus, aut renum, aut aliarum illarum partiū, nec plenitudo magna adsit, indicatio tamen mittendi sanguinis cōcurrat ab infernis ob venarū coniunctionem, & rectitudinē mittendum esse sanguinē iudicamus.

113 At in renum inflammatione in principio potissimum si multa subsit plenitudo, licet, ut dictum est, mitti debeat sanguis ex brachio, progressu tamen temporis ex talo mitti etiam poterit, ut qui in vicinis, aut in parte consistit, euacuari, & deriuari commodē possit.

114 Qui clysteres indi solent ad refrigerandū, & emolliendas feces, ex ptissana, violaria, malua, oleo rosato, aut violato, syrupo violato, & similibus, quātitate mediocres sint, ne per repletionem subiecti intestini renes comprimant.

115 Quamuis in principio aliarum inflammationum materiam fluentē medicamento purgante euacuari posse alias docuerimus, quod adhuc cruda non sit materia, & dū fluit, reuulsione euacuatiua à parte, quæ statim eā susceptura erat, retrahatur, ut in Pleuritide docuit faciendum dolore descendente Hipp. 2. de rat. viſt. in acut. & in inflammatione linguæ Gal. 13. meth. med. in renum inflammatione, si aliqua iam ad partem fluxerit, omninò abstinendum, ne per intestina fluentē materia cum medicamento magis renes exardescant; quare cassia fistulati contenti, aut syrupo violato solutiuo, aut solis, aut mixtis, aut sero lactis ex malua, violaria, endiuia, vel iuiubis, siue euacuatione opus sit, ad alias complendas indicationes descendemus, eorum enim etiam si pars aliqua intestina subterfugiens ad renes peruenerit,

In renum inflammatione post sectam venā in brachio secunda etiā est alia ī talo. Renib. laborantibus clysteres sint in pauca quantitate.

In renum inflammatione in principio nō purgandum, sed blandē leniendum.

utilitatem afferet non mediocrem.

Renib. inflammatis. 116 Rhabarbari vsus in hoc morbo, vt, & in vrinæ ardore, sæpe mihi fuit suspectus: & si quādo ab aliquibus in vsum ductus est, semper malè cessisse vidi: quamuis enim aptissimū sit medicamentum ad bilem euacuandam, quæ duos hos affectus plerumque producit, qm̄ tamen ob igneas partes, quibus pollet, per venas diffundi videmus, & subsequenter ad renes, q̄ locia crocea post illius assumptionē ostendunt, meritò fugiendus videtur.

Renib. inflammatis impensè refrigerantiū vsus, & in principio malus. 117 In morbo hoc inchoante licet vsus repellentiū externè applicandorū conueniat; ab ijs tñ, quæ nimis impensè refrigerant, abstinendū est Alexandri etiā monitu, quāuis enim cū ex parte repellatur materia affluens, & calor partis æstuans retundatur, videatur affectus mitescere, & oīa symptomata imminui, quæ tñ iam affluxit materia aut in scyrrum vertitur, vel crassè facta indolentē quasi tumore producit, qui processu tēporis suppuratus vlcus in parte producit, & morbum incurabilem.

De renum vlcibus.

Renum vlcus. 118 **V**bi autem vlcus sit excitatum in renibus cuscitō ad præcepto Galeni curandum est, vt sit maxime sollicitus medicus, vt vlcus quā citissimè ad cicatricem deducatur.

In vlcere renum valide exsiccantium vsus malus. 119 Ad id autem præstandum, licet, quæ exsiccante facultate prædita sunt, maximè in alijs conueniant, in renum, & vesicæ vlcibus omninò fugienda sunt ob mordacitatem, cuius occasione excitati dolores nouam fluxionem concitarent; quæ blandè igitur abstergunt, & doloris mitigatoria sunt, conuenient, qualis est mulsæ, & syrupus de iuiubis,

inuinbis, vel ex rosīs siccis, cum portione syrupi de
portulaca.

120 In renū vlceribus curandis, cū, & mul-
sa conueniat, & lac, nisi diligens adhibeatur cura,
& in tempore exhibitionis, & in lacte seligendo,
& in illius quantitate, aut frūstrā concedi, aut cum
detrimento cognoscemus: In principio enim post
disruptā vomica, aut vlcus ab acerbis humorib. ex-
citātū, cū vlcus sordidum fuerit, lac cōueniet sero-
sūm, quodq; abstergere magis valeat, quale asini-
nūm: illud verò ex locio cognosci potest, si in co-
pus subsit copiosum, fetens, & sordidum. Vbi verò
vlcus meliorem acquirit cōditionē, ac à sordibus
repurgatū fuerit, quod cognoscemus, si pus in vri-
na contentū albū, & æquale fuerit, lac conueniet;
quod minū abstergat, & magis carnē producere
valeat, quale est caprinū. Vbi autē vlcera expurga-
ta ritē fuerint, vt loriū non ampliū purulentū ap-
pareat, tunc potiū lactis genus conueniet crassius,
magis nutriens, carnēq; generans, quale est ouil-
lū, aut bubulū, in primis illis pauxillum mellis, aut
sachari, aut iulepi rosati, aut violati adiiciendum
erit: in postremo minimum sachari, aut iulepi ro-
sati cum leui quantitate tragaganthæ.

121 Quantitas lactis neq; vno in omnibus mo-
do mētienda est. Ratione loci laborātis multa cō-
ueniret; & potissimū si ad absterfionē exhibeatur
lac asininū, potissimū si lacti æger assuetus sit, nec
ex eius vsu molestiam sentiat, libram cōcedemus:
sin nō assuetus sit, ab vncijs quinq; vel sex incipiē-
tes paulatim ad maiore quantitatē accedemus:
Caprilli minore sēper quātitatē cōcedemus, neq;
vncias sex excedemus, q̄ diutius in ventriculo cū
cōmoreretur, si multū illius concedemus, aut acesce-

aut

Lacte in
cōcedēdo
in renū
vlceribus
quæ cau-
tio.

Lactis quā-
titas in re-
nū vlcē-
ribus quæ.

aut in grumos concreſcet, ob quã rationẽ ouilli, & bubuli etiã minorẽ ſolemus quantitãtẽ cõcedere.

De calculo renum cum dolore acerrimo.

Calculo
renũ labo-
rantes ſz
pẽ ab ini-
tiopurgã-
di contrã
communẽ
conſuetu-
dinẽ.

122 **Q**uamuis in calculo renum curãdo, vbi do-
lores non adſint acerrimi, ea curandi ra-
tio cõueniat, quẽ ab Auic. & Mauritanis tradita
eſt, quamq; recentiores pleriq; ſecuti ſunt, vt re-
pleto vëtriculo vomitus prouocetur; mollibus cly-
ſteribus fẽces ſubducantur, alijs itidem emollien-
tibus laxata parte leniantur dolores, & ſi qua ma-
teria in inteſtinis conſiſtens, vnde eleuentur flatus
diſtẽdentes, abſtergatur, & euacuetur, mox emol-
lientibus laxantibus, & anodinis, & mitigetur do-
lor, & dilatentur viã à calculo diſtenſã, quod fo-
menti, inunctionibus, emplãſtris, & id genus alijs
etiã tentari debet, mox conterentibus lapidem,
& eundem propellentibus diureticis curatio pro-
ſequi debet: quinimõ ſi vomitu euacuari ventri-
culus non potuit perfectẽ, per os etiã ad ſimilia
prãſtanda exhibent caſſiã fiſtularis mẽdullam aut
per ſe; aut ex leui portione olei amygdalarum dul-
cium, aut diaſebeſten non ſolutium, aut diapru-
num, mox abſtergentibus, incidentibus, & arte-
mũantibus antecedentem, & coniunctã materiã
ad euacuationem prãparant; nunquam autem ab
initio ſolvente, & verẽ purgante medicamento
vtendum iudicarunt, ne aut cruda materia ab ini-
tio non prãparata euacuetur, aut deorſum lata la-
borantem partem magis affligat. Quoniam ta-
men ſãpiſſimẽ euenit in noſtris his regionibus, &
potiſſimum in magna hac vrbe, quod, & nimium
genio indulgeant, multaquẽ aſſiduẽ ingerant, &

multis tententur à capite distillationibus, vt vètricus, intestina, & venæ meserci refertę sint multis crudis humoribus, à quibus per venas ad renes delatis adeò frequentes fiunt dolores renales, & podagræ, qui nisi euacuentur, neq; tutò anodinis vti poterimus, neq; conterētibus lapidē, neq; eundē propellētibus, quin nec diureticis; cū præterea sæpè adeò vrgeat dolor, vt longā illam curationē expectare nec velint ægrotantes, nec possint, nec expediat ob collabentes vires; blandissima verò illa lenientia, vel lubricantia sæpissimè munerit illi euacuandi materias multas, crassas, & viscidas satisfacere non valeant, sed retenta, & ipsa, & per se molē augendo, & cōprimendo dolorē augeāt, aut eleuatis, & ex se, & ex cōmoia nō expulsa materia multis flatibus, censeo sæpissimè expedire medicamento vti soluente pro varietate materiæ, benedicta laxatiua, diaphænico, electario eleſcoph; electuario de succo rosarū, indo, & similibus addita portione cassię, vel lenitiui, cū melle rosato solutiuo: sic enim, & crudas illas materias in ventriculo, & intestinis cōsistentes, & si quæ sūt in primis vijs tanquā causæ antecedentes, euacuabimus, easdēq; & similes reuellemus, molē, & fēcum, & humorū in intestinis renes comprimētem, & dolorem augentem imminuemus anodinis, mollientibus, laxantibus, diureticis, conterentibus lapidem, & propellentibus viam struemus. Qua curādi ratione, cum sæpius ad eos acciti essemus, qui nephritico dolore laborātes curabantur priori illo modo, clysteribus mollibus videlicet, & bolis ex cassiæ medulla, aut lenitiuo, aut solis, aut cum portiuncula hierę, medicamēto soluente exhibito, mox anodinis, mollientibus laxantibus, & lapidem propel-

Lenientia
sola in cal-
culo non
sufficiunt.

len-

lentibus adiunctis citò; & feliciter cū magna mea gloria; ac inuidia curationē absolui: cū verò curandi hæc ratio rationibus ijs nitatur, quæ proximè enarratæ sunt; Hipp. & Gal. duo medicinæ vera lūmina habet, & doctores, & assertores 6. Epid. sectio. j. tex. 5. vbi postquā tradidit Hipp. signa quib. nephriticus affectus cognosci possit, breuissimis etiā verbis totā curationē absoluit, & iuuenes etiā et febore purgandos docet: & in com. Gal. dum vnamquāq; vocē varia præsidia medica cōtinentē sigillatim explicat, dum de purgando corpore agit, medicamēto purgante tanquā velle esse propellendū docet. Neq; verò crudā tunc euacuare, & purgare dicemus contrā præceptū Hipp. prima aphor. concocta medicari: Coctio enim illa de qua in aphor. illa est, quæ humori putrido cōuenit; potissimū in febribus, cui coctio illa cōuenit, quæ secundo loco describitur ab Arist. 4. meth. quā putridis humoribus excrementis cōuenire docebat, secundū quā bilē crudā dicimus, & lotiū crudū tanquā signum in febribus putridis, at cruda, quæ alimentalē coctionē subterfugerunt, aut per inediā ad bonam frugem duci debent, aut si plura sint, quam superari possint, atque à calore ventriculi euinci, aut cōcoqui, quam primū sunt euacuanda aut lenientibus, & abstergentibus, aut etiam si in venulis miseratis, & altius infecta sint, purgantibus: qualia hæc esse cruda censemus, quæ in nephriticis exuberant. Neq; verò per euacuationē per inferna ad renes materiā trahimus, sed ab illis reuellimus: & per intestina subducimus; quāuis enim in transitu adsit vicinia, non adest tamen coniunctio; neq; periculum est in trāsitu, ne noxæ renes sentiant, vt in renum inflammatione in trāsitu

situ bilis; quia neq; hic inflammatio in parte adest, neq; calidus est humor, qui mouetur, sed laboranti parti etiam succurrimus, in aditis intestinis, quæ ob repletionem comprimebant renes à lapillo vnde quaque compressos.

123 In calculo renū curādo, vbi acerbissimi fuerint dolores, & ex situ cognouerimus iā lapillum vtereres occupasse, si quis diureticis tentauerit calculū à loco dimouere, in magnū sepe numero periculū ægrotantem deducet, ne scilicet in vrine suppressionē eū deducat ingruēte affatim ad obructū locū lotio, & sæpē cū arenulis, sæpius cū crassa, & viscida materia. Quare præstaret tūc emolliētib; & laxatib; decoctis vt ex caricis, malua, altheæ, & maluæ seminibus; seminibus itē frigidis maioribus, liquiritia, iuiubis, sebesten parātis, quod si ad penetrationē aliquid diuretici addere voluerint in parua quantitate non repugnare. Ad quem vsum etiam optimum semper indicaui oleum amigdalinum dulce ex leui vini albi tenuissimi portione.

124 Comuni ferè hominum consensu receptum est, prò auerrendis, & præcauendis doloribus ex calculo, & impedienda lapidis generatione expedit bis, aut ter in mense diureticum aliquid assumere, aut in syrui longi, aut iulepi, decocti, aquarū stillatitiarum, aut electuarij, aut puluisculorū formam, quo materia, quæ in dies in renibus aggregantur, paulatim expellantur, & abstergantur, ne calore accedente renū indurentur, & lapidescant: quod institutū vt omninò non est improbandum, si cum ratione fiat, ita quā plurimis perniciosū esse solet: si enim ab homine continēte fiat, aut ante illorū assumptionē leniens, aut abstergens medicamentū sumptū sit, vtilitatē asserre potest.

Calculo vtereres occupante diuretica mala.

Diuretica pro præseruatione calculi sæpè noxia.

At si gula is deditus sit, aut cruda multa in primis vijs aggregare soleat, vt solent maiori ex parte podagrosi, & calculosi, tantū abest, vt illorum assumptio eis præseruet à calculo, vt potius frequentiore illi præbeat occasionē, & sæpè etiam in suppressionem vrinæ deducat, & grauíssimos alios morbos, & symptomata, deducta materia, quæ in ventriculo erat, & in primis vijs, ad vias vrinæ.

Thermales
aque in cu-
rando cal-
culo sæpè
suspectæ.

125. Cum quàmplurimi pro lapillis ex renibus propellendis aquis Thermalibus vtantur, vt illarum vsum aliquando laudamus, cum impacti nimum in renibus fuerint, nec alijs cedāt remedijs; sic enim refrigeratis illis aliquandò dehiscences locū cedunt lapidi cōmoto, quin, & quantitate aque propulsus aliquandò descendit; ita rariùs eadem cōcedendæ erunt, quòd deducta crassa materia ad locum lapilli, sæpè etiam morbus redditur contumacior, & aliquando ad suppressionē vrinæ omnimodam per illas ægrotantes deducuntur.

De lapide vesicæ.

Lapidē in
vesicæ cō-
cretū scan-
gentia si-
cūctia, &
falsa.

126. Scio ego, & antiquos, & recentes scriptores infinita propemodum, & simplicia, & composita medicamenta tradidisse ad cōminuendū, & frangendū lapidem in vesicæ: At horū auctoritate etiam scio quàmplurimos ægrotantes in perniciem à medicis nimium credulis deductos. Ægrotantes cum ex lapidis per incisionem extractione quàmplurimos mori obseruent, omnia malunt priùs experiri, quàm genus illud carnisficinæ etiam periculosum. Medici partim experientia destituti, promissis scriptorum adducti, & spe premij ob avaritiam allecti curationem pertrahunt,

trahunt, omnia experiuntur, & denique aut spe
defraudati, aut iam curationi succumbētes tādē
non aliam se viā inuenire curādi quā per sectio-
nē profitentur, sed interim æger crumena exausta,
ob dolores, & vigilias cōsumptis carnibus, viribus
vitalibus etiā ob vigilias cōsumptis, exardescen-
tibus renibus, vesica, & vrina ipsa, tandē vt expe-
riatur, etiā in hanc curationē consentit; & eā etiā
ob rē maiori ex parte moriuntur dissecti. Quare
præstaret ab initio, dū vires vitales vigent, dū
corpus adhuc carnosum, & succi plenū est, dū ve-
sica adhuc mucosa materia vestrata est, nondū aut
perfricatione lapidis, aut vi calidorū medicamen-
torum, & acriū absterfa, vnde adhuc dolores non
adeo acerbi sunt; dū deniq; calculus nondum ad
magnā molē excreuit, curationē hanc tentare op-
timum artifice electo, quales hoc tēpore aliquos ex-
cellentes cognoscimus; cū enim primis ætatis meę
annis plerique ex huiusmodi curandi ratione per-
sectionem interirēt, triginta ab hinc annis eorum
maior pars superstes euadit: eorum, qui à Ioanne
Acorombono à Nurcia patre iam hoc anno vita
functo, & Ioanne Antonio filio curati fuerunt:
Quarum rerum tanquam instar omniū historiam
pulcherrimam hoc loco referre vtilissimum esse
dixi. Comes Georgius Triuultius Senator, & E-
ques, bonarum litterarum patronus, cum strangu-
ria per aliquot menses laborasset, & in canali vri-
nario carneum aliquod impedimētum persentis-
set, in illud omnis molestiæ causam referebat, vt
lapidis in vesica, quantum posset, suspicionem de-
clinaret, me semper reclamante, & maximam la-
pidis in vesica concreti suspicionem subesse asse-
rente. Cum autem aliquando ad amānissimam

Lapidis in
vesicæ vni-
ca curatio
extractio.

Lapidū ex
vesica ex-
tractorum
admirandæ
duar histo-
riar.

Sācti Floriani suæ ditionis villā secessisset, in gravissimos, & acerbissimos dolores incidit, qui cū p 40. horarū spatiū sine intermissione perseverassent, citatis equis ego accitus sū, & cū oēs subesset notā, quibus persuāderi poteramus lapidē esse in vesica salrē probabiliter, cū nullū inveniatur signū pathognomonicū lapidis in vesica; persuasi vt ad urbē remigraret, vt certā rei huius habere possemus immisso cathetere cognitionē. Aduenit, sed cū catuncula impedimēto esset, ne catheter in vesicā immitti posset, prius auferendū fuit impedimentū, & strata catheteri via; cūq; à perito illo artifice immissus esset, lapis inuentus est: Qua re cognita, vt aliquādō se ab acerbissimis doloribus eximeret vir clarissimus omnia quamprīmū parāda censuit, vt ad sectionē veniret, expurgaremus nos corpus dixit, se animum expurgaturum, ac medijs Christiano homine dignis firmaturū, & testamentū de rebus suis dispositurū. Nos diē seligeremus ad placitū se incio, & diē statuta rebus omnibus paratis accederemus, se sēper paratū fore. Omnibus ritē paratis accedimus, alacri animo nos excipit, & nos ad opus adhortatur, & se omnia intrepidē passurū profiterur; fit sectio, nulla vox querula, nullus eiulatus, adhortationes solū ad artificē, vt intrepidē negotiū perficeret, vnus primo forcipe extrahitur lapis magnitudinis magnæ castaneæ: alium adhuc superesse extrahendum artifex p̄fert, ne dubitet, extrahat, iterū adhortatur, secundū extrahit, tertiū, quartū, quintum, & deniq; sextū eiusdem magnitudinis spatio mediæ horæ, nulla vnquam querela, nullus eiulatus, celsi animi omnia inditia, sola post actionē Deo gratiarū actio. In lecto repositus, refectus de more, omnia benē

cesse.

ceſſerūt, nulla febris ſuperuenit, nulla inflammatio, nullus dolor, ſonus poſt tātas vigilias ſuauiſ, vlcus termino 15. dierū pro media parte optimē ad cicatricē deductū, ecce ea die ſuperuenit febris vehemētiffima cōtinua nulla occaſione à vulnere habita, quæ adeo ardēs fuit, introducta etiā hecetica febre breui tēpore, vt ad tabē, & extremā ſiccitatem corpus deductū ſit, in qua adeo carnea ſubſtantia cōſumpta eſt, vt etiā cutis exarruerit itā, vt extrema cuticula in corpuscula ſurfuracea per omnem corporis ambitū diſſolueretur, & excideret: cutis autē vera tanquā ſtorea tota fiſſuris diſtincta conſpiceretur, & aſpera, dura, & ſicca tāgeretur; vlcus exarruerat, & labia in calli modū exſiccata conſpiciēbātur, nulla ampliū ſanies, nullus ichor promanabat. Et cū res ferē eſſet cōclamata, & reſpectu ad has res habito, nulla ſpes ſalutis ferē ſuperēſſe videretur, cū alioqui vitales vires adhūc ſatis validæ cōſiſterent, egoq; humectātibus, & refrigerantibus calori febrili contrairē, & inſtaurantibus naturalē calorem fouerē, tum humidū ſubſtantificū optimis cibus reponerem, poſt triginta ſeptē dies à ſectiōne paulatim acer ille febrilis calor deſebuit, cutis aliquātō mollior reddita eſt; & q̄ maiore parete poteſt admirationē, maiorēq; ſalutis ſpē nobis adiecit, vlcus iā tanto tēpore aridū, & quali calloſum iterū recrudit, dolere aliquātulū cepit, mox ſanguinē emittere, mox ichorē, poſt aliquā etiā ſaniē, deinde per ſe, nullo adhibito præſidio externo ita conualuit, vt ad perfectam ſanitatē ſit reſtitutus, anno ætatis ſuæ ſexageſimo tertio, cum adhuc octuagenario maior ſanus viuat adeo litteris deditus hac etiam ætate; vt perpetuò ferē in inſpectiſſima ſua bibliotheca verſetur, perpetuò etiā

cū mortuis vivēs colluctari videatur. Admirabilē
 aliā fortasse historiā non erit præter propositum,
 si recenseā. Nobilis vir Henricus Pecchius octuā-
 genarius, cū per quindecim annos doloribus ex
 labide in vesica esset conflictatus, nec unquā cura-
 tionē per extractionē admisset, cū acerbissimis
 doloribus angeretur, ut satius mori cēset, quā
 huiusmodi tormentis perpetuō affligi; cūq; ex-
 tractum proximē lapidem trium vnciarū felicif-
 simē ab Illustri viro Casare Pagano sexagenario
 observasset, à quo ad hanc admittendā curandi
 rationem proprio experimēto erat incitatus, tan-
 dem inē acciuit; qui D. Pagani curationi adstiterā,
 se omnino experti fortunam suam etiam in illa
 ætate velle, & se aut ab acerbissimis illis doloribus
 eximere, aut ut fortem virum mori professus est;
 cū vndiq; angustias subesse cernebam, quod pau-
 cissimis diebus cū tot, tantisq; cruciatibus, vigi-
 lijs, & virium vitalium imbecillitate superuicturū
 observarem; easdem tamen vires imbecillas, æta-
 tē iam efetam, & magnitudinē lapidis tanto tem-
 pore auctam illi operationi repugnare, anceps, &
 animo dubius, quid consulerem, hærebam tamq;
 in salo, & tandem suæ voluntati totum negotium
 commisi. Qui tandem omnibus expensis decrevit
 se huic curationi cōmittere. Excisus, & extractus
 ab eodem artifice lapis septem vnciarum, & drac-
 marum quinque; & quāvis per longum tempus
 vulneris curatio tum ob magnitudinem, & dilace-
 rationem, & sanguinis multi in grumos concreti
 in vesicam collectionem; tum ob ætatē prostracta
 sit, convaluit tamen post duos menses, & per annū
 etiā supervixit; felix eo tempore, quod doloribus
 careret, quibus per tot annos fuerat conflictatus.

De Gonorrhœa.

127 **A** Deo sæpè in feminis hoc inuoluntario fluxu, & cognoscendo, & curando medicos video à recta via aberrare, vt necessariū sit aliqua etiam hac in re annotare. Cum autem morbus is ob varias externas occasiones obuenire solet, & ex congressu venereo sæpenumerò communicetur, omni diligentia inuestigandum erit, an ex lue gallica originē duxerit; an potius ob excessum in luctu, an ex congressu cum muliere, eo morbo laborante sine suspitione gallici morbi solet enim etiam communicari is morbus sine lue venerea; dissimilis enim omninò est curandi ratio, si sit sine lue illa, & si ex morbo gallico conuersus sit, simplex enim illa affectio purgato corpore refrigerantibus, & adstringentibus tolli solet; altera verò, quæ ex lue venerea pender, si ita curetur, defluvia capillorū, crustas in capite, dolores in artubus, & gummata producit, & sicut illa curari quāprimū debet, ita hæc longiori tempore finenda est: nam dum euacuatur cum semine virulenta hæc materia aliquandiu laborantes à grauissimis illis symptomatibus præseruantur. Neque prius illius rationem habere debemus, quā virulentia introducta omninò deuincta, & superata sit: tunc enim cum morbo vniuersali deuicto non cessauerit, adstringentibus superanda erit, & roboranda vasa seminalia, vt tempore debito semen contineat: ex continuo enim affluxu partes illæ retortæ natura adeo laxantur, vt ob eam causam diutius duret fluxio illa ob illam solam causam.

Seminis
pfluio in
curado di-
uerfa ratio
seruanda
Varietate
causæ

Gonorrhœa
Gallica nō
statim sup-
primenda

128 Vnde etiam cum ex diuturno seminis effluxu acrimonia, & calor materię refrigerit sæpe-

numerò, decipiuntur medici refrigeratibus in eo casu vtentes: cum excalefaciendum sit aliquando: semper autem adstringendum: in quem vsum vñ sæpè soleo decocto ex ligno lentiscino, aut ex ligno cupressi, aut decoctione mastiches, & aliorum ex aqua chalybeata, aut mineralibus aquis ex ferro.

Gonorrhœa
mutatur in
fluxum albu.

129 Decipit verò, & sæpè peritos medicos, quod cū ab initio ab externa aliqua causa excalefaciente, & laxante is morbus inceperit, ex longa autē fluxione spiritibus multis inanitis, & multo semine euacuato, & corporis habitus sit refrigeratus, & multus humor aquosus, & frigidus genitus, multaq; pituita producta, cū in primis illis remedijs insistat, omnia in deterius ruat, & augeatur fluxio. In quo casu sæpè ad contraria erit transeundū, & ijs vtendū, quæ excalefaciunt, & siccant cū aliqua subadstrictione, in quæ vsum conueniet decoctum ex Guaiaco, cū portione ligni lentiscini, aut iuniperi, aut cupressi, aut mastichis: vno verbo dicam, ea omnis curatio etiam conueniet, quæ præscribitur mulieribus albis purgamentis laborantibus.

Gonorrhœa
aliquando
curada, vt
fluxus al-
bus.

De mensium suppressione, & diminutione.

Mensibus
suppressis
curandis
quæ venæ
secundæ, in-
feriæ, an
superiæ.

130 **V**T in suppressis mensibus, vbi sanguinis missione per sectam venam opus est, semper Gal. decreto à venis crurum euacuandus est. lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 11. & 18. ita vñ hæc eadem suppressio curada est cum magna sanguinis abundantia in dubium verti video, an hæc eadem curandi ratio sequenda sit asserente Anno lib. 16. cap. 57. prius extrahendum esse sanguinem: ex cubiti vena, mox verò ex vena tali, ne affatim ad inferna ob copiam irruente sanguine magis, ac

magis

magis venæ vteri repletæ obstruerentur; quā opinionē tanquam etiam à Gal. non dissentientē sequuntur Altomarus, Trincauellius, Mercatus, & alij multi: Mercurialis autem, & Massarias, etiam summa præsentē plenitudine in suppressis mensibus nunquam censuerunt à cubito mittendū esse sanguinē, sed sēper ab infernis, quod etiā per illā sectionē plenitudinem tolli posse cum Gal. crediderint, & si qua sāgninis copia per venas vteri fertur à supernis attracta, etiam per eandem viam ad infernā attracta euacuetur p̄ infernas illas venas. Crediderim tamen ego præstare, vbi plenitudo ad vasa in corpore aceruata fuerit, illius habita ratione primò, antequā suppressionis curationē aggrediamur, secta vena in cubito, illam soluere, mox verò interposito debito tempore sectis venis in talo conueniet suppressioni mēsum opitulari; & cum prima illa non sit facta ad curationē suppressionis mēsiū, sed ad soluendā plenitudinē, hac in re non repugnabimus Gal. consenti sēper in suppressis mēsiibus curandis secandas esse venas crurum: Aetij tamen non placet sententia, quem alij recentiores sequuntur, consentis primò mittendū esse ex cubito sanguinem, mox statim ex pede, vt per primam soluaturs plenitudo, per secundam, si qua ab vtero ad superna facta sit per primā euacuationē retractio, iteūm ad consuetam viā vteri retrahatur, sic enim, & habenas equo retrahemus; & post calcitibus stimulemus, cū fieri possit, vt magis valeat secta vena superior ad impediendum, quā altera inferior ad promouendum menstruas purgationes.

Aetij sententia re-
futata in
sectione
venæ in
mēsiibus
suppressis.

Venæ sec-
tio in bra-
chio i sup-
pressionē
mēsiū quā
fienda.

131 Si quis quæ traduntur à Gal. lib. de cur. rat.
per sectam venam cap. 18. vbi in vena secanda

in talo pro curatione suppressatum purgationum
menstruarum tempus solitum euacuationis illarū
esse observandū docet, atq; per tres, aut quatuor
ante dies esse euacuandū sanguinem, diligenter
cōsiderauerit, facile intelliget, vbi plenitudo talis
ad vasa in corpore, in quo suppressi sunt mēses ad-
fuerit, non esse expectandū tēpus purgationis so-
litū ad euacuationē ex cubito faciendā, tūc enim,
& auocaretur in contrariū sanguis, & potius sup-
pressionē adiuuaremus, & in ea in cōmoda incide-
remus, quæ à Mercuriali, & Massaria proponun-
tur: sed illud præstandū erit in medio mense post
decem, aut quindecim dies à termino: sic enim, &
plenitudo tolletur, neq; consuetus motus, cum eo
tēpore nullus sit, auertētur, quod nisi Paulus Ægi-
neta intellexerit lib. 3. cap. 61. quod tamē intel-
lexisse vix fieri potest, nescio quid illi in mentem
venerit, cū in hoc morbo curando dixit non es-
se secandam venam ante præfinitum mensium
tempus, sed per decem dies post.

Mensibus
diminutis
in promo-
uendis fe-
cari potest
vena in ta-
lo antē tē-
pus morus
& in fine.

132 In promouendis mensibus diminutis licet
præceptum Gal. lib. de cur. rat. per sang. miss. cap.
18. maxime mihi probetur, vt per tres, aut qua-
tuor dies ante tempus statutum ex talo sāguinem
mittamus; sæpius tamen expertus sum magis pro-
ficere, si statutum tēpus purgationis sinamus ad-
uentare: & vbi diminutē operati viderimus natu-
ram, impetnq; ex cognouerimus defectuosam fo-
re talem euacuationem, versus finem morus ma-
nus adiutrices porrigemus naturæ, & motū illius
promouebimus, vt simul cū natura deficiente to-
tum opus perficiamus iuxta Gal. decretū 9. meth.
med. 5. quidquid hac de re alij sentiant; aliās enim
eorum opinio fuit à me refutata.

133 Obseruandum tamen aliquas esse mulieres, quæ ex missione sanguinis animo delinquant, aut maximo timore ex sectione venæ tentantur, quas præstat euacuare per sectâ venam in talo per tres, aut quatuor dies ante definitum illud tempus cum Galeno, si enim fluente sanguine sâguis mittatur, non solû non promouetur sâguis mēstruus, sed ex animi deliquito, aut timore ita sistitur, vt amplius per illum terminum effluere nō solear.

134 In promouendis mensibus secta vena in talo semper præstabit repetitis vicibus bis, ter, aut etiam quater sanguinem euacuare; quàm vna euacuatione sola totum negotium absoluere: sic enim melius sanguis ad motum incitatur, & sæpius motus facilius ad fluxum inuitatur.

135 Placēt magis sub noctem ex pede sanguinem detrahē, vt ex assiduo motu, aut statione, & humores facilius descendant, & ex motu attenuati facilius profluant.

136 Per duos tamen, aut tres dies ante abluantur crura ex decoctis attenuantibus, & aromatibus aspersis; & mox longa fricatione deorsum trahendo inuitetur sanguis ad fluxionem ad inferna, & attenuentur humores mixti sanguini.

137 Facilius etiā fiet voti compos, si antè hæc omnia aut diebus præparationis exercitijs vtatur, aut vniuersi corporis, aut saltem partium infernarum, maximè autem lumborum.

138 Præstabit autem etiam ante sanguinis missionem, si crassum, & viscidum humorem, aut sanguinem eiusdem conditionis obstructionē in vtero facere cognouerimus, prius fomentis, & emplastris regionem vteri fouere, quorum materiâ, cū prouectoribus hæc scribamur, sylua autem præ-

Mittendus nō est sanguis in quibus aut timor, aut animi deliquitū solet superuenire i missione sanguinis

Mensibus in promouendis præstat repetere sanguinis missionē.

Sectione venæ ex talo melius fit sub noctē.

Crura abluenda, & perfricanda per tres dies ante sectionē venæ.

Missionē sanguinis ex talo præcedere debet exercitiū.

Antè missionē sâg. ex talo fouenda regione vteri

diorum

diorum apud scriptores reperiatur passim, & sit extrâ nostrum propositum; apponere non opportunum esse censuimus.

Menses promouentia per os sint in multa quâtitate.

139 In decoctis menses promouentibus exhibendis hæc ad sit animaduersione, vt illorum magnâ quantitatem concedamus, vt integris viribus ad vterum peruenire possint; atq; non solum sanguinem in venis existêtem crassiorem attenuare, sed & eum, qui in vtero impactus, & obstruens impedimêto est fluxui, secernere, & subtilem reddere.

De fluxu menstruum immodico.

In fluxu mēstru immodico sanguinis missio repetita eadē die faciendâ.

140 **Q**uemadmodum in suppressis mensibus, dum repetita vtimur sanguinis missione, dictum est, præstare non eadem die illam repetere; vt modico illo temporis spatio imminuta materia, & alijs interpositis, & attenuâtibus, & attrahentibus natura melius assuescere posset ad materiam per illam partem de more euacuandam; ita e contra in reuulsione hac ab vtero per supernas partes bis, & ter eadem die repetendum censerem, quod, & euacuatio sanguinis vrgeat, & retracta quam primùm materia fluxio citius sistatur; neq; tempus intermedium necessarium sit concedere, vt in suppressione ad parandam materiam.

In mēstru immodicis quandoq; purgandū.

141 In hoc affectu video multos veteri vsum medicamentorum soluētium, quod deorsum latus humor biliosus, ac commotus, vnde sæpè is morbus prouenit, ad vterum etiâ feratur, aut compressione, quæ in egerendo humore fit, venæ dehiscant magis, atque magis profundatur sanguis: quoniam tamen per eam partem euacuatio aut reuulsiva est, si fluentis ab hepate aut à liene, vel

à toto

à toto materiæ motum considerauerimus; aut deriuatiua, vbi aut ab acri, & calido per admixtionē bilis sanguine fiat, aut à seroso, aut pituitoso, optimum semper erit expurgato ab ijs excrementis sanguine minùs fluxilè reddere, minùsq; acrimonia irritantem, illumq; reuocare à parte, ad quam fuit, quòd si aliquod incommodum ex motu eueniat, aut compressione musculorum ventris inciderit, cum breuissimum sit refarcitur, & reuulsione, & humoris irritantis euacuatione.

142. Sint tamen medicamenta hæc aut per se cum aliqua adstrictione, aut adiectione adstringentium aliquorum.

143. Rhabarbarum in hoc casu fugiant medici, quia, & si adstringentes aliquas partes habeat, potissimum si non multum maturum fuerit, quoniã tamen in qua tota illius soluendi vis in igneis, & tenuissimis partibus posita est, quæ facillimè venas peruadunt, & etiam sanguinè suo colore tingunt, & ea ratione acutiem illi addunt, & calorem, cum tot alia, & simplicia, & composita supersint, satius semper duxi ab illo abstinere; potissimum cum ab alijs datū obseruarim multa in hoc morbo attulisse incommoda.

144. Post huiusmodi remedia ex ratione facta cum ea, quæ aut incrassanti facultate, aut adstringenti maximè conueniant, vnū in præsentia omitte'dum nullo modo esse censui, quo infinitas prope modum mulieres ab hoc morbo liberaui, inter secretà aliquandò reseruatum, post adolescentibus qui sub nostra tutela ad præxim medicam addiscendam exercentur, etiam cōmunicatum, nūc omnibus ad cōmunem vtilitatem, cōmune factū: quo ferè nunquā frustra vsus sū, modo exulcerato aliquo

Medicamē
ta in cū ad
strictione.

Rhabarba
rū in men
sibus super
fluis noxiū

Remediū
præstatif-
imum ad
superfluos
menses.

aliquo vase in vtero fluxus is menstruorū aliquam non habeat occasionē: est autem omninō Euporiston, & facillimē parabile. Recipit autem aquę libras septē, in qua incoquo cortices triū auratiōrū acidorū aliquantō adhuc subturidium, & illas in phyliras incido, & excoquo ad duarum partiū cōsumptionē, & facta colatura yncias nouē vel octo potandas manē do: quōd si valentius medicamentū parare hoc ipsum volo manipulū herbæ pilosellę in fine excoquendū addo; validius adhuc red datur si in aqua villensi decoctio fiat, aut si in octo libris aquę fiat, vbi duę tertię partes per coctionem absumptę fuerint, & excolatū reliquum chalybe indito ignito sæpius adhuc magis roboretur.

De albis per vterum purgamentis.

Boethi v.
xoris albo
profluuo
laborantis
historia ex
plicata a
Gal. lib. de
præcogn.
ad Posthu-
mum.

145 **C**VM illud mihi semper sit persuasum in hoc morbo vterum non laborare per se, nisi cum ex longo defluxu etiam pars ea, aut laxatur nimium, aut refrigeratur, aut etiā aliquandō ulceratur, sed vel à toto corpore, aut à vètriculo, aut ab hepate, aut etiā à capite materiā illā transfundi, laudare satis non possum quod Gal. lib. de præcogn. ad Potthumū maximē necessariū esse duxit, ut aut totius, aut partis laborantis, & transmittentis rationem habeamus, nec sufficere humores diuertere, & euacuare, & per aluum, & per vrinas ut fecit eo loco Gal. qui non solū diureticis assaro, & apio, & hydragogis vsus est, sed longa, & forti fricatione, cum nō ab hepate, aut à vètriculo tumor ille ventris inferioris, & fluxus aquosus per vterū originem duxerit, sed ex refrigerato nimium, & humente habitu corporis, & potissimum carnibus

bus partium infernarum, vnde per longam, & validam fricationem, & simplicē, & cum melle cocto non solum reuocabatur ab vtero serosa illa affluens humiditas, sed incalescebat habitus corporis, & ita siccabantur carnes, vt sanguis ad oppositionē, & renutritionē transmissus non amplius re-
 crudesceret, aut in pituitam, serosumue humorē abiret; sed nutrirer, sicq; optimē nobilis illa matrona conualuerit: non igitur oportuit alia etiam adhibuisse, & exhibuisse præter ea, quæ tradidit co- libro ad auferendā intemperie à toto, aut parte, vt censuit doctissimus Massarius meus, cum nō alia pars laboraret: vndē excalefacta, & siccata, parte ne denuō materia generaretur, satis fuit, genitam, & per aluum, & per vrinas ab vtero reuocare; quōd si assato, & apio vsus est ad ducendam materiam per vescicam; quæ tamen etiā per menses, & vterū solent euacuare; non videtur mihi reprehendēdus, qui noua generatione humoris inhibita recta victus ratione potissimū potus parsimonia, & sublata intemperie à parte laborante non aliud habebat, quod faceret pro ea curanda, quā genitam iam aquā euacuare, & à parte, ad quam tota ferebatur, deriuare: nēpè hydragogis per aluum, diureticis per vescicam, & ijs quidem, quæ simul menses prolicere possunt, qualia esse assatum, & apium docuerat 5. & 8. de simpl. med. facul. vt etiam si qua excrementa pituitosa, & serosa in vteri venis, & vtero ipso residerent, aut ob crassitiem retinerentur, ne aut corrumperentur retenta, aut intemperiem in vtero inducerēt, tandem etiam quamprimū expurgarentur.

146. Ex qua curandi ratione illud primò colligendum est, non hac sola via incedendum esse in curan,

Albū profluuiū sæpè curādū diuersa ratione à tradita à Gal. lib. de præcognos. ad Posthumū

curando fluxu muliebri: alia enim via incessisse, & alios medicos Romanos, & Galenum ipsum ex Hipp. & optimis quibusque medicis antiquis desumpta constat ex capite illo: mirabile autem postea Galenum sententiam postquam inuncta stomachi regione ex vnguento nasdino præcordia persessit frigida, & humida, ac mollia, non secus quam lac coagulatum, nondum tamen in caseum cōcretum, ut ex historia illa tradita lib. de præcogn. ad Posthumum cap. 9. colligitur.

In Arena marina laborantis sepelire malū, & contra Gal.

147 Hinc etiā erroris arguendi sunt, qui procurando eo morbo mulieres in calida maris arena sepeliendas ex Gal. decreto censent: cum tamē Galenus fateatur apertē, & cæteros omnes medicos, & seipsum non sine errore hoc remediū attentasse: ut magis ij. sint deridendi, quæ etiam in fluviāli arena soli æstiuo nudas mulieres exponentes, ac demergentes tentarunt morbum hunc euincere.

Albi profluuij vera curandi ratio.

148 Curari igitur poterunt similes morbi deriuata, & simul euacuata materia per vias secessus hydragogis, & diureticis per vias vrinæ eo modo, quem docuit Gal. cap. illo nono lib. de præcogn. ad Posth. Inter hydragoga nostro tempore primum sibi locum vendicat Mochiacani radix, & si aliqua admixta sit bilis xialappa, tūm, & Elateriū cum pilulis alephanginis, succus ireos syluestris potissimum, soldanellæ decoctum, & alia aut ex ijs, aut similibus composita. Præstantissimum vero, & præsentaneum remedium sunt aquæ Thermalens falsæ, ut Lettuciana, & similes, quod per vias secessus humiditates deducāt, & per hanc viā naturam assuescant eisdem transmittere: Incassum tamen hæc omnia fient, nisi partis generantis hos humores rationem habuerimus; aut si à to-

to generentur, totius: propterea in vsum ea ducen-
tur, quæ intemperiem partis aut totius tollere pos-
sint, puta si frigida, & humida fuerit, quod sæpius
euenit, aut ventriculi, aut hepatis, aut totius exca-
lescentibus, & siccantibus conabimur euincere;
commodiora autem hæc erunt, si, dum hoc presta-
mus, auocare ab utero materiam possimus, & in
contrariū tractā euacuare, vt sudorificis potissimū,
si à toto ad uterū transfundatur; in quæ vsum ma-
ximè cōmendari solet decoctū Guaiaci, aut si in-
terperies hæc frigida, & humida iecur etiā attigerit,
quod ex radice, vel ligno sassafras paratur, ex quo-
rū exemplo quàm plurima alia proponi possunt.

149 Animaduertendum tamen nō semper aut
serosum humorem, aut pituitosum peccare; neque
semper hunc esse expurgandum, neq; semper cali-
dis corrigendam esse causam efficientem: aliquan-
dō enim etiam biliosa esse solet fluxio, & ab intem-
perie hepatis calida fieri, quod suis signis cognos-
citur, & tunc, & talis intemperies erit corrigenda;
& per suas vias genita materia biliosa erit ab utero
ad secessum corriuanda.

150 Hinc communis error, & muliercularum,
& barbitonorum, quin, & indoctorum medico-
rum omnino erit fugiendus, exhibētium adstrin-
gentia, quæ nullo tempore, nullaue occasione vn-
quam in vsum venire possunt, vt optimè etiam an-
notauit Aetius lib. 16. cap. 66. adstrictis enim locis
aut nobiliora membra inuadent molesta illa ex-
crementa, aut retenta in malum habitum, aut hy-
dropem laborantes ducent.

Purgamē-
ta mulie-
bria nō sē-
per frigida
neq; cali-
dis curāda

In albis
fluoribus
adstrin-
gentium v-
sus
omnino
fugiendus.

De ueri Praefocatione.

Praefocatis
ex reten-
to semine
odoratis
vulua non
in iungen-
da.

151. **V**teri praefocatio, ut morbus, est pernicio-
sus, ita cum solis mulieribus, & sepe ex im-
proviso adueniat, curatione ferè ex sola sibi asci-
perunt, ut inde quam plurima errata introducta
esse non sit metum. Inter quae illud primum locū
obtinet, quod in suffocatione matricis, ex retento
semine in maturis virginibus, & viduis internas
vulua partes inungunt odoratis oleis ex zibero,
mosco, & similibus, aut pessaria talia imponunt,
quibus licet ob suauem odorem uterus supernas
partes petens deorsum alligatur, quoniam tamē,
& nullatio excutatur, & appetitus veniens moue-
tur, quasi in furorē virgineum concitatus mu-
lieres, & a compressionē diaphragmatis retracto
uero in proprio loco extensus quasiurgente ma-
teria vnde quāq; mouetur, ac symptomata prope-
modū indicibilia producit laeso cerebro, & corde;
hinc cordis palitationes, & syncope; hinc pulsū
deperditiones: hinc demētiā laeso cerebro, con-
uulsionē omnium partium, conuulsionē, & similia.

152. Quare praestaret suaves illos odores coxis
in parte interna propè pudenda alligatē, quā in in-
terius producere, si a beneficio suavis alēntiae frueren-
tur, nec in illa tam magna incommoda inciderēt.

153. Nunquam faciem frigida in tali casu e-
sperant.

154. Minus autem odoratis aquis.

155. Quinimò ne vino quidem facies erit ab-
luenda.

156. Quamuis. n. vini non nihil vi etiā adaper-
to ore infundi possit, cū Hipp. lib. de morb. mul.

si

o

cum

cum tamen eodem tempore malevolentia naribus
ad moueat, vino faciem lauandam non esse docet.

157. Titillationes aut digito medio imposito
& perfricando os vteri, aut alijs instrumentis, va se-
mine excreto subleuetur mulier, à Christiano ho-
mine, omnino ablegentur.

158. Quam etiam ob causam pessi illi ex alijs
ligno, aloë, caryophyllis, zibetto, & similibus para-
ta, licet discutere flatus vteri valeant, quia & se-
men promouere, quoniam tamen contigine ma-
ximam promouet, & satyria sim saepe inducunt, in
hac suffocationis specie ex retento semine non ita
rursus in vsum duci possunt.

159. Cerata ex tachamacha, caragna, chalybano,
& similibus vt in hoc morbo ex retentis menses
ob crassitiem, aut putrefactis non refrigeratis, ex-
crementis, ac ex flatribus à propria sede dimouen-
tibus proficua sunt, ita vbi ex femine retento, &
putrefacto ortum duxerit, non ita secura erunt, ni-
si cum extinguentibus semen, aut refrigerantibus,
& siccantibus, vt est agnus castus, & corallium ali-
quid adiungamus.

160. Scio multas, quod vterus descendat, vt in
loco proprio retineant, ne hysterici affectus exci-
tetur huiusmodi ceratis ex tachamacha vti, in vm-
bilici autem cauitate imponere duo, aut tria grana
mosci, sed quam felici successu ipsæ viderip: ex ca-
lore enim corporis, & lecti eleuatis bene oleui-
bus vaporibus saepe in præfocationes incident.

161. Cucurbitule vt infernis partibus vt suris, &
coxis, quin & ipsi pubi apposite proficiunt, ita regio-
ni vmbilici applicite maiori ex parte obesse solent.

162. In ea verò, quæ ex retentis menses con-
tinetur, potissimum si plenitudo subsit, ventri quo-

modo

Q 2

modo-

le ostentibus
arib: ap:
pobis: m:
Titillation
nes: in: præ
focatis ex
tamine re
centibus
pessi: ad os
rati: in: præ
focatis ex
tamine rel
tendi: &

Cerata ex
caragna:
chalybano:
& c: in: præ
focatis ex
tamine nō
obtemperat

159. 20. 12

215. 10. 12

Mus, ma-
sci in vm-
bilico præ
focatione
gignit.

Cucurbi-
tulæ i præ-
focatis vbi
affigendæ.
Cucurbitu-
læ in præfo-
catis vteri-

apposita,
si ex reten-
tione menses
male.

Præfocatis
quæ licet in
paroxismo
secare venâ
Præfocatis
quæ nō licet
secare venâ
Præfocatis
ex flatu cu-
curbitula
magna vti
liss. Cucurbitu-
la magna
ventri ap-
plicanda cū
paucis igne
Sit ex per-
foratis.

Diū non
adhærebat

modocūq; appositæ noxis affertur immedicabiles
163 In ijs, etiâ in paroxismo, modò cor nō op-
presserit, & vitales vires deiectæ non sint, licet ex
talo sanguinem detrahare, sed in minori semper
quantitate.

164 Verū cū sæpenumero habitus corporis to-
tus refrigeretur, nō solū in paroxismo, sed etiâ post
maxima adhibenda est diligentia: nā licet suppressi
menses præcesserint, quin, & magna plentitudo, ve-
hemētia tñ symptomatū efficit, vt refrigerato to-
to, & viribus debilioribus factis ab ea sit abstinendū.

165 In ea autem, quæ ex flatibus originem du-
cit, cucurbitula magna umbilici regioni applica-
ta, vel inter umbilicum, & pubem præstantissimū,
si quod aliud remedium, esse solet.

166 Hac tamen cautione, vt aut ex aqua calida
applicentur, aut cum non multo igne potissimum
in propinguibus mulieribus.

167 Sint ex ijs, quæ perforatæ sūt in samitate.

168 Diutius non permittantur adhærere, ne
impedito tranſitu spirituum pars subiacens in gā-
grenam ducatur, quod aliquandò vidi.

De ijs quæ ad partum non naturalem pertinent.

169 **N**ON is ego sum, qui populares errores
gravidarum, obstetricum, mulierum, &
medicorum in partu naturali, præter naturam,
demortuo foetu, secundis retentis, & alijs, ad hoc
negotium pertinentibus recensere velim, quod
& id præter meum institutum sit, qui exceptiones
potius regularum, & singularia quidam à paucis
animaduersa, quam canones hoc libro cōprehen-
dere decreui. Potissimum cum libris ad hanc rem
solum

solùm attinentibus doctissimi vici Iouertus galli-
ca lingua libro scripto, & Scipio Mercurius, & in
libro obstetricis, & in erroribus popularibus oïa
ferè comprehendunt, in quibus circa rem hanc
sæpè peccare solêt, & mulieres, & vulgus medico-
rũ. Canones verò curationũ omnĩũ morborũ mu-
liebriũ diligētissimè prosecuti sũt præter antiquos
patres nostros Græcos, Arabes, & Latinos, ex recē-
tioribus Mercatus, Mercurialis, & Massarias: solũ
aliqua attingam ad munus susceptum attinentia.

Primò animaduerto, & frequētia experiētia ob-
seruauit nō esse temerè credendũ obstetricibus, aut
astruentibus grauiditatē, aut negantibus, vbi agi-
tur aut de promouendis mensibus, aut de socanda
vena, aut purgando corpore ob vrgētē aliquem
morbū, sed medicus diligētiā suā adhibeat,
coniecturis agat, has cum dictis obstetricum con-
iungat, & suspensio semper pede in re admodum
iudicatu difficili incedat, ne si dicta solũ obstet-
tricum, aut mulierum sequatur, nimis securè ince-
dens abortum inducat, aut remedijs destitutā
languentem sinat.

170. Si vnquam tamen in similibus casibus ape-
riēdi sunt oculi, tunc sanè quā minimum obstet-
ricibus est credendum etiā iureiurādo asseren-
tibus, cum mortuum esse fœtū testantur, & valen-
tibus medicamentis excludendum persuadent:
cū sapenūmērō multas viderimus, à quibus fœ-
tū tanquam mortuum aut excludendum, aut, q-
peius est, fœtamentis extrahendum esse cēsebant
obstatrices, & sub sua, vt aiebant, conscientia iura-
bant, quæ non itā multò post viuum, & bonè valē-
tē fœtū pepererunt.

171. Vt autem non itā facilè credendum est ob-

Obstetrici-
bus nō te-
merè cre-
dendũ, sed
medicus p-
prio iudi-
cio dicta
illarũ ex-
pendens
agat.

Obstetrici-
bus asserē-
tibus fœtū
mortuū nō
temerè cre-
dendum.

Partus non-
pro adiu-
uandus a
medico ob-
preces par-
turie nū-

sternitibus, ita aures non sunt præbenda parturienti-
bus, quæ difficultate partus fracta, & acerbitate
dolorum commota præcibus instanter effragitant
a medicis, ut manibus adiutrices porrigant, pulve-
res decocta, & aquas si illas porrigendo, quibus
sape fit, ut infans aut occidatur, aut sit citata natura
suppus doctum in tenera ætate aut acerbis ex-
cludatur, aut exclusus ante tempus a natura consti-
tutum non seruet naturalem situm in excedendo.

172. Ob transplacem causam, cum partus adest
necata difficultas, laxari potius, & emollien-
tibus res erit intelligenda, quam illis, quibus uti sole-
mus ad expellendum foetum mortuum, aut secundas.

173. Quod si ex illa hæc est veniendum; placida
semper uti videri duci debebunt; ne dum par-
turientem adiuuare velimus, & ipsius infantis ex-
clusionem, ipsum, aut etiam matrem occidamus.

174. Oleum amygdalarum, quod a nostris mu-
lieribus post partum passim exhiberi video, neque
semper, neque cuiusquam convenit: ubi enim com-
munes fluxerint, neque vehementes ad fuerint
dolores, aut superuenire consueverint, non ita ex-
tatione exhibeantur, sæpe enim subsequuntur subuer-
siones ventriculi, & alius aliquando exitus: pri-
us in partu itaque, ubi convenit, quod dolores illis su-
peruenire non soleant, neque explorata habea-
mus quantum fluere velit materia.

175. Si superuenierit febris, aut inflammatio
aliqua nunquam a superioribus venis extrahendus
erit sanguis, quicquid alij sentiant, ne retrahantur
purgamenta, sed ab infernis semper erit euacuan-
dus.

Partus non
difficili
momenta
fetum, aut
secundas
pe proxima
Fetum exclu-
dentibus, ut
utendum.
Oleum amy-
gdalarum a
partu neque
sæpe, neque
quibusvis
conuenit.
Febricitan-
tibus a par-
tu nunquam
mittendus
sanguis a
superioribus
partibus.

dum est materias illas euacuare, & fluxionē à pedibus auocare, id verò aut vomitu, aut medicamēto expurgāte; sic enim si serosa fuerit materia, qđ frequētissimū est, aut biliosa, calida, & subtilis, in principio, & reuocabitur, & euacuabitur, aut saltē imminuetur; aut si crassior fuerit, cū se per à tenui ad morū adiunetur, saltē imperū fluxionis refrangemus. Quod si laxitas, & imbecillitas articulorū sit causa fluxionis; itā vt leui quacunq; quantitate materie in corpore collecta ad illas partes naturā reteratransfundere, & se se exonerare, dato medicamēto purgante, & fluxionē concitabimus, & naturā imbecilliorē reddemus; hæc verò discernemus ex signis exuberantis materie, vt puta ex grauitate capitis, vbi sepius scimus aggregari materiā, & inde defluere, aut aliarū partiu; vt ex signis debilitatis articulorū facilius autē discernemus, an purgāte medicamento vtendū sit, an abstinendū ex experimēto facto: si enim semel, aut iterum tentata purgatione, & ingrauescant dolores, & diutius perdurent, ab illa in posterum abstinere oportebit; si autem melius se habuerit, aut saltē breuior factus sit morbus, omninō intrepidē erit corpus purgandum.

Purgatio
ī podagra
cum faciē-
da est, sta-
tim faciē-
da.

177. Cū verò si purgandum est, in principio id faciendum sit frustra preparatur syrupis materia, cū nec putrida sit, vt coctione indigeat; sit autem aut serosa, & tenuis, quæ statim expurgari potest Gal. magistro lib. quos, & quando purgare expediat, aut sanè biliosa tenuis, non putrida, quæ facile expurgatur, nec coctione indiget, qđ sit sine putredine: cū tamen crassa aliquandō super sit, preparari poterit, & attenuari, vt facilius, si non resoluitur per insensibilem euaporationem, euacuari possit.

Mis.

178 Missio sanguinis per sectam venā, vt maxime laudatur ad præcæuendam podagram, si verè vel Autumno fiat, vbi corpus multo sanguine sit refertum, & ad eandem curandā, si humores mixti sint cum sanguine, ita si serosi fuerint humores, & frigidi, & si à partibus externis capitis defluat materia, frustra tentatur tale remediū, quod habitum corporis refrigeret, & huiusmodi humori præstet occasionem.

179 Quin vbi frequentius huiusmodi podagricæ accessiones homines inuadūt, sæpiusq; aliquem affligerint, nisi summa adsit plenitudo, qualis in ebriosis, & vinosis aggregari solet, huiusmodi remediū erit omittendū, quod crudis humorib. tunc det occasionem, habitum corporis refrigeret, nec cursum humorum extra venas cohibere possit.

180 Repellentia quamuis passim in principio, euacuato tamen prius corpore, aut sanguinis missione, aut purgatione commendetur à Gal. Actio, Paulo, & cæteris, ausim tamen affirmare rarò tunc in vsum duci posse; si enim dolores vehementes articulorum nō prius mitescunt, quàm vbi materia illa maxime calida ad externa prolabitur tumorem, & ruborem in parte excitans, quomodo repulsa refrigeratis externis partibus non morbo occasionem augebit exitum impediens? quod si adstrictio repulsiōi iuncta sit, magis etiam lædet; sed verò iam ex parte fluxa materia dolorem excitans non ne etiam si refrigerata dolor imminuatur, crassescet magis, magisq; impingetur, & subinde contumaciorem morbum efficiet? non nisi igitur seuissimis doloribus omnem ad se curationem trahentibus veris repellentibus vtetur, frigida, aceto farinis admixtis, psyllio, lenticula palu-

Podagricis
quādo san-
guis mittē-
dus, & qū
non.

Podagra
frequēter
infectatis
rarò san-
guis mit-
tendus.

Podagra
laboranti-
bus repel-
lentia ræ-
rò conue-
niunt, &
cur.

stri ex aqua, & aceto, & similibus. Securius est oleum rosaceum, quod vocat completum, quamvis enim refrigeret, & aliquo modo repellat, vitamen olei laxante transpirationem non impedit, neque partem constituant adstringit: quare prestat a nodis his vi lacte cum rosaceo, vitellorum eum eodem facto cassia fistularis ex oleo rosato, vel amigdalino extracto, & similibus.

In podagra oleum salinum in fine optimum.

181. Quoniam autem ex curandi ratione har magis tunc articuli aliquo modo laxati redduntur, placet ex Gal. precepto 2. simpli med. facul. c. 18. & Aetij articulos post podagram oleo salito, aut simplici, aut rosaceo completo perfricare, omnibus enim ait Aetius, qui hoc modo fricantur, infirmitas dolor augetur, quod preter naturam est, discutitur, rescrementa quoque consumuntur, & affecta membra redduntur robustiora, ut amplius eorum doloribus non sint obnoxia.

Oleo salinum ante declinationem malum in podagra.

182. Anniaduendum autem est nequaquam vitendum esse doloribus urgentibus, cuius enim consipatione aliqua facta vehementiores redderentur dolores, maiorque humorum ad locum fieret attractio, quin, & eorundem, & vaporum impa-

Oleo salino inungere non facit, sed perfricare oportet.

183. Quare conuenit ut dolores remissi sint, aut quando inchoant: tunc enim frequentissimus illius esse debet usus Aetio testis ex phylagrij sententia, & apud Iulianum usus id docet.

Sal quomodocumque admiscetur, si sal oleo non liquatur?

184. Non sufficit autem inunctio simplex, sed perfricandi erunt articuli oleo illo salito, ut salis vis terrestis, & crassa altius penetrare possit.

185. Quoniam autem sal oleo non liquefit, & salis munda olei imas partes solum attingunt, & vix falcido oleo communicatur, soleo ego sale maritimo subtilissime in vini calidi leuissima portione paula-

paula-

patulim colliquare; mox salern illum colliquatum assidue spatula cum oleo agitare, & sic oleum sal sedine contrahit: vel in subtilissimū pollinē salē contritum, & oleo admixtum semper antequam in vsum ducatur, diligenter concutiemus.

De morbo Gallico.

185 **I**N venerea hac lue curanda multa sanè annotare poterò, cum illud verè affirmare auserim, post delatum à nouo orbe ad nos hunc morbum, me fortasse multò plures hoc morbo laborantes curasse, quàm quiscquam alius, quòd præter innumeros in magna hac vrbe passim curatos per quadraginta annorum spatium magni illius Hospitalis Brolij, in quo solus morbus curatur, & sepe numero verè solò septingentis qua decoctis, qua inunctionibus, & suffumigijs curatio adhibetur, reliquò verò tempore saltem ducenti ex viceribus sèper curantur, purgato diligèter corpore, & multis etiam, & puluisculis, & electuarijs, alexipharmacis præterea exhibitis, curam in adolescentia mihi demandatam semper retinuerim, & adhuc in hac ætate retineā ob multas causas. Tum potissimū vradolescētes, & nouitios in hoc morbo curādo possem exercere. Vnde etiā anno præterito multis postulātibus, diebus, quibus à moratibus, & pollicitis ijs meis lectionibus vacare concessum erat, pluribus sermonibus totam hanc de lue venerea tractationem comprehensus sum. Ex quibus aliqua, quæ in curatione huius morbi singularia occurrunt, excerpta hoc loco annotanda mihi sumpsit.

Primò igitur illud annotandum non eandē esse

Gallici morbi curationis auctori quomodo frequenter, & in ea multa obseruare potuerit.

cura-

Gallici
morbi cu-
rō diuersa
morbo vix
inchoâte,
& agresso.

curatiōem huius primis diebus communica-
ræ, & vbi aliū radices egerit, sed & quam hepar
sēper censui, occupauerit; sæpē enim mala illa qua-
litate mediante recremento aliquo superficiali pe-
nis, aut fēminæ pudendi cōmunicata externas so-
lū partes occupat vlcusculo carioso, aut similibus
excitato, quo exsiccantibus curato aliquandō pe-
nitiores partes non attingit, qua occasione neque
mittendus erit sanguis, neq; purgandum corpus;
ne, quæ externis partibus solis adhæret contagio,
agitata magis diffundatur, magisq; ad interna tra-
hatur, vnde verē morbus contrahatur. Neq; verō
timendū est, ne contrā medica præcepta agamus,
quibus cauetur, ne vnquā localibus utamur, ante-
quā vniuersum sit inanitū. Id enim verissimū est
in morbis à causa interna oriūducentibus, nō au-
tem in ijs, qui ab externis, nā in morsu venenato-
rū animalium omninō ad externa euocamus, sisti-
mus, ac ad cutē trahimus, deniq; non purgamus;
vt cōmodē in scabie recenter contactu communi-
cata, in qua sæpissimē citrà purgatiōē cuti emen-
dandæ, & scabiei tollendæ solūm insistimus.

Bubonib;
nō excun-
tibus non
multainge-
rēda, neq;
quibusuis
vescendū,
cōtrā Em-
pyricos.

186. Neq; tamen placet, quod ab Empyricis pas-
sim cōmendari video, vt indistinctē quibusuis ci-
bis, & cuiuscunq; conditionis utantur, multa q; pas-
sim ingerant, potissimūm vbi bubones appareant,
nec itā faciliē eleuentur; quomodo enim naturam
opitulantem ad expulsiōem habebimus, aut ad
sui cōseruationem, si illam multitudine ciborū,
aut mala qualitate obruemus.

Gallico
morbo in-
choâte, &
bubone
vix appa-
rente te-
nuis victus
malus.

187. At ne inedia etiam macerandum est cor-
pus, ne internæ partes alimēto debito destitutæ ab
ambitu corporis, & externis partibus attrahant.

188. Exercitium; quod alij iniungunt potissi-
mum

num in bubone promouendo, vt non possumus non commendare, ita si excedat, sapè officere potest apertis nimium meatibus, & exhaustis internarum partium spiritibus, qua occasione virus externum sapè ad interna remeat: quinimò si ab exercitio sudor promoueatur abstergi debet, ne apertis meatibus cumcrementis qualitate mala infectis remeat, & interna inficiat.

189 At verò ne decipiamur, diligenter in carie apparente obseruandum est, si à congressu venereo per quatuor, aut quinq; dies caries illa apparuerit, an potius progressu temporis: si enim primum illud euenerit, signum erit ortam esse ex sortibus comunicatis, & tunc nulla præcedente corporis vniuersali euacuatione, exsiccantibus solum totum negotiū transigemus; si verò ex labe hepatis comunicata illud fieri iudicabimus, tunc euacuato corpore, alexipharmacis rem absoluemus.

190 Sic, & in Gonorrhœa procedendum: aliquando enim à cōcubitu statim euenit valida existente natura, & statim propellente per eam partem virulentiam contractam: & tunc nullo modo per multos dies erit cohibenda, sed sinenda: subluendum solum quod adhæret. At progrediente tempore si non desinat, aut si nouum aliquod symptoma superueniat, iam prouidendum est sedi, & euacuato corpore alexipharmacis edomare vim morbi, vel potius malam qualitatem tentabimus.

191 Idem in bubone apparente: si enim primis diebus apparuerit, quoniam robur arguit facultatis propellētis tuam illam ad ignobilem partem, omnino actio illa erit adiuuanda, nec purgatione, aut sanguinis missione euacuandum erit corpus,

Gallico morbo inchoante exercitum validū sapè, malum

Carie gallica appa-
rere, quomodo transigenda curatio.

In Gorno rheç curatione quomodo procedendum.

Bubone gallico apparente quomodo procedendum in curatione.

ne

ne remouemus naturam à motu illo: & sæpè talem euacuatione aperto bubone totâ vim morbi edomasse constat, omnemq; virulentiam euacuasce.

**Bubone in
continuo
aliquando
purgandû
corpus.**

192. Obseruatum tamen est aliquando tanta mole humorum premi naturam, & adeo crassam, & contumacem esse materiam, ut, quamuis aggradiatur natura, tale opus succumbat tamen oneri, nec ad glandularum locum possit materiam totâ propellere, inchoatumq; opus relinquat, in quo casu sapissimè expectus sum subleuata natura à mole, & sarcina, euacuatò corpore feliciter omnia celsisse, tumorem in debitam mensuram esse eleuatum, & materiam duram, & contumacem ad suppurationem esse deductam.

193. Vbi virulenta hæc qualitas sedem iam occupauerit, & morbus gallicus iam factus sit, radicemq; iam egerit, sedomari illa debet, atq; alexipharmacis euinci: expurgari autem ante corpus debet, sed non ab initio, sed lenientibus agendum, ut enim ij humores, veram coctionem non admittant, sed in eo genere sint, ut solum præparari ad euacuationem debeant, cum lenientibus, & abstergentia sunt adiungenda, & aliqua etiam verè purgantia, sed in minori quantitate, & hæc verè sunt minorantia.

**Gallico
morbo p-
gresso pur-
gandum.**

**In gallico
morbo in
principio
lenientibus
abstergen-
tia, & pur-
gantia ad-
iungenda.
In Gallico
morbo va-
lidis pur-
gantibus
agendum.**

194. Quia si in aliquo morbo, in hoc maxime validioribus est agendum, tum quod sæpè rebellis, & contumax est materia, puta lenta, & viscida, & sæpius adusta, tum maxime quia, cum per externa præcesserit, & iam bona ex parte extra venas ad carnes, & solides partes peruenierit, non potest nisi validis medicamentis adigi.

195. In decoctis prædilatis syrupis, aut in symplicis varijs pro varia materia, cui potissimè in-

fidet virulētia illa semper ad miscendū erit aliquid ex ijs, quæ alexipharmaca facultate virulentię illi aduersari possunt, atq; illam edomare; Guaiacum, salza Patula, china, aut saponaria; ex quorum usu sepius expertus sum post repetitam purgationem, & multos assumptos syrupos adeo imminuta fuisse accidentia, vt multi se iam conualuisse censes cætera auxilia respuerent; & nisi admonuissē refractam solū esse vim morbi, non conuulsam, vix alia auxilia amplius admisissent.

196. Postremum quod in purgatione reperita sumitur medicamentum, placet esse in forma solida, qualia sunt sub pilularum forma; quod & a longinquioribus attrahant, & si qua a medicamentis, aut syrups commota sint recementa facilius possint educere.

197. In repetita præparatione humorum laudo admiscere syrupos compositos soluentes, vt. syrūpum Montani, de fumaris compositum, de polipodio, de cicorea Nicholi, vel Guglielmi, pro varietate materiæ, quidquid dicant recentiores, & potissimum Massariæ doctissimus; neq; enim impeditur cecitio, quæ nullibi in tali materia expectatur; sed paulatim præparatam materiam, cui virus insidet, euacuamus.

198. Quinimò ubi maximam superesse adhuc materiæ copiam cognouerimus, optimū esse censeo antequam ad vera alexipharmaca veniamus, potissimum autem ante inunctiones, aut suffumigia, puluisculis, aut confectis ex soluentibus paratis sena, Mochiacano, xialappa, turpeto, hermodactilis, & similibus pro varietate materiæ exhiberantis, addita æquali ferè ad omnia quantitate, Sarza Parilię puluerizate exhibitis materiā illam

immi-

In syrups
p morbo
gallico ad
denda alexi-
pharma
ca.

Pilulæ in
fine purga-
tionis in
morbo gal-
lico præfe-
rendæ.

Syrupi sol-
uentes in
morbo gal-
lico comē-
dandi.

Puluisculi
soluentes,
& electua-
ria in gali-
co morbo
comendan-
tur.

imminuere; ut quæ reliqua erit, aut per sudorem propelli possit; faciliusq; virulentia per vniuersum corpus dispersa edomari, atq; euinci; aut si per os expurganda sit, peculiari argenti viui facultate mole sua non suffocet, aut grauissima illa, quæ aliquando solet, symptomata non inducat.

Guaiaci species in morbo gallico quæ fugienda.

199 In decoctis ex ijs paratis, quæ alexiteria facultate, & antipathia quadam virus illud euincunt, & ex corpore pellunt, quæ ex Guaiaco paratur, primò veniat considerandû: illudq; primû animaduertendû non esse illud in vsû ducendû, quæ annosû est, nimis crassos truncos habens, atq; per oia vetustatē redolēs, quæ passim Empirici faciunt, ut acrimonia illa perfectionē medicamēti arguētes ægris suis imponāt. Cū calor naturalis in tali ligno iā ferē sit asuptus, & vis eiusdē efeta reddita, humidū substantificū, & oleaginosa pars absumpta, aucta siccitas, siue potius ariditas sine pinguedine: nam ob has causas cū multas partes terrestres decoctū tale habeat, nunquā clarescit, & terrestres illę partes cum austeritate quadam acres etiam persentiuntur.

Guaiaci trunci iuniores inualidi.

200 Neq; tñ etiam truncos illos minores laudo: minimus enim illis inest vigor: & calor humiditate superflua hebetatur: & facultas illa à tota substantia tanquam in infante est imbecilla.

Guaiaci species facoris acris & turbidū decoctū faciens reijcienda.

201 Est tñ species quædā Guaiaci, quæ nunquā in vsū ducenda est, quæ nigrorem verum in medio non habet, sed coloris est sub obscuri cū quadam viriditate, quæ decoctum facit omninò turbidum, quæ nūquam clarescit, tum maxima acredine, & in gula, & faucibus ardorem excitat: ob crassas autem, & terrestres partes maiori ex parte insplene, nonnunquam etiā in hepate obstructions inducit. Empirici sylvestre lignum sanctum appellant;

lant; sed cū apud scriptores nullibi reperia duplicem hanc syluestris, & domestici differentiam potius ratione soli has qualitates acquirere censerē.

202 Animaduertendū etiā ne, aut in crassiores particulas, aut in nimis subtilem pollinem minuat, illud. n. impedit ne virtus ligni benē aque impartiat, hoc autem efficit, vt difficillimē clarescat decoctum, sed semper ferē ebibatur turbidū, vnde obstructions in splene, aut hepate.

203 Absurdū est qd viri quidā alioqui doctissimi etiā scriptis editis cōsuerunt, nō posse fieri decocta ex vino, aut saltem ex vino solo, sed infusionē fieri debere ex aqua, mox hanc diutius excoquendā esse, addendūq; in fine vinū; quod hoc censeāt ineptā esse materiā infusionis, quodq; tam diū excoqui nequeat, quādiū oporteret ad eliciendā virtutem medicamenti, certū est. n. & in chemicis extractionibus experientia cōprobat, nihil esse aptius ad extrahēdas medicamentorū facultates ipso vino, aqua vini, & aceto; quod igneis, & calidis, subtilibusq; partibus penitiora queq; permeās intimiorē quāq; facultatē poterit extrahere, & in se cōcipere: verū quidē est non adeo longā pati coctionē, sed aut longa infusione id cōpensari solet, aut in duplici vase solet excoqui. Parare ego decoctū soleo in morbo inueterato, cum malo habitu; & materia frigida prædominante ex vino, quo aliquos apud alios desperatos perfectē curavi: Paratur autem hoc modo facta infusione corticis ligni sãcti optimæ crasso modo cōtusa vnc. xvij. in vini albi optimi, vt qd apud nos vernatia dicitur, bocchali- bus nostratibus decē & octo, sunt autē libræ medicinales xlij. per duos dies excalesceto prius vino, & semper per duos illos dies in duplici vase, vel

Guaiaci
scobes ne-
q; crassior
sit, neq; in
pollinem
ducta.

Vinum op-
tima mate-
ria pro pa-
randis de-
coctis in-
cur mor-
bi gallici.

Vernatia
suē vinū
medicatū
pro mor-
bo gallico,

R cine-

cineribus calentes: post fit lento igne vel in duplici vase elixatio ad cōsumptionem tertię partis, quo vtatur egrotus, & mane loco syrupi, & pro potu in cibis; sumet mane onz. vii. & post horam proliciātur sudores in prandio autem, & in cœna non excedat onz. xiiij. Vtilissimū est etiā ijs, quibus inunctione facta ex argento viuo nō conualuerunt, & portio aliqua argenti viui relicta est in corpore.

Decocta.
soluentia
in gallico
morborarō
in vsū
veniant.

204 Sunt qui vtuntur decocto ex Guaiaco, Salza, vel etiam china soluente ex fena, turpeto, hermodactilis, aliquandō etiam veratro nigro, addito sēper carduo benedicto vt Brasauolus, & Mathæolus, & alij. Hęc sanē in robustissimis, & quibus sudores aut non profunt, aut prolici non possunt, mea quidem sententia in vsum venire possunt: si enim puluisculis, & electuarijs aliquandō, si non ad restinguendam, ad imminuendam saltem labem felici successu vtimur; cur id etiam cum decoctis præstare non poterimus? non tamen adeo est securum; cū aliquando insequi soleant gravissimę dysenterię.

Sudores p-
liciēdi aut
in hypo-
causto aut
in lecto,
sed q̄ cau-
tio adhi-
benda.

205 In sudore proliciendo, si spontē ab assumpto decocto non fluat, vti tutō possumus aut hypocausto, aut capsula cum igne in lecto; sed in hypocausto hoc diligentia adhibenda est, mutanda est, sed interamina, ne sordes infectę iam expulsę iterum reement, quod à paucis obseruatum video: quapropter hypocaustorum vsus, si tolerari potest, multo tutior esse solet.

Euapora-
torijs in
calidis, &
siccis natu-
ris vtēdū.

206 In calidis, & siccis temperaturis, & demacris vi morbi sudores commodē euaporatorio proliciemus.

207 Vbi sudores cōmodē profluunt, non adeo frequenter intermedijs medicamentis corpus per secessum

secessum euacuabimus; reuocantur. n. humores à superficie versus centrum, impediuntque saltem, aut difficiliorè propterea reddunt sudorem; corpusque imbecilius faciunt.

208 Non statim ab assumpto sudorifero arte promouendus est sudor, sed post horam, intercedente, si fieri possit, somno.

209 In radice china decocto parando, cū soleant, si recens fuerit, & non cariosa, vnciā vnā illius in decē libris aquæ, vel si selecta non fuerit, & antiqua duas eiusdē vncias in libris 12. aquæ excoquere, multi etiā medici, vt nimis impēsæ rationē habeant, cū multi totam illā decoctionē vnica die absumere nequeant, vereantur autē, si in alterū diē conseruent, ne ace scat, dimidiā chinae portionē in dimidiata aquæ quantitate excoquunt, & aut dimidias, aut duas tertias consumunt, sic censentes, & indēnitati etumenæ consuluisse, & decoctū æquē validū parasse, sed maximè decipiūtur, & si gustus iudiciū non subtraxerint, facilè cognoscant, potentius multò esse primū illud decoctū, quàm secundum; & ratio est in promptu; quia nō satis est dari proportionem radice ad aquam, sed spectandum maximè tempus coctionis, & actionis caloris ignis, & reactionis aquæ: ad extrahendā enim facultatem ex durissima radice, & siccissima, & aquæ communicandam cum quatuor putā horarum spatium intercedere debeat, quantum consumetur in absumentis per elixationem sex, aut octo libris aquæ; si dimidiata quantitate imposita chinae puta semiuncia libris sex aquæ, dimidium consumere sinamus, aut duæ tertie partes, minori spatio quàm duarum horarum absumetur, minus aqua actioni ignis resistere valenti;

Inter sudā dū nō frequēter purgandum.

Sudores nō si statim ab assumpto sudorifero proliciēdi. Chinae radice decocto in parando communis error medicorum.

Neq; verò quis dicere audeat data minori ignis quantitate, & magis lento igne si fiat coctio, posse nos huic incòmodo contrà venire: nam ad extrahendam vim hanc ex solidiori substantia debita, quoque ignis quantitas concurrere debet.

Sarzæ parili decocto Guaiaci pars se per miscenda.

210 In sarzæ pariliæ, quâ in edomanda hac lue, & superandis symptomatibus primas semper tenere censui, decocto illud observandum nunquã solam in vsum ducendam esse, cum enim laxante quadam facultate prædita sit, & sapore fatuo, adeò eos, qui illa vtuntur, nauseabundos reddit, vt ob imbecillitatem virium ex ciborũ auersione multi illius vsum omittere cogantur; adijcienda igitur tertia, vel quarta pars ligni Guaiaci, quinimò apud nos Mediolanenses decoctum Guaiaci folius vix in vsum dici potest ob temperamentum calidum, & humidum, & ob hepat eiusdem temperaturæ.

Salzæ decoctum æstate parandũ esse debere aquæ quantitate quàm hyeme, vt longiori coctura tota vis sarzæ communicari possit ipsi aquæ; nam, quemadmodum in decocto chinæ aquæ fieri dicebamus, non solum est observanda proportio debet, & aquæ ad medicamenta, quæ simul excoquantur, sed etiam proportio temporis coctionis, tum vt communicetur vis aquæ, tum ratione actionis ignis caliditate, & siccitate, tum reactione aquæ cum humiditate, & frigiditate.

211 Observandum autem cum æstate paratur, cum minor quantitas decocti paranda sit, maior esse debere aquæ quantitate quàm hyeme, vt longiori coctura tota vis sarzæ communicari possit ipsi aquæ; nam, quemadmodum in decocto chinæ aquæ fieri dicebamus, non solum est observanda proportio debet, & aquæ ad medicamenta, quæ simul excoquantur, sed etiam proportio temporis coctionis, tum vt communicetur vis aquæ, tum ratione actionis ignis caliditate, & siccitate, tum reactione aquæ cum humiditate, & frigiditate.

Guaiacide coctũ cur minus longacoctura egeat, cum durius sit.

212 Cur autem Guaiacum cum durius sit, & solidius non tantam aquæ quantitate exposcat, neq; tam longam cocturam pro extractione virtutis alexipharmacæ, vt china, & sarza, secus quàm censuerit doctissimus Rudius, qui temporis coctionis rationem non consideravit, in causa est humi-

humiditas illa aerea, & oleaginosa Guaiaci, in qua potissimum facultas illa alexiteria residet, quæ facilius, & extrahitur, & comunicatur aquæ, quàm quæ in sarza est, quæ quàmuis rariori sit substantia, & minus solida, ex succa tamen est, & arida, & in hac tota posita est facultas sarzæ: China tamen multo maiori indiget, & aqua, & coctura, tum quoniam durissima est, tum quia, arida cum sit, nullam etiam habet oleaginosa substantiam.

213 Sed quoniam sæpenumero euenit, vt aliqui vel vi morbi, vel procrastinatis remedijs, vel medicorum insitiæ ab hoc morbo macerati, & ad extremam tabem deducti sint, vt nulla amplius superesse salutis spes videatur, ne etiã ij ope medica destituti remaneant, remedium quoddam proponam, quo quamplurimos ex ijs ad optimũ statum deduxi, simulq; virulentiam extinxi, & à tali tæbe omninò curauì. Est verò consumptum quoddam, quod sola alexipharmaca qualitate sine sudore villo, sed mediantibus pinguedinosis carnis partibus alimenti vim sumens, & in substantiam aliti versum, & vim illam virulentam euincit, & absomit, & sanguinem generat alexipharmaca illa qualitate præditum, vt mala illa qualitate euicta, in aliti bonam substantiam vertatur. Sic autem paratur. R. Sarzæ pariliæ electæ minutim incisæ onc. vj. infundatur per horas viginti quatuor in libris quindecim aquæ calentis, ita vt lenem calorem conseruet, & operculo bene occludatur vas, mox lento igne decoquatur ita, vt nihil exhalet, donec quinque libræ absumptæ sint, & tunc cocleari perforato extrahatur sarzæ, & pistetur in marmoreo mortario, mox eidem aquæ reimpōnatur, adden-

Sarzæ decoctũ mirabile ad tabidos ex morbo gallico.

R. 3. do

154 LVDOVICI SEPTALII MEDIOL:

do carnis vituli macrę libras tres, seminum coriã-
drorum præparatorum onz. i. aut eorū loco, aut
ligni sancti rasi tantundem, aut santalorum citri-
norum minutim incisorū drach. iij. pro varia ho-
minum, & prædominantium humorum conditio-
ne, & benè operto vase iterum lento igne simul
ebulliant donec remaneant librę quinq; & in fi-
ne aromatizentur cū drach. iij. cinamomi electi:
mox fiat colatura cum forti expressione; & refer-
uetur in vase vitreo, vel vitreato; de qua summo
mane per quatuor horas antè cibum capiat æger
onc. vj. aut septem. Vesperī autem quatuor, aut
quinq; vncias antè cœnā, vel per tres horas antè;
aut si tempus non intercedat commodum im me-
diatè antè alios cibos; quòd si in æstate versemur,
aut febris hectica adiūcta sit, simul cum salza pa-
rilia indere soleo hordei exorticare vncias qua-
tuor: atq; in assumptione huius decocti per quam
plurimos dies perseverandum est, ità vt ad cente-
simum quandoque diem perueniam.

Saponaria
decoctum.

214 Non omittendus hoc loco vsus alterius
decocti alexipharmaci facilè parabilis pro paupe-
ribus optimi ex saponaria herba vulgari, & omni-
bus nota parandi: quin in contumacissimo morbo
aliquandò vsus sum eo felici successu; sed gustui
ingratum est, & propterea pauperibus reseruatū:
Accipiantur saponarię viridis M. ij. infundantur
per noctem in lib. viij. aquę, mox exquoquatur ad
cocturam saponarię, deindè libra vna cum dimi-
dia aquę cum herba iam cocta excoletur cum ex-
pressionē, quę reseruetur pro porione matutina
ad sudores prolicendos sumendo vncias septem,
aut octo; quòd verò superest, dulcoretur cum pa-
xulis, aut saccharo pro potu cum cibis, estate, & bi-
lios

lios naturis addi poterit aut sonci, aut cimbalaria M. j. valet, & pro mulieribus ad mēstrua alba absumenda cū M. f. cymbalaria, & addito tantundē philipendulæ; Inuentum est Zapata Empirici Hispani. Ego autem sæpè, ac sæpiùs illo vsus sum. Doctissimus Rudius meus lib. 5. de morbis occultis, & venenatis c. 18. de saponaria, & eius decocto facit mentionē; sed vereor eū nunquā vsu esse decocto illo: cū pugillos sex decoquat saponariæ in lib. xvj. aquæ ad dimidias: cū aquæ ad saponariam nimia sit quantitas; & quod maioris est momēti, tenella herba virens non indiget tā longa elixatione; igneæ enim, & aeræ partes omninò euanescent, & in nihilū abibunt; in quibus tamen certum est vim saltem sudoriferam esse positam.

215 Eorum, quæ ex argento viuo parantur, medicamentorum duæ cū sint formulæ, quibus vim malæ huius qualitatē, quæ in morbo Gallico reperitur, edomare solemus, aut è corpore pellere humores mala illa qualitate infectos: quorum altera in formā suffumigiorum, altera inunctionū applicari solet: duos hos remediorum modos ad euincendum hunc morbum experientia inuentos aliqui, & magni quidē viri tūm ex antiquioribus, tūm ex recentibus nunquam in vsu traducēdos censent ob multas noxas, quas ex argento viuo in corporibus humanis excitari à scriptoribus traditum est, & sæpè experientia ostendit: alij nulla facta distinctione statim ad suffitus hos ex cinnabari, aut ad vnctiones ex hydrargyro descendunt, vt faciunt Empirici; Alij hac in re suspenso quidem pede eunt, prius regijs alexipharmacis euincere luem illam tentantes, sed vbi tanquam hydram denuò nouum caput emittere luem veneream vi-

Ex Hydrargyro parata medicamēta an in vsu duci possint, & quando.

ne rebochemus naturam à motu illo: & sæpè talem euacuatione aperto bubone totum vim morbi edomasse constat, omnemq; virulentiam euacuasse.

Bubone in contumacia aliquando purgandum corpus.

192. Observatum tamen est aliquando tanta mole humorum premi naturam, & adeo crassam, & contumacem esse materiam, ut, quamvis aggregata natura, tale opus, succumbat tamen oneri, nec ad glandularum locum possit materiam tota propellere, inchoatumq; opus relinquat, in quo casu sæpissimè expectus sum subleuata natura à mole, & sarcina, euacuato corpore feliciter omnia celsisse, tumorem in debitam mensuram esse eleuatum, & materiam duram, & contumacem ad suppurationem esse deductam.

193. Vbi virulenta hæc qualitas sedem iam occupauerit, & morbus gallicus iam factus sit, radicemq; iam egerit, edomari illa debet, atq; alexipharmacis euinci & expurgari, autem antè corpus debet huiusmodi non ab initio solis lenientibus agendum, ut æquum ij humores veram coctionem non admittant, sed in eo genere sint, ut solum præparati ad euacuationem debeant, cum lenientibus, & abstergentia sunt adiungenda, & aliqua etiam vetera purgantia, sed in minori quantitate, & hæc vetera sunt minorantia.

194. Quia si in aliquo morbo, in hoc maxime validioribus est agendum tum quod sæpè rebellis, & contumax est materia, puta lenta, & viscida, & sæpius adusta, tum maxime quia, cum per extremitates præcesserit, & iam bona ex parte extra venas ad carnes, & solidas partes peruenierit, non potest nisi validis medicamentis educi.

195. In decoctis prædilatis syrupis, aut in symplicibus varijs præparata materia cui potissimum in-

fidet

fides virulētia illa semper ad miscendū erit aliquid ex ijs, quæ alexipharmaca facultate virulentie illi aduersari possunt, atq; illam edomare; Guaiacum, salza Patilia, china, aut saponaria; ex quorum vtu sepius expertus sum post repetitam purgationem, & multos assumptos syropos adeo imminuta fuisse accidentia, vt multi sedam contulisse censentes cætera auxilia respuerent; & nisi admonuissē refractam solū esse vim morbi, non conuulsam, vix alia auxilia amplius admisissent.

196 Postremum quod in purgatione repetita sumitur medicamentum, placet esse in forma solida, qualia sunt sub pilularum forma; quod & à longinquo tribus attrahant, & si qua à medicamentis, aut syropis commota sint recementa facilius possint educere.

197 In repetita præparatione humorum laudo admiscere syropos compositos soluentes, vt syrupum Montanum, de fumaris compositum, de polipodio, de cicorea Nicholi, vel Guglielmi; pro varietate materiz, quidquid dicant recentiores, & potissimum Massarias doctissimus; neq; enim impeditur effectus, quæ nullibi in tali materia expectatur; sed paulatim præparatam materiam, cui virus insidet, euacuamus.

198 Quinimò ubi maximam superesse adhuc materiz copiam cognouerimus, optimū esse censeo antequam ad vera alexipharmaca veniamus, potissimum autem ante inunctiones, aut suffumigia, puluisculis, aut confectis ex soluentibus paratis sena, Mochiacano, xialappa, turpeto, hermodactilis, & similibus pro varietate materiz exhibentis, addita æquali ferè ad omnia quantitate Sarzæ Patiliæ puluerizate exhibitis materiā illam

immi-

In syrupis
p morbo
gallico ad
denda alexi-
pharmaca.

Pilulæ in
fine purga-
tionis in
morbo gal-
lico præfe-
rendæ.

Syrupi sol-
uentes in
morbo gal-
lico comē-
dandi.

Puluisculi
soluentes,
& electua-
ria in galli-
co morbo
comēdan-
tur.

imminuere; ut quæ reliqua erit, aut per sudorem propelli possit; faciliusq; virulentia per vniuersum corpus dispersa edomari, atq; euinci; aut si per os expurganda sit, peculiari argenti viui facultate mole sua non suffocet, aut grauissima illa, quæ aliquando solet, symptomata non inducat.

Guaiaci
Species in
morbo gal
lico quæ
fugienda.

199 In decoctis ex ijs paratis, quæ alexiteria facultate, & antipathia quadam virus illud euincunt, & ex corpore pellunt, quæ ex Guaiaco paratur, primò veniat considerandû: illudq; primû animaduertendû non esse illud in vsû ducendû, quæ annosû est, nimis crassos truncos habens, atq; per oia vetustate redolens, quæ passim Empirici faciunt, ut acrimonia illa perfectione medicamenti arguentes ægris suis imponant. Cû calor naturalis in tali ligno iam ferè sit assuptus, & vis eiusdem efeta reddita, humidû substantificû, & oleaginosa pars absumpta, aucta siccitas, siue potius ariditas sine pinguedine: nam ob has causas cû multas partes terrestres decoctû tale habeat, nunquã clarescit, & terrestres illæ partes cum austeritate quadam acres etiam persentiuntur.

Guaiaci
trunci iu
niores in
ualidi.

200 Neq; tñ etiam truncos illos minores laudo: minimus enim illis inest vigor: & calor humiditate superflua hebetatur: & facultas illa à tota substantia tanquam in infante est imbecilla.

Guaiaci
Species fa
poris acris
& turbidû
decoctû fa
ciens rei
cienda.

201 Est tñ species quadam Guaiaci, quæ nunquã in vsû ducenda est, quæ nigrorem verum in medio non habet, sed coloris est sub obscuri cû quadam viriditate, quæ decoctum facit omninò turbidum, quæ nūquam clarescit, tum maxima acredine, & in gula, & faucibus ardorem excitat: ob crassas autem, & terrestres partes maiori ex parte insplene, nonnunquam etiã in hepate obstructions inducit. Empirici sylvestre lignum sanctum appellant;

lant;

lant; sed cū apud scriptores nullibi reperia duplicem hanc syluestris, & domestici differentiam potius ratione soli has qualitates acquirere censerē.

202. Animaduertendū etiā ne, aut in crassiores particulas, aut in nimis subtilem pollinem minuat, illud. n. impedit ne virtus ligni benè aque im-
periat, hoc autem efficit, vt difficillimè clarescat decoctum, sed semper ferè ebibatur turbidū, vnde obstructions in splene, aut hepate.

203. Absurdū est qd viri quidā alioqui doctissimi etiā scriptis editis cōsueverunt, nō posse fieri decocta ex vino, aut saltem ex vino solo, sed infusionē fieri debere ex aqua, mox hanc diutius excoquendā esse, addendūq; in hoc vinū: quod hoc censeāt inep-
tā esse materiā infusionis, quodq; tamdiū excoqui nequeat, quādiū oporteret ad eliciendā virtutem medicamenti, certū est. n. & in chimicis extraccio-
nibus experientia cōprobat, nihil esse aptius ad extrahēdas medicamentorū facultates ipso vino, aqua vini, & aceto; quod igneis, & calidis, subtili-
busq; partibus penitiora queq; permeās intimio-
rē quāq; facultatē poterit extrahere, & in se cōci-
pere: verū quidē est non ad eō longā pati coctionē, sed aut longa infusione id cōpensari solet, aut in duplici vase solet excoqui. Parare ego decoctū so-
leo in morbo inueterato, cum malo habitu, & ma-
teria frigida predominante ex vino, quo aliquos apud alios desperatos perfectè curavi: Paratur au-
tem hoc modo facta infusione corticis ligni sācti optimæ crasso modo cōtusa vnc. xvij. in vini albi optimi, vt qd apud nos vernatia dicitur, bocchali-
bus nostratibus decē & octo, sunt autē libræ medi-
cinales xliij. per duos dies excalescā prius vino, & semper per duos illos dies in duplici vase, vel

Guaiaci
scobes ne-
q; crassior
sit, neq; in
pollinem
ducta.

Vinum op-
tima mate-
ria pro pa-
randis de-
coctis in-
cur mor-
bi gallici.

Vernatia
siuē vinū
medicatū
pro mor-
bo gallico,

R cinc-

cineribus calenter post fit lento igne vel in duplici vase elixatio ad cōsumptionem tertie partis, quo utatur egrotus, & mane loco syrupi, & pro potu in cibis; sumet mane onz. viij. & post horam proliciatur sudores in prandio autem, & in cœna non excedat onz. xiiij. Vtilissimū est etiā ijs, quibus inunctione facta ex argento viuo nō conualuerunt, & portio aliqua argenti viui relicta est in corpore.

Decocta.
soluentia
in gallico
morborarō
in vsū
veniant.

204 Sunt qui vtuntur decocto ex Guaiaco, Salza, vel etiam china soluente ex senna, turpetero, hermodactilis, aliquandō etiam veratro nigro, addito sēper carduo benedicto vt Brasauolus, & Matthæolus, & alij. Hæc sanē in robustissimis, & quibus sudores aut non profunt, aut prolici non possunt, mea quidem sententia in vsum venire possunt: si enim puluisculis, & electuarijs aliquādō, si non ad restinguendam, ad imminuendam saltem labem felici successu vtimur; cur id etiam cum decoctis præstare non poterimus? non tamen adeo est securum; cū aliquando insequi soleant gravissimæ dysenteriae.

Sudores,
proliciendi aut
in hypocausto
aut in lecto,
sed q̄ cautio adhibenda.

205 In sudore proliciendo, si spontē ab assumpto decocto non fluat, vti tutō possumus aut hypocausto, aut capsula cum igne in lecto; sed in posteriori hoc diligentia adhibenda est, mutanda esse interamina, ne sordes infectæ iam expulsæ iterum reeant, quod à paucis obseruatum video: quapropter hypocaustorum vsus, si tolerari potest, multo tutior esse solet.

Evaporatoria
in calidis, &
siccis natu-
ris vtendū.

206 In calidis, & siccis temperaturis, & demeritis vi morbi sudores commodē evaporatorio proliciemus.

207 Vbi sudores cōmodē profluunt, non adeo frequenter intermedijs medicamentis corpus per secessum

secessum euacuabimus; reuocantur .n. humores à superficie versus centrum, impediuntque saltem, aut difficiliorè propterea reddunt sudorem; corpusque imbecilius faciunt.

208 Non statim ab assumpto sudorifero arte promouendus est sudor, sed post horam, intercedente, si fieri possit, somno.

209 In radice chinæ decocto parando, cū soleant, si recens fuerit, & non cariosa, vnciā vnā illius in decē libris aquæ, vel si selecta non fuerit, & antiqua duas eiusdē vncias in libris 12. aquæ excoquere, multi etiā medici, vt nimis impensæ rationē habeant, cū multi totam illā decoctionē vnica die absumere nequeant, vereantur autē, si in alterū diē conseruent, ne acescat, dimidiā chinæ portionē in dimidiata aquæ quantitate excoquunt, & aut dimidias, aut duas tertias consumunt, sic censentes, & indēnitati etumenæ consuluisse, & decoctū æquè validū parasse, sed maximè decipiūtur, & si gustus iudiciū non subtraxerint, facilè cognoscant, potentius multò esse primū illud decoctū, quàm secundum; & ratio est in promptu; quia nō satis est dari proportionem radice ad aquam, sed spectandum maximè tempus coctionis, & actionis caloris ignis, & reactionis aquæ; ad extrahendā enim facultatem ex durissima radice, & siccissima, & aquæ communicandam cum quatuor puta horarum spatium intercedere debeat, quantum consumetur in absumentis per elixationem sex, aut octo libris aquæ; si dimidiata quantitate imposita chinæ puta semiuncia libris sex aquæ, dimidium consumere sinamus, aut duæ tertie partes, minori spatio quàm duarum horarum absumetur, minus aqua actioni ignis resistere valenti;

Inter sudā dū nō frequēter purgandum.

Sudores nō statim ab assumpto sudorifero proliciēdi. Chinæ radice decocto in parando communis error medicorum.

Neq; verò quis dicere audeat data minori ignis quantitate, & magis lento igne si fiat coctio, posse nos huic incòmodo contrà venire: nam ad extrahendam vim hanc ex solidiori substantia debita, quoque ignis quantitas concurrere debet.

Sarzæ pariliq; decocto Guaiaci pars septima per miscenda.

210 In sarzæ pariliæ, quâ in edomanda hac lue, & superandis symptomatibus primas semper tenere censeui, decocto illud observandum nunquã solam in vsum ducendam esse, cum enim laxante quadam facultate prædita sit, & sapore fatuo, adeò eos, qui illa vtuntur, nauseabundos reddit, vt ob imbecillitatem virium ex ciborũ auersione multi illius vsum omittere cogantur; adijcienda igitur tertia, vel quarta pars ligni Guaiaci, quinimò apud nos Mediolanenses decoctum Guaiaci solius vix in vsum dici potest ob temperamentum calidum, & humidum, & ob hepat eiusdem temperaturæ.

Salzæ decoctum æstate parandum esse debere aquæ quantitate quàm hyeme, vt longiori coctura tota vis sarzæ communicari possit aquæ fieri dicebamus, non solum est observanda proportio debet, & aquæ ad medicamenta, quæ simul excoquantur, cur.

211 Observandum autem cum æstate paratur, cum minor quantitas decocti paranda sit, maior esse debere aquæ quantitate quàm hyeme, vt longiori coctura tota vis sarzæ communicari possit aquæ fieri dicebamus, non solum est observanda proportio debet, & aquæ ad medicamenta, quæ simul excoquantur, sed etiam proportio temporis coctionis, tum vt communicetur vis aquæ, tum ratione actionis ignis, caliditate, & siccitate, tum reactione aquæ cum humiditate, & frigiditate.

Guaiacide coctum cur minus longior coctura egeat, cum durius sit.

212 Cur autem Guaiacum cum durius sit, & solidius non tantam aquæ quantitate exposcat, neq; tam longam cocturam pro extractione virtutis alexipharmacæ, vt china, & sarza, secus quàm censuerit doctissimus Rudius, qui temporis coctionis rationem non consideravit, in causa est humi-

humiditas illa aerea, & oleaginosa Guaiaci, in qua potissimum facultas illa alexiteria residet, quæ facilius, & extrahitur, & comunicatur aquæ, quàm quæ in sarza est, quæ quàmuis rariori sit substantia, & minus solida, ex succa tamen est, & arida, & in hac tota posita est facultas sarzæ: China tamen multo maiori indiget, & aquæ, & coctura, tum quoniam durissima est, tum quia, arida cum sit, nullam etiam habet oleaginosa substantiam.

213 Sed quoniam sæpenumero euenit, vt aliqui vel vi morbi, vel procraftinatis remedijs, vel medicorum insitia ab hoc morbo macerati, & ad extremam tabem deducti sint, vt nulla amplius superesse salutis spes videatur, ne etiã ij ope medica destituti remaneant, remedium quoddam proponam, quo quamplurimos ex ijs ad optimũ statum deduxi, simulq; virulentiam extinxi, & à tali tabe omnino curauì. Est verò consumptum quoddam, quod sola alexipharmaca qualitate sine sudore vllò, sed mediantibus pinguedinosis carnis partibus alimenti vim sumens, & in substantiam aliti versum, & vim illam virulentam euincit, & absomit, & sanguinem generat alexipharmaca illa qualitate præditum, vt mala illa qualitate euicta, in aliti bonam substantiam vertatur. Sic autem paratur. R. Sarzæ patiliæ electæ minutim incisæ onc. vj. infundatur per horas viginti quatuor in libris quindecim aquæ calentis, ita vt lenem calorem conferuet, & operculo bene occludatur vas, mox lento igne decoquatur ita, vt nihil exhalet, donec quinque libræ absumptæ sint, & tunc cocleari perforato extrahatur sarza, & pistetur in marmoreo mortario, mox eidem aquæ reimponatur, adden-

Sarzæ decoctũ mirabile ad tabidos ex morbo gallico.

R a do

liosius naturis addi poterit aut sonci, aut cymbalariz M. j. valet, & pro mulieribus ad mēstrua alba absumenda cū M. f. cymbalariz, & addito tantundē philipendulæ; Inuentum est Zapatæ Empirici Hyspani. Ego autem sæpè, ac sæpiùs illo vsus sum. Doctissimus Rudius meus lib. 5. de morbis oculis, & venenatis c. 18. de saponaria, & eius decocto facit mentionē; sed vereor cū nunquā vsus esse decocto illo: cū pugillos sex decoquat saponariæ in lib. xvj. aquæ ad dimidias: cū aquæ ad saponariam nimia sit quantitas; & quod maioris est momēti, tenella herba virens non indiget tā longa elixatione; igneæ enim, & aereæ partes omninò euanescent, & in nihilū abibunt; in quibus tamen certum est vim saltem sudoriferam esse positam.

215 Eorum, quæ ex argento viuo parantur, medicamentorum duæ cū sint formulæ, quibus vim malæ huius qualitatē, quæ in morbo Gallico reperitur, edomare solemus, aut è corpore pellere humores mala illa qualitate infectos: quorum altera in formā suffumigiorum, altera in unctionū applicari solet: duos hos remediorum modos ad euincendum hunc morbum experientia inuentos aliqui, & magni quidē viri tū ex antiquioribus, tū ex recentibus nunquam in vsus traducēdos censent ob multas noxas, quas ex argento viuo in corporibus humanis excitari à scriptoribus traditum est, & sæpè experientia ostendit: alij nulla facta distinctione statim ad suffitus hos ex cinnabari, aut ad unctiones ex hydrargyro descendunt, ut faciunt Empirici; Alij hac in re suspensio quidem pede eunt, prius regijs alexipharmacis euincere, lue illam tentantes; sed vbi tanquam hydram denuò nouum caput emittere lue veneream vi-

Ex Hydrar
gyro para
ta medica
mēta an in
vsus duci
possint, &
quando.

derint, experiri alterutrum ex ijs medicamentis permittunt, sed vniuersum negotiū Empiricis, & barbitonforibus cōmittunt, ne formulā quidem, aut suffitis aut vnguenti, quā vsuri sint, præcognoscantes: quinimò si ab eis formulam aliquam exposcas, obmutescunt, optimè id Empiricos scire respondentes. Ego hac in re itā censeo, & itā procedo: si in principio fuerit morbus, aut etiam si progressus altius radices egerit, nondū tamē vsus sit regijs remedijs alexipharmacis, omissis illis, quid cum veris alexipharmacis præstare possim: experior, & quandoque repetita hac curandi ratione omni ingenio tali idem tento; sic enim & malam illam qualitatem euincere soleo, & languentibus particulis robur addo; sin verò sic vis morbi euinci nequit, sed hæc nos eludit, aut si obtenuit rei familiaris illa in vsū duci nō possūt, turò, & alacriter ad hæc remedia transeundū censeo; & ego sæpè illa remedia in vsū duco.

Inunctio-
nes, & suffu-
miglia
nō ab em-
piricis, sed
à peritis
medicis ad-
ministrari
debent.

216 Sed cauendum ne totum id negotiū Empiricis rationales medici committant, qui in omnibus eodem calepodio vtentes aut in multis imperfectum relinquunt negotium, aut præcipites ægrotantes agunt in grauissima pericula, aut etiam in mortem.

Inunctio-
nes ex ar-
gēto viuo
aut nō ad-
ministran-
dæ, aut va-
lidæ tum
quātitate
continua,
tū discre-
ta.

217 Maximo in errore versantur ij, qui post omnia adhibita regia remedia, cū ægrotantes iam imbecillos videāt, efēta virtute vitali, & quasi vniuersa carne consumpta, nec aliam superesse spem, quā in remedijs ex hydrargyro paratis, illa quidem concedunt, sed debilia, aut quantitate argenti viui, aut numero, aut inunctionum, aut suffituum; & sæpè numero interpolant. Aut enim omnino duo hæc remedia excludenda sunt, aut

omnino

omnino valentia concedenda, & quantitate hydrargyri, & numero inunctionum, aut suffituum: alioqui attenuata, & loco mora quidem materia, dolores, & symptomata imminuta videretur, sed cum ea non expellatur, alium locum quærens, sæpè nobiliorem partem impetit, potissimum caput, eò hydrargyro, & cinnabari natura sua tendente, & secum attenuatas materias ducente: quinimò cum argentum viuum veneficam habeat qualitatem, eò à corpore non euacuato ægrotantes duplici morbo laborant, eo, qui fit à qualitate luis venereæ, & alijs symptomatibus, quæ ab hydrargyro fiunt. Quo etiam fit, vt tales ferè nunquam curentur, sed infelicissimam vitam ducant, & tandem tabescentes marcescant.

218 Ex duabus formulis semper, & tutiorem, & quæ melius morbum extirpat, eam esse censeo: quæ cum inunctione perficitur: in emaciatis enim, siccis naturis, in stricto pectore, in anhelosis magis conuenit, & in omnibus symptomatibus magis est proficua. In cadentibus tamen capillis, in crustosis, externis vlceribus præferre soleo. suffumigia.

219 Absurdum est suffumigijs illis vt in euincendo hoc morbo, quæ leuia à doctissimis Fallopio, Mercato, & alijs dicuntur, in quibus non ingreditur cinnabaris; exsiccant enim externas partes laborantes, at vim morbi interni non extringuunt, neque materiam, in qua virulentia illa residet, expellunt.

220 Basis sit Cinnabaris addita portione Antimonij, & Marchesitæ. Vt pro vno ægrotante cinnabaris sint drach. iij. Antimonij, & Marchesitæ an. vnc. iij. auripigmenti drach. j. s. aromatum

Inunctio
quæ præferenda, &
quæ suffumigia.

Suffumigia leuia
Fallopij,
& Mercati
in morbo Gallico
iutilia.

Suffumigij
vna
formula.

tum ad penetrationem additorum pro varia corporum conditione variantium quantitas sit ferè ad pondus cæterorum, & pulueris illius singulo die vnc.vj. vel vncia vna in fumum dispersa super prunas: Corpus in hypocausto inclusum vniuersum excipiat, canna aerem externum inspirans, & expirans.

Suffumigia èt ore aliquandò excipièda. 221 Vtilissimum tamen erit, nisi sit anhelosus, aut angusti thoracis aliquandò ore portionem illius fumi excipere.

Suffumigia anteq̃ fiat calor in corpore excitadus. 222 Antequam tamen suffumigia fiant, incalcescat aliquandiu æger, & post, si sudores profuant, non est inutile.

Hydrargyri pro vno hoie curando q̃ quattas, & quæ ad alia pro portio. 223 Inunctiones ex hydrargyro apud me sunt multò frequentiores, in quarum vna dosi pro vna curatione iteratis inunctionibus ad sputi apparitionem non minus tribus, vel etiam quatuor vncijs hydrargyri ingredi debet. extinguitur aliquibus salua hominis: communius tamen ex longo ductu in mortario cum axungia, quæ in duplicata dosi esse debet, additis oleis, puta lautino, de spica, liliaceo, & similibus, & pulueribus thuris, masticeis, bezoini, & similibus, aliqui nec malè portionem vnguenti Marciari addunt; non placet crocum addere, vt aliquibus visum est, quòd caput nimis feriat.

Crocū inunctiones ex hydrargyro non ingreditur. 224 In frigidissimis naturis, & crassa materia præsentè, quæ vix attenuari possit, aut de loco moveri nihil est præstantius, quàm si portio aquæ vitæ addatur, aut etiam portiuncula olei anisorum, vel rosmarini.

225 Præstabit multiplicatis dosibus multam illius copiam curare, vt pharmacopula aliquis

quis diligens, & fidelis simul præparet, ut axungia vetustatem contracta attenuationem adiuuare possit: at quotiès dosis necessaria est extrahenda spatula, quæ deorsum erant partes, suprà ponantur, & pistilli longa in gyrum commotione optime de nouo commisceantur; grauitate enim sua hydrargyrum semper vasis continentis infimas partes petit.

226 Peccant communiter practicantes, & grauiissimi quoque scriptores, qui ante hanc inunctionem propinant sudorificum aliquod medicamentum alexipharmacum, sic censentes imminui symptomata illa sæuissima, quæ post inunctionem illam insequi sæpenumero solent: cum illud potius sequatur, ut subtili per sudorem parte educta, contumaciore crassa reddita, non moueatur loco, neque ad os feratur; sicque hydrargyrum maxima ægrotantium perniciè è corpore non exiens perpetuam illis afferrat molestiam, & insuperabilia ferè symptomata.

227 Præstabit igitur decoctis ijs alexipharmacis vii, postquam inunctione euacuata fuerit materia siuè per sputum, siuè per secessum, siuè per locium, ut viscera à mala illa qualitate, si qua remanserit, liberentur.

228 A pedibus ascendendo ad os sacrum fiat inunctio, & à carpo versus spatulas, & per spinam ad collum vsque: nunquam caput inungatur, quod pessimè aliqui faciunt.

229 Inungantur ad sputi apparitionem, & tunc per diem intermittatur, & si lentè moueri sputum viderimus, iterùm vna, aut altera inunctione incitetur.

230 Si

Vaguenti multam quantitatē præstat parare, & cautio in eo.

Sudorifera alexipharmaca non præstamèda antè inunctio- nes.


Sudorifera alexipharmaca post inunctiones optima.

Inungen- di modus. Caput nō inungen- dum.

Inunctio qñ inter- polanda.

Sputo nimis affatim ad os affluente, & periculo inflammationis, & suffocationis praesente, quid praestandum.

230 Si nimis affatim, & cum impetu praecipitare materiam ad os viderimus, periculumque subesse inflammationis, aut suffocationis, deturbanda erit, & ad inferna per secesum medicamento aliquo erit ducenda; id tamen raro faciendum erit, & non nisi magna urgente necessitate.



INDEX EORVM,

Quæ in hoc opere continentur.

A



Accessione in longa febris quomodo, & quando cibandum. Lib. 2. Caut. 29

Acetum in oxirrhodinis non sit acerrimum, aut è vino potentissimo, lib. 6. 8

Aceti loco in oxirrhodinis succus citri, aut limonum non indendus,

lib. 6.

29

Acetum pro oximelle non sit acerrimum, nec ex vino potentissimo, lib. 2.

57

Aceti solius vsus in sputo sanguinis suspectus, lib. 6.

169

Acidorum vsus in acutis febribus utilis, sed moderandus, & quomodo, lib. 2.

37

Aaribus infusis in dysenteria quid statim præstandum, lib. 7.

104

Acutis in febribus tenuius cibandum, quàm in alijs acutis, lib. 2.

17

Acute febricitantes stragulis non nimis cooperiendi, lib. 2.

64

Adstringentia in sanguinis sputo cum inflammatione, & febre suspecta, lib. 6.

153

Adstringentia in sputo sanguinis quando conueniunt, & quando non, lib. 6.

152

Aer frigidus acutè febricitantibus quando concedendus, lib. 2.

63

Aestate quomodo in acutis plus cibi concedendum, lib. 2.

10

Actij

I N D E X.

- Aetij sententia refutata in sanguinis missione in mensium suppressione, lib.7.* 130
- Albi profluvij vera curandi ratio quæ, lib.7.* 148
- Albo profluvio laborantes arena sepelire malum, lib.7.* 147
- Albo in fluore adstringentia omninò fugienda. lib.7.* 150
- Album profluvium curatum à Galeno in uxore Boetii singularis fuit casus, & curatio rarò immitanda, lib.7.* 143
- Album profluvium sæpiùs curandum diuersa ratione à tradita à Galeno, lib.7.* 146
- Albumine oui in lippitudine utendi ratio, & cautiones, lib.6.* 95
- Alexipharmacis impuro corpore non utendum, lib.5.* 47
- Aloes dosis varia si pro purgante sumatur, & si pro deiectione, lib.5.* 19
- Aloes duplex facultas, purgatoria una, & abstergentia attenuans altera, lib.5.* 19
- Aloes sanguinem reiectionibus mala, lib.6.* 156
- Aloes usus frequens, lib.5.* 19
- Aloes usus in quotidianis, & feb. longis optimus, & quando ea utendum, lib.5.* 19
- Alui profluvio laborantibus frigida potus sæpè conuenit, lib.7.* 85
- Angina laborantibus, & hepatis inflammatione copiosius sanguis euacuari potest, quàm in alijs inflammationibus, & cur, lib.4.* 7
- Angina laborantibus quæ vena secanda, lib.6.* 113
- Angina laborantibus repetenda sectio vena, lib.6.* 114
- Angina laborantibus præstat potiones dare quàm medicamenta solida, lib.6.* 115

INDEX.

- Anginosis sacculi ex discutientibus mali ; humen-
tia prestare , lib.6. 116*
- Animi deliquio superueniente in principio ex afflu-
xu humorum acrium ad os ventriculi in principio
accessionum est nutriendum, si ex resolutione spi-
rituum aliquanto ante , lib.2. 36*
- Anthraxe, & bubone apparente pro varietate partis
à diuersis venis sanguis mittendus , lib.5. 37*
- Anthraxe, furunculo, & bubone in peste apparente se-
canda vena, & quando , lib.5. 36*
- Antimonium in apoplexia fugiendum , lib.6. 67*
- Antimonium in peste reyciendum , lib.5. 37*
- Aphorismus quintus primæ sectæ quomodo intelli-
gendus , lib.2. 23*
- Apoplecticis antimonium non dandum , lib.6. 67*
- Apoplecticis cauterium in commissura coronali inu-
tile , lib.6. 63*
- Apoplecticis clysteriorum quātitas varia, lib.6. 65*
- Apoplecticis concutiendum , & perfricandum est
corpus , lib.6. 58*
- Apoplecticis cucurbitula sincipiti apposita utilis ,
lib.6. 64*
- Apoplecticis in secanda vena vulnus fiat amplum ,
lib.6. 59*
- Apoplecticis in curandis vomitus fugiendus ,
lib.6. 66*
- Apoplecticis ligaturæ quales adhibendæ, lib.6. 62*
- Apoplecticis quando , & quomodo cucurbitulæ ap-
plicandæ , lib.6. 61*
- Apoplecticis repetito sanguis mittendus, lib.6. 57*
- Apoplecticis si sanguinis missio conueniat , statim
administranda , lib.6. 56*
- Apoplecticis vena frontis quādo secanda, lib.6. 60*
- Apoplecticis vesicantia capiti raso apposita utilis ,
lib.6.*

lib. 6.	64
<i>Apoplexia in curanda valida medicamenta conueniunt, lib. 6.</i>	68
<i>Apoplexia in curanda sternutatoria quando administranda, lib. 6.</i>	69
<i>Apoplexia in curanda ab oleis minùs validis inchoandum, lib. 6.</i>	70
<i>Aqua hordei in acutis febribus optimus est potus, lib. 2.</i>	49
<i>Aqua hordei non conuenit in omnibus morbis, lib. 2.</i>	49
<i>Aqua hordei quomodo paranda, lib. 2.</i>	49
<i>Aqua optima venteruina, aut fontana optimus potus in acutis, lib. 2.</i>	48
<i>Aqua vite, & olea Chimica arte calida parata quando cum utilitate vnguentis ex hydrargyro adduntur, lib. 7.</i>	224
<i>Arenæ marinæ, vel fluuiali laborantes albo præstutuo nudas sub sole sepelire malum esse, & Galeno repugnans, lib. 7.</i>	147
<i>Arsenico præparate placente pro fouendo corde in peste detestandæ, lib. 5.</i>	58
<i>Arteriæ quæ secandæ in palpitatione cordis, lib. 6.</i>	172
<i>Arteriotomia in palpitatione cordis quando conuenit, lib. 6.</i>	171
<i>Ascite laborantibus post hydragoga valida ventriculus roborandus, lib. 7.</i>	48
<i>Ascite laborantibus hydragoga sæpiùs repetitio necessaria, lib. 7.</i>	54
<i>Asthmati attenuantia, & impensè calida mala, lib. 6.</i>	132
<i>Asthmati obnoxij gargarismata fugiant, lib. 6.</i>	110
<i>Asthmaticis diuretica mala, lib. 6.</i>	134

Asthma

I N D E X.

<i>Asthmaticis fomentis calidis non fouendam pectus,</i> lib. 6.	146
<i>Asthmaticis galli veteris ius noxium,</i> lib. 6.	137
<i>Asthmaticis in paroxismo medicamentum purgans non propinandum,</i> lib. 6.	140
<i>Asthmaticis in paroxismo nihil violentum facien- dum,</i> lib. 6.	141
<i>Asthmaticorum in paroxismo ne chysteribus uten- dum,</i>	ibidem
<i>Asthmaticis in paroxismo non perfricandum pe- ctus,</i> lib. 6.	145
<i>Asthmaticis medicamenta purgantia in usum du- cenda,</i> lib. 6.	135
<i>Asthmaticis quomodo, & quando sudorifera conue- niunt,</i> lib. 6.	138
<i>Asthmaticis siccantia fugienda,</i> lib. 6.	133
<i>Asthmaticis situs supinus malus,</i> lib. 6.	144
<i>Asthmaticis sudoriferis non utantur sine dulcibus,</i> lib. 6.	139
<i>Asthmaticis vomitus periculosus,</i> lib. 6.	136
<i>Asthmaticis vomitus in paroxismo fugiendus,</i> lib. 6.	143
<i>Asthmaticis varia remedia mutanda, & danda,</i> lib. 6.	147
<i>Attenuantia in ascite conueniunt ad de obstruen- das vias urinae,</i> lib. 7.	49
<i>Attenuantia in principio quotidianarum non sint valenter calefacientia,</i> lib. 5.	20
<i>Auesantibus omnino cibum aliquando deterrima quaque concedenda,</i> lib. 2.	26
<i>Augmentum accessionis minus incommodum ci- bationi quam status urgente necessitate,</i> lib. 5.	33
<i>Aureas monetas, & torques iuribus incoquere ab- surdum,</i> lib. 5.	57

I N D E X.

- Auribus vera inflammatione laborantibus repellentia vix conueniunt*, lib. 6. 103
Auribus applicanda remedia non sint actu frigida, lib. 6. 104
Aurium doloribus à materia frigida remedia insigniter sint calida, lib. 6. 105
Auri vsus per os admittendus, lib. 5. 56
Auri per os assumendi varij modi, lib. 5. 56

B

- B**ibendum sæpe, sed paulatim in æstuantibus febricitantibus non affatim, & confertim, lib. 2. caut. 60
Biliofis in febribus ad ostendendum purgandum esse humorem sufficit in locio adesse nubem albam, leuem, & æqualem, lib. 5. 6
Blandis medicamentis assumptis leuis somnus potest concedi, lib. 5. 10
Boethi uxoris albo profluvio laborantis historia explicata, & ratio reddita curationis illius, lib. 7. 145
Bubone contumaci existente aliquando purgatione utendum, lib. 7. 192
Bubone gallico apparente quis modus curationis, lib. 7. 191
Bubone non exeunte non multa ingerenda, neque quibusvis vescendum contra empiricos, lib. 7. 186

C

- C**alculo vretères occupante diuretica mala, lib. 7. caut. 123
Caragna, Thachamacha, Chalbani in forma cerati applicata in presocatis ex semine mala, lib. 7. 159

Car.

INDEX.

- Cardialgia laborantibus quando vomitoria, & quando deiectoria conueniunt*, lib. 7. 27
- Cardialgia laborantibus deiectoria sint in forma boli*, lib. 7. 29
- Carie gallica apparente qua cautione procedendum in curatione*, lib. 7. 189
- Carnosis quam pinguibus plus sanguinis detrahendum*, lib. 4. 13
- Cassia in coicis ex inflammatione vtilis*, lib. 7. 83
- Catalepsi laborantibus calida, & sicca fugienda*, lib. 6. 45
- Catalepsi laborantes aceto intus, & foris interdicens*, lib. 6. 46
- Cataracta oculi in remouenda cauendum ne iussis adfit*, lib. 6. 100
- Cataracta oculi antequam deponatur quid cauendum*, lib. 6. 102
- Catarrho ad thoracem, & pulmones irruente gargarismi periculosi*, lib. 6. 108
- Catarrhi non sistendi narcoticis nisi magna necessitate*, lib. 6. 112
- Causis multis presentibus qui ordo in illis euincendis seruandus*, lib. 3. 33
- Causone laboranti purgato feri exhibitio post optima*, lib. 5. 11
- Cautiones qui multas habere voluerit circa sanguinis missionem à quibus petere debeat, ne acta ab alijs agere videamur*, lib. 4. 23
- Cauterium in sutura coronali in catarrho reijciendum*, lib. 6. 107
- Chine radice in decocto parando communis error medicorum*, lib. 6. 107
- Cholera laborantes quando per superna, & quando per inferna inuandi*, lib. 7. 20

INDEX.

- Cibatione in una, aut altera gratificandum aegrotis etiam contra regulas medicas, lib. 2. 25*
- Cihum auersantes ne cibos preparare videant, lib. 2. 27*
- Cibus in accessione quando offerendus, & quando per duas horas ante, lib. 2. 36*
- Cibus paulò deterior modo suauior concedendus. aphor. 38. quomodo intelligendum, lib. 2. 24*
- Cibus quando offerri debet in principio accessio- num, lib. 2. 35*
- Cibi quantitas mutanda ratione sexus, & roboris corporis, lib. 2. 6*
- Cibum offerre in principio, & augmento accessio- nis quando liceat, lib. 2. 32*
- Cibum offerre prestat versùs finem status, quàm instantie accessione, & quando, lib. 2. 31*
- Clysteres abstergentes in dysenteria quando indendi, lib. 7. 98*
- Clysterium abstergentium in fine dysenteria abusus, lib. 7. 99*
- Clysteres blandè inñciendi turgentibus statu intesti- ni, lib. 3. 24*
- Clysteres communes cum decoctione solita inuetera- ta non laudandi, lib. 3. 26*
- Clysterium communium frequentes abusus, lib. 3. 27*
- Clysteres etiam refrigerantes inflammatis renibus si sint pauca quantitates, lib. 7. 114*
- Clysteres in affectibus renum quantitatìs parue, lib. 3. 22*
- Clysteri in indendo ante sectionem vene quæ obser- uando, lib. 3. 31*
- Clystere indendum in aluo durà ante validum me- dicamentum exhibendum, lib. 3. 36*
- Clysteres in pregnantibus grandiori fuit quantitate non*

I N D E X.

non excedant, lib. 3.	21
Clysteres nimis exsiccentes in dysentericis reijciendi, lib. 7.	103
Clysteres prapinguibus non indantur multum calentes, lib. 7.	23
Clysteres prapnantibus non frequenter indantur, lib. 3.	20
Clysteres pro mulieribus quantitate maiores esse debent, lib. 3.	28
Clysteribus puerorum sal non indendus, lib. 3.	30
Clysteres violenter non inijciendi intestinis face repletis, lib. 3.	25
Clystere ut retineatur quid prastandum, lib. 7.	105
Colicis à flatu olea data ab initio etià vtilia, lib. 7.	75
Colicis calida valde actu noxia, lib. 7.	67
Colicis clysteres ab initio cum vino, vel sapa noxy, lib. 7.	66
Colicis clysteres ne indantur repleto ventriculo, lib. 7.	68
Colicis ex flatu valenter discutientia noxia, lib. 7.	79
Colicis ex flatu ante usum cucurbitule purgandi, lib. 7.	80
Colicis in doloribus aqua frigida quandoq; vtilis, & quando, lib. 7.	81
Colicis in doloribus ex inflammatione medicamento purgante vti lethale, lib. 7.	82
Colico in dolore secta vena in cavo quando confert, lib. 7.	84
Colicis in doloribus non lenientibus solis, aut stercorearijs; aut tardè agentibus medicamentis, ut hiera viendum, sed verè purgantibus, & cur, lib. 7.	72
Colicis in initio valenter discutientia mala, lib. 7.	65
Colicis stupefacientia potissimum conueniunt, si sint	

I N D E X.

à calida materia, lib.7.	69
Colicis stupefacientia concedenda viribus consisten- tibus, lib.7.	70
Colicis usus oleorum ab initio non alia præcessa eua- cuatione inutilis, lib.7.	72
Comatosi acriora oxirrhodina conueniunt, & lon- giori tempore, lib.6.	37
Comatosi fomenta ex oleis non tulo adhibentur, lib.6.	38
Comatosi malè primis diebus oleum camæmelinum ex aceto applicatur, lib.6.	37
Concocta medicari, cruda non mouere, &c. Hippo- cratis sententia explicata, & loci Hipp. & Galen. controuersi conciliati, lib.3.	48
Consultationes medicæ debent fieri seclusis arbitris, & cur, lib.1.	12
Consumpta iura potiùs ex carne vitulina, lib.2.	45
Consumpta quomodo pareniur, lib.2.	45
Conuulsis partes omnes calidis fouendæ, lib.6.	82
Conuulsis sudore superueniente quid agendum, lib.6.	83
Cordis in palpitatione ubi ob sanguinis abundan- tiam mittendus sit sanguis quæ cautio adhiben- da, lib.6.	168
Corde laborante ex crassis humoribus diuretica, & sudorifera non conueniunt, lib.6.	177
Corde laborante ob serosos humores diuretica, & su- dorifera optima, lib.6.	178
Cordis palpitationi quando, & in quo casu sanguis mittendus, lib.6.	167
Crisi deficiente quomodo procedendum, lib.3.	58
Crisi in imperfecta eodem die nihil à medico molien- dum, lib.3.	59
Crisi imminente quando à capite est repellendum, lib.6.	

lib. 6.	caut. 14
Criticis diebus quando medicamentum purgans dari potest, lib. 3.	59
Crocum inunctiones ex hydrargyro non ingredia- tur, lib. 7.	227
Crura sunt perfricanda, & abluenda per tres dies antè sectionem tali, lib. 7.	136
Cucurbitula in spasmo quomodo applicanda, lib. 6.	80
Cucurbitula in dorso in palpitatione cordis quando conueniant, lib. 6.	173
Cucurbitula in palpitatione cordis ubi applicanda lib. 6.	169
Cucurbitula in peste dorso quando applicanda, & quando non, lib. 5.	41
Cucurbitula in præfocatis ex mensibus suppressis ven- tri applicata male, lib. 7.	162
Cucurbitula in præfocatis ubi affigenda, lib. 7.	161
Cucurbitula magnæ in colicis applicanda cautio, lib. 7.	77
Cucurbitula magna ventri applicata sit cum pauco igne, lib. 7.	166
Cucurbitula magna sit ex perforatis, lib. 7.	167
Cucurbitula magna ventri appositæ diu non hæreat, lib. 7.	168
Cucurbitula non diuini affixa parti permittatur, lib. 4.	26
Cucurbitula scarificata in peste aliquando vicarie sectionis venæ, lib. 5.	39
Cucurbitula scarificata in furis in peste frequenter in usum venire solent, lib. 5.	40
Cucurbitula si cum scarificatione, cum pauco igne sunt affigenda, lib. 4.	24
Cucurbitulis sublati in spasmo subiectæ partes fo- uenda, lib. 6.	81

- D**ebiles dum purgantur non exsurgant, lib. 5. 24
 Decocta soluentia in morbo gallico raro in usum
 venire, lib. 7. 204
 Decrepiti parum, & sepe cibandi, & cur, lib. 2. 7
 Diaphoretica in flatibus cordis aut in usum non du-
 cenda, aut illis admiscenda sub adstringentia,
 lib. 5. 179
 Diarrhæa laborantibus pingua suspecta, lib. 7. 85
 Diarrhæa laborantibus quando abstergentium usus
 conuenit, lib. 7. 88
 Diuretica in asthma mala, lib. 6. 134
 Diuretica in calculo renum in ureteribus mala,
 lib. 7. 123
 Diuretica in præseruatione à calculo sepe noxia,
 lib. 7. 124
 Diuretica potulenta non diu in hydropicis in usum
 ducenda, & cur, lib. 7. 51
 Dolente capite ex intemperie calida aceti portio in
 oxirrhodinis sit parua, lib. 6. 7
 Dolente capite ex intemperie calida sine materia
 oleum ros. in oxirrhodinis sit ex oliuis maturis,
 & cur, lib. 6. 9
 Doloribus capitis etiam vehementissimis imminente
 crisi repellentia fugienda, lib. 6. 13
 Dysentericis clysteres abstergentes quando conue-
 niant, lib. 7. 97
 Dysenterici ex atra bile antequam purgentur ferocis
 illius humoris prius attemperanda, lib. 7. 91
 Dysentericis in declinatione abstergentia mala,
 lib. 7. 98
 Dysentericis per se conuenit sanguinis missio, sed
 ob adiuncta raro conuenit, lib. 7. 94
 Dysentericis pingua in yci quando utile, & quando
 no-

noxium, lib.7.	101
Dysentericis quando purgans medicamentum conuenit, & quando non, lib.7.	89
Dysentericis quando, & quomodo sanguis mittendus, lib.7.	95
Dysentericis quomodo, & quando narcoticis utendum, lib.7.	100
Dysentericis rhabarbari usus suspectus, lib.7.	92
Dysenterici ubi purgandi statim id præstandum, lib.7.	90

E

Emplastricis in ophthalmia quando utendum, lib.6.	96
Empyici à natura curati per euacuationem materia per secessum exemplum, lib.6.	127
Empyici quando vrendi, aut secandi, lib.6.	129
Epileptici in paroxismo non concutiendi, lib.6.	48
Epilepticis ex aura virulenta eleuata raro mittendus sanguis, lib.6.	53
Epilepticis in paroxismo caput non cooperiendum, lib.6.	49
Epilepticis lignum ori non indendum, sed quid aliud lib.6.	51
Epilepticis præseruandis quando ex brachio, & quando ex talo mittendus sanguis, lib.6.	52
Epilepticis præseruandis valida purgantia sæpe noxam afferunt, lib.9.	54
Epilepticis vesicantia capiti deerso applicata optimum remedium, lib.6.	55
Epilepticis vomitus malus, lib.6.	50
Epilepticis vomitoria semper mala, lib.6.	54
Epiphora in curanda in principio adstringentibus utendum, lib.6.	88

Epi-

- Epiphora in curanda errhinorŕarus vsus, lib. 6. 90
 Errhina, & sternutatoria mala laborantibus oculis,
 lib. 6. 17
 Errhina in lethargo optima, in multis tamen fugien-
 da, & in quibus, lib. 6. 33
 Errhina sunt pessima in dolore capitis ex morbo gal-
 lico, lib. 6. 12
 Errores commissi in tenui victu prævalente indica-
 tione à virtute sunt maiores, & noxæ, si peccetur
 minùs dando, lib. 2. 21
 Errores commissi in tenui victu in forma, pari indi-
 catione virtutis, & morbi existente pares sunt, &
 æqualia inducunt pericula, lib. 2. 22
 Errores cōmissi in tenui victu in quantitate, pari exi-
 stente indicatione virtutis, & morbi, peiores sunt,
 si plùs, quàm par sit concedamus, lib. 2. 23
 Errores in tenui victu, prævalente indicatione à mor-
 bo subtrahendi, sunt maiores, & noxæ, si peccetur
 plùs dando, lib. 2. 21
 Euacuādum sanguinis missione antequam motus de-
 siverit, si tempore mittendi sanguinis menses flue-
 re contigerit, sed imperfectè, lib. 4. 11
 Evaporatorijs in calidis, & siccis naturis ad sudores
 utendum, lib. 2. 206
 Ex argento viuo inunctiones paratæ, & suffumigia nō
 ab Empiricis, sed à peritis præscribi debere, & va-
 riari, lib. 7. 216
 Ex hydragyro parata remedia pro morbo gallico an
 in usum duci possint, & quando, lib. 7. 215

F

- F**ebriticantibus à partu nunquam mittendus san-
 guis à superais, lib. 7. 175
 Febribus in continuis euacuatio per lotium commo-
 dior quàm per sudorem, lib. 5. 2

I N D E X.

- Febribus in intermittentibus potissimum tertianis
sudoris prouocatio præstat. quàm urinx.* lib. 5. 1
- Febribus longis aloes usus commodus, & quomodo.*
lib. 5. 19
- Fluentibus ad oculos humoribus abstinendum ab ad-
stringentibus,* lib. 6. 88
- Fœnugræci in lippitudine utendum decocto, non se-
minis,* lib. 6. 97
- Fœnugræcum abluendum antequam in usum duca-
tur,* lib. 6. 98
- Fœtida non sint, quæ capiti sunt applicanda.*
lib. 6. 11
- Fœtum excludentibus quando utendum, & quomo-
do,* lib. 7. 173
- Fomentis calidis non diutius utendum, & cur,*
lib. 3. 39
- Fomentis frigidis actu non diu utendum, & cur,*
lib. 3. 40
- Fontanella in sutura coronali in catarrho reijcien-
da,* lib. 6. 107
- Formam victus primo virtus ostendit; secundo
symptomata; tertio status distantia,* lib. 2. 20
- Formam victus quæ doceant in acutis morbis,*
lib. 2. 20
- Frigidæ potus fugiendus in inflammatione intesti-
norum,* lib. 7. 87
- Frigidissima actu esse non debent, quæ thoraci ap-
plicantur,* lib. 6. 161
- Frigida ad sistendum sanguinis fluxum optima,
præterquam si ex thorace fluat,* lib. 3. 41
- Frontis in vena secanda blandè gula adstringenda,
& breui tempore,* lib. 6. 22
- Fructus borary in acutis reijciendi,* lib. 2. 39

- G**alenī consilium pro puero epileptico depranatum, lib. 2. 57
- Galli veteris ius asthmaticis noxium, lib. 6. 137
- Gallico in morbo curādo, quomodo autior plura, quā alij obseruare potuerit, lib. 7. 185
- Gallico in morbo in principio lententibus abstergentia, & purgantia admiscenda, lib. 7. 193
- Gallico in morbo curando alexipharmaca miscenda, lib. 7. 195
- Gallico in morbo progressu purgandum lib. 7. 193
- Gallico in morbo purgantibus validis agendum, & lib. 7. 194
- Gallia morbi curatio diuersa inchoante, & progressu morbo, lib. 7. 185
- Gallico morbo inchoante, & bubone vix exeunte tenuis v.etus malus, lib. 7. 187
- Gallico morbo inchoante, etiam ad bubonem promouendum exercitium validum malum, lib. 7. 188
- Gallicus morbus inchoans sine purgatione externis quandoque solis curatur, lib. 7. 185
- Gargarismata fugienda ijs, qui repleto sunt thorace, lib. 6. 109
- Gargarismata in catarrho quando conueniant, ibid. 89
- Glaucis in oculis, & latas venas habentibus mitiora externa conueniunt, lib. 6. 89
- Glutinantia in sanguinis sputo quando utilia, & quando noxia, lib. 6. 151
- Gonorrhœa gallica non statim suppressenda, lib. 7. 127
- caut. 127
- Gonorrhœa gallica in curanda quomodo in curatione procedendum, lib. 7. 190
- Gonorrhœa mutatur in fluxum album si diutius perseveret, & tunc quomodo curanda, lib. 7. 129

I N D E X.

- Gonorrhœa quando calefacientibus curanda; lib.7.
caut. 128
- Gracilibus quibus plus sanguinis detrahendum, &
quibus minus, lib.4. 12
- Guaiaci decoctum, cum dura sit illius substantia quo-
modo minus longa coctione indiget, lib.7. 212
- Guaiaci ligni species quæ in curatione morbi gallici
reijcienda, lib.7. 199
- Guaiaci lignum, quod in usum ducitur, non sit anno-
sum, lib.7. 199
- Guaiaci species reijciatur, quæ est nimis acris, &
turbidum decoctam facit nunquam clarescens,
lib.7. 201
- Guaiaci scobes neque crassior, neque in pollinem
ducta, lib.7. 202
- Guaiaci trunci non sint iunioris ligni, neque parui,
nam sunt inualidi, lib.7. 209

H

- H**Emorrhoidibus superflue euacuantibus an om-
nes occludenda, an una relinquenda senten-
tia, lib.7. 161
- Hepate erysipella laborante frigida actu conueniunt,
lib.7. 45
- Hepate erysipellate laborante repellentia sola conue-
niunt, lib.7. 44
- Hepate frigida calida, & sicca medicamenta exter-
na suspecta, lib.7. 35
- Hepate globba inflammata ante usum diureticorum
alvus teniendâ, lib.7. 49
- Hepatico fluxui remedium singulare, lib.7. 105
- Hepatis in calida intemperie quando purgandum, &
quando non, lib.7. 32

#Hepa;

INDEX.

Hepatis in calida intemperie manna non suspecta,	lib. 2.	33
Hepatis in intemperie calida refrigerantia impen-	sè, & adstringentia suspecta, lib. 7.	34
Hepatis in inflammatione in principio non purgan-	dum, lib. 7.	39
Hepatis in inflammatione repellentibus attenuantia	etiam in principio miscenda, lib. 7.	41
Hepatis in inflammatione actu frigida fugienda,	lib. 7.	42
Hepatis inflammata causa purgandum, sed in decli-	natione cocta materia, lib. 7.	39
Hepate inflammato sine materia repellentia sola con-	ueniunt, lib. 7.	43
Hepatis in inflammatione in declinatione non puris	resoluentibus utendum, lib. 7.	46
Hepatis in obstructione attenuantia cum ante pran-	dium applicanda, lib. 7.	36
Hordei ad aquam proportio pro ptissana paranda,	lib. 2.	42
Hordeum aliud uno cortice vestitum, aliud duplici,	lib. 2.	40
Hordeum pro ptissana quale eligendum, lib. 2.		40
Hordeum quomodo parandum pro ptissana conficien-	da, lib. 2.	41
Horæ tres à cibatione ad principium accessionis non	sufficere, lib. 2.	34
Humores esse ducendos quò natura vergit, quomodo	intelligendum, lib. 3.	47
Hydrargyri pro uno homine iungendo quæ quanti-	tas, & quæ ad alia ingredientia proportio,	lib. 7.
Hydropicis attenuantia non diu in usum ducenda,	lib. 7.	223
Hydro-		50

I N D E X.

<i>Hydropicis rhabbarum inutile, lib.7.</i>	53
<i>Hydropicis humores à principio purgari possunt, sed à leuioribus inchoandum, lib.7.</i>	47
<i>Hyme plus concedendum sed rarius, æstate minus, sed sæpius, lib.7.</i>	9
<i>Hyme quando minus nutriendum, lib.2.</i>	11
I.	
I <i>ctericis in principio non purgandi, sed preparanda est materia, lib.7.</i>	62
<i>Ictericis valentioribus medicamentis euacuandi, lib.6.</i>	63
<i>Ictericis valida non danda medicamenta si ex hepatis inflammatione, lib.7.</i>	64
<i>In Cardialgia adstringentia per os assumpta conueniunt in principio, lib.7.</i>	26
<i>In Cardialgia ex pituita acida deiectionia sint cum purgantibus, lib.7.</i>	30
<i>In Cardialgia in principio repellentia conueniunt, non adstringentia, lib.7.</i>	26
<i>In Cardialgia subductoria sint blanda, lib.7.</i>	28
<i>In empiemate non tentanda materia expurgatio per secessum, lib.6.</i>	127
<i>Inflammato hepate repellentia ante sectionem venæ non conueniunt, lib.7.</i>	38
<i>In palpitatione cordis curanda quæ vena secanda, lib.6.</i>	180
<i>In palpitatione cordis ex flatu prouidendum flatibus Ventrículi, lib.6.</i>	174
<i>In palpitatione cordis ex flatibus externis calidis non esse vitendum præsentè adhuc materia, lib.6.</i>	175
<i>In pleuriticis externis non indistinctè vitendum, lib.6.</i>	124
<i>Inter sudandum non adeo sæpe purgandum, lib.7.</i>	207

Inun-

- I**nunctiones ex argento viuo aut non sunt in vsum du-
cenda, aut si in vsum ducantur, validae esse debent
& cur, lib. 7. 217
- I**nunctio in morbo gallico magis laudanda, lib. 7. 213
- I**nunctio ex argento viuo quando inerpollanda,
lib. 7. 219
- I**nunctio suffitui preferenda in curatione morbi gal-
lici, lib. 7. 218
- I**nungendi modus, lib. 7. 218
- L** Ac in dysentericis an conveniat, quando, & quo-
modo parandum, lib. 7. 97
- L**ac in renum vlceribus qua distinctione dandum,
lib. 7. 120
- L**acte assumpto in phthysi dormiendum, lib. 6. 163
- L**acte muliebri qua distinctione utendum in ophthal-
mia, lib. 6. 92
- L**actis quantitas in vlceribus renum que, lib. 7. 121
- L**apidem in vesica frangentia medicamenta ficticia,
lib. 7. 126
- L**apidis in vesica unica curatio excisio, lib. 7. 126
- L**apidum ex vesica extractorum historiae dux admi-
randa, lib. 7. 126
- L**apillorum preciosorum vsus, neque omnino reijci-
endus, nec passim, ut fit, recipiendus, lib. 5. 57
- L**enientia in morborum principio maiori ex parte
conueniunt, lib. 3. 4
- L**enientia quo tempore, & qua hora, & quantum ante
cibum exhibenda, lib. 3. 3
- L**ens quomodo Hippocrati frigidissima, lib. 5. 39
- L**entium decoctum, & Sympus in peste, & Variolis
reprobandum, lib. 5. 59
- L**entium qualitates, & varia natura, lib. 5. 52
- L**esbargicis cucurbitula applicanda, lib. 6. 31

I N D E X.

<i>Leithargicis quando secunda vena, & quando non.</i>	
lib. 6.	30
<i>Leithargicis repellentia parce applicanda, & sine ad-</i>	
<i>strictione, lib. 6.</i>	34
<i>Limentis hepatis in obstructione foci calidi præ-</i>	
<i>mittendi, lib. 7.</i>	37
<i>Lippitudini valide adstringentia contraria, lib. 6.</i>	
caut.	94

M

M Anna, & Zuccharo parata in cholera susse-	
pta, lib. 7.	23
<i>Masticatoria in doloribus à calidis, & tenuibus hu-</i>	
<i>moribus quando non concedenda, lib. 6.</i>	16
<i>Medicamentorum alterantium materiam esse mutan-</i>	
<i>dam, lib. 3.</i>	1
<i>Medicus congressus medicos amet, & quomodo se in</i>	
<i>eis gerere debet, lib. 1.</i>	11
<i>Medicus cum mulierculis, & imperitis de rebus me-</i>	
<i>dicis non differat, lib. 1.</i>	18
<i>Medicus de mercede non paciscatur, lib. 1.</i>	21
<i>Medicus, & doctrina, & usu instructus artem exer-</i>	
<i>ceat, lib. 1.</i>	24
<i>Medicus fugiat mollitiem externam, lib. 1.</i>	5
<i>Medicus gratis aliquandò curare debet, lib. 1.</i>	19
<i>Medicus inani gloria, aut nimio sui amore non</i>	
<i>tentetur, lib. 1.</i>	9
<i>Medicus ingratos etiam in necessitatibus non de-</i>	
<i>serat, lib. 1.</i>	22
<i>Medicus in omnibus præstans qualis, lib. 1.</i>	8
<i>Medicus in oratione, & sermonibus varius pro e-</i>	
<i>grorum varia natura, lib. 1.</i>	26
<i>Medicus iuuenis sub docto medico praxim addif-</i>	
<i>cat, lib. 1.</i>	16
<i>Medicus morbos suos excuset, lib. 1.</i>	3

I N D E X.

Medicus non inhumana seueritate utatur, lib. 1.	25
Medicus non sit iactabundus, aut nimium pollicitator, lib. 1.	23
Medicus nulli sectæ sit addictus, sed nudam sequatur veritatem, lib. 1.	10
Medicus pietatis cultor, lib. 1.	1
Medicus qualis in vestitu, lib. 1.	6
Medicus qualis in odoratis ferendis, lib. 1.	7
Medicus quomodo excolendus, lib. 1.	14
Medicus sanitatem præferat, lib. 1.	2
Medicus secreta remedia non profiteatur, sed alijs communicet, lib. 1.	14
Medicus sit studiosus munditiæ, lib. 1.	4
Medicus sylvam medicamentorum promptam habeat, lib. 1.	13
Mel rosæ solut. licet in biliosis febribus ab initio non conueniat, in quotidianis optimum est remedium, lib. 5.	18
Melancholicis liquida, quàm arida medicamenta conueniunt, lib. 6.	84
Melancholicis quando sanguis mittendus, quando suppressendus, & quando sinendus, lib. 6.	85
Mellis ad aquam proportio pro paranda mulsæ, lib. 2.	50
Memoriæ deperditæ remedia non semper calida, licet Galenus eius causam frigidam faciat, lib. 6.	36
Memoriæ deperditæ curandæ varij modi, & contrarij, lib. 6.	36
Memoriæ deperdita quomodo à frigiditate, si sæpè à causis calidis, lib. 6.	36
Memoria in curanda rarò euacuatione opus est, lib. 6.	36
Menses promouentia per os sumpta debent esse in multa quantitate, lib. 7.	139

Men-

I N D E X.

- Mensibus immodicis insistentis repetita sanguinis
missio fiat eadem die, lib. 7. 140*
- Mensibus immodicè stantibus aliquândò medicamen-
to purgante utendum, lib. 7. 181*
- Mensibus in promouendis secari potest vena in talo
ante tempus motus cum Galeno, & versus finem
motus, lib. 7. 182*
- Mensibus in promouendis non est secanda vena dum
diminutè stant, ubi mulier aut timore eius affi-
ciatur, aut animo soleat linq̃uere, lib. 7. 133*
- Mensibus in promouendis præstat repetere sanguinis
missionem, lib. 7. 134*
- Mensibus superfluis cum medicamento purgante mi-
scenda adstringentia, lib. 7. 142*
- Mensibus superfluis remedium singulare, lib. 7. 144*
- Mensibus suppressis quæ venæ secandæ, lib. 7. 130*
- Mercedem oblatam medicus promptè non quasi fur-
tim capiat, lib. 1. 20*
- Missionem sanguinis ex talo præcedere debet exerci-
tium maximè partium infernarum, lib. 137*
- Modestia accinctus medicus domos ingrediatur,
lib. 1. 17*
- Morbis complicatis non contrarijs quomodo proce-
dendum, lib. 3. 34*
- Morbis complicatis contrarijs quomodo providen-
dum, lib. 3. 35*
- Morbis extremis statim extremis remedijs utendum,
lib. 3. 37*
- Morbo causæ complicato causæ primo rationem ha-
bebimus, lib. 3. 32*
- Morbis mediocribus blandè, & cum tempore occur-
rendum, lib. 3. 38*
- Morbo in præcipiti sanguis priùs mitti debet, quàm
alius subducatur, lib. 4. 21*

I N D E X.

<i>Morbus cum ignoratur attenuandas viſtus cur, & quomodo, lib. 2.</i>	15
<i>Mofchus in umbilici cauitate praefocationem gignit, lib. 7.</i>	160
<i>Mulſa alia cruda, alia coſta, lib. 2.</i>	50
<i>Mulſa alia pro medicamento, alia pro potu, lib. 2.</i>	50
<i>Mulſa alia meraciſſima, alia mediocriſ, alia diluta, lib. 2.</i>	50
<i>Mulſa ex ſaccaro optima quomodo paretur, lib. 2.</i>	51
<i>Mulſa, vel melicrati diſtinctio, & conſciendi ratio, lib. 2.</i>	50

N

N arcotica in capitis dolore ratione doloris vix adhibenda, ſed aliquando ratione vigiliarum, lib. 6.	4
<i>Narcotica in dolore capitis per ſe vix per os concedenda, lib. 6.</i>	5
<i>Narcotica in dyſſenteria etiam in principio quando conueniunt, lib. 7.</i>	99
<i>Narcoticis in dyſſenteria parce vtendum, lib. 7.</i>	100
<i>Narcotica nunquam applicanda ſuturis capitis, lib. 3.</i>	44
<i>Narcotica nunquam auribus immittenda, lib. 3.</i>	45
<i>Narcotica nunquam in pueris in uſum ducenda, lib. 3.</i>	46
<i>Narcoticis raro vtendum, & quando, lib. 3.</i>	43
<i>Nauſea laborantes quando purgandi, & quando non, lib. 7.</i>	31
<i>Nauſea praefente, vomitu excitato in eo non multum inſiſtendum, lib. 7.</i>	10

O

O bfetricibus aut afferentibus, aut negantibus grauiditatem medico non temere credendum, lib. 7.	169
---	-----

Ob:

I N D E X.

- Obstetricibus temerè non credendum cum asserunt
factum esse mortuum, vi excludendum esse.
lib. 7. 170
- Olea in colicis data adiuuanda cum abstergentibus,
vel purgantibus, lib. 7. 174
- Olea stillata in usum non veniant, nisi alijs allegata
lib. 6. 72
- Oleis cur cetera addenda, lib. 6. 78
- Oleum amygdalynum à partu, neque semper, neq; quib-
usvis conuenit, lib. 7. 174
- Oleum per os sumptum quando in colicis optimum
praesidium, lib. 7. 73
- Oleum rosatum pro oxirrhodinis sit retens, lib. 6. 10
- Ophthalmia in curanda opj vsus neque minus, ne-
que frequens, lib. 6. 93
- Ophthalmia in curanda quae lentorem habent incom-
moda, lib. 6. 95
- Ophthalmicis paucissima externa remedia adhiben-
da, lib. 6. 99
- Opiata, ut in alijs ventriculi affectibus fugienda, ita
in dolore inflammatorio eiusdem concedenda, et
quomodo, lib. 7. 101
- Opj vsus frequens in lippitudine malus, lib. 6. 93
- Os coluendum antequam agracibum sumat, lib. 2. 47
- Oximel nostrum imbecille ad crassa incidenda,
lib. 2. 55
- Oximel nostrum in acutis febribus non satis accom-
modatum, lib. 2. 56
- Oximel quando excoquendum, lib. 2. 52
- Oximel seplasiariorum diuersum à Galenico, et Gra-
corum, lib. 2. 52
- Oximel seplasiariorum simplex non est potus, sed
sorbitio, lib. 2. 54
- Oximel seplasiariorum non bene fiat, lib. 2. 54

Oxymellis parandi ratio, lib. 2. 152
Oxyrrhodina applicata ne ficeatur, aut ex crassa ma-
teria applicentur, lib. 6. 2

Oxyrrhodina in capitis dolore magis proficere si ex
alio decidant, lib. 6. 1

Oxyrrhodina narcotica vix admiscenda, lib. 6. 153

37 P 154

Panatella an semper ex pane dato, lib. 2. 154

Panatella quomodo paranda in aceto, lib. 2. 155

Paralytici quando ab initio purgandi, lib. 6. 157

Paralytici si illo curantur, ubi quando, & quatenus ap-
plicanda, lib. 6. 158

Paralyticis diutius optima, lib. 6. 159

Paralyticis olea dissilata, & sola, & mixta, lib. 6. 160

Paralyticis olea nimis calida mala, & sup. 161

Paralyticis olea si curantur, quando, & quatenus, lib. 6. 162

Paralyticis sudorifera non multum commoda, 163

Paralyticis vesicantia utilia, lib. 6. 164

Paralyticis vesicantia si curantur, quando, & quatenus, lib. 6. 165

Partu in difficili raro exhibenda promouentia, se- 166

crunt, lib. 6. 167

Peste obdormire non oportet in praesentia, ex semine reij- 168

ciendi, lib. 6. 169

Peste affecti medicamento purgandi, lib. 5. 170

Peste latente, & deinde erumpente contagium debe- 171

re mitti sanguis, lib. 5. 172

Peste laborantibus ex aeris corruptione raro mis- 173

sendus sanguis, lib. 5. 174

Peste laborantibus ex annonae penuria sanguis non 175

mittendus, lib. 5. 176

Peste laborantibus non semper conveniunt purgatio, 177

& sanguinis emissio, lib. 5. 178

Peste 179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

Pestis laborantibus nunquam mittendus sanguis ad
animi deliquium, lib. 5. 33

Pestis laborantibus sanguis secta vena euacuari po-
test, in qua peste, & quando, lib. 5. 32

Pestis laborantibus solum in principio sanguis mit-
ti potest, & cur, lib. 5. 34

Pestis materia ab initio purganda, lib. 5. 47

Pestis materia cruda dici non potest, lib. 5. 47

Pestis materia maiori ex parteurgens, lib. 5. 47

Pestilentes febres licet per acutae non requirunt re-
missimum tractum, lib. 5. 49

Pestilentes febres sine peste conditionem exposcunt, &
materia, nec in principio in his purganda, lib. 5. 49

Pestilenti in febre maculis vena pusillus exumpert
oculis sanguis secta vena potest euacuari, & quan-
do, & quomodo, lib. 5. 49

Pharmaca glacie, vel aliter refrigerata pessima &
in quibusdam conceduntur, lib. 5. 51

Pharmaca quae miscentur non fiunt ex his quae dispari
tempore operantur, lib. 5. 51

Pharmaco assumpto non dormiendum, & in quibus,
& quando, lib. 5. 51

Pharmaco assumpto gula, aut regioni ventriculi ca-
lida non sunt applicanda, lib. 5. 51

Pharmaco non euacuante, non semper post tres ho-
ras iuscula propinanda, lib. 5. 51

Pharmaco non euacuante, clysmata non indendum, &
quid tunc faciendum, lib. 5. 51

Pharmacorum validorum extracta per vinum, aut
aque vice periculi plena, lib. 5. 51

Phrenitici in principio purgandi, lib. 6. 24

Phreniticis acetum in oxirrhodinis parce adhibendum
lib. 6. 28

I N D E X.

Pleuriticis cucurbitulas appofuit quid faciat,	lib. 6.	31
Pleuriticis in curandis non diu frigidaſſimus, aut narcoticis utendum,	lib. 6.	27
Pleuriticis in curandis repellentia etiam ſole vtriusque principium conveniant,	lib. 6.	26
Pleuriticis non eſt mittendus ſanguis ad animi uſque deliquium,	lib. 6.	21
Pleuriticis ſi in brachio ſecari vena non poſſit, non ſecunda eaque in fronte,	lib. 6.	20
Pleuriticis ſtatim vena ſecunda,	lib. 6.	19
Pothyſi laborantes lacte aſſumpto dormire debent,	lib. 6.	163
Pothyſi laborantibus blande alius mollienda,	lib. 6.	164
Pilule in Gallico morbo laborantibus purgandas in fine præferende,	lib. 7.	198
Pilule in tuſſi, & capitis affectionibus male dantur poſt curam,	lib. 6.	166
Pilule pro capite expurgando maiores, pro ventri- culo minores,	lib. 3.	17
Pilule pro capite purgando à curis non dandæ,	lib. 6.	15
Pilule quando magnæ, & quando parvæ ſunt adhi- bende,	lib. 3.	17
Pilule valendiſſimæ formæ non ſunt magnæ, & curis lib. 3.		18
Pituita falſa quotidianam producente plenius nu- trriendam in principio, ſed à ventriculo turbata eſt materia,	lib. 3.	16
Pleuriticis ceſſante fomentis dolore non conſeſtim deſſiendam à veris remedijs,	lib. 6.	123
Pleuriticis dolore aſcendente fotus ſunt humidi,	lib. 6.	121
Pleuriticis dolore deſcendente in ſeſſione vena non eſt		

I N D E X.

- est expectanda coloris sanguinis mutatio, lib. 6. 117
- Pleuriticis dolore descendente sicci foci esse possunt, lib. 6. 121
- Pleuriticis quando fomenta anodina conueniunt, & quibus, lib. 6. 129
- Pleuriticis sacculi fouentes ex leui materia, lib. 6. 122
- Pleuriticis viribus imbecillibus non expectanda coloris in sanguine mutatio, lib. 6. 118
- Pleuriticorum reliquia omnino absumenda, lib. 6. 125
- Pleuriticorum tria præclarissima remedia, lib. 6. 126
- Podagra laborantibus raro repellentia conueniunt, lib. 7. 189
- Podagra laborantibus an ab initio medicamentum purgans dandum controuersia conciliata, lib. 7. 176
- Podagra laborantibus quando mittendus est sanguis, & quando non, lib. 7. 178
- Podagra laborantibus frequenter secunda raro uena, lib. 7. 179
- Podagrosis inunctio ex oleo salito ante declinationem mala, lib. 7. 182
- Podagrosis non solum oleo salito inungendi, sed etiam perfricandi, lib. 7. 183
- Podagrosis oleum salitum in declinatione optimum, lib. 7. 181
- Potulenta in hydropse ascie sæpe suspecta, lib. 7. 52
- Potus acutarum febrium quis, & qualis, lib. 2. 48
- Præfocatis bene olentia coxis applicanda, lib. 7. 152
- Præfocatis ex flatu cucurbitula magna ventri inferiori applicita præstantissimum remedium, lib. 7. 165
- Præfocatis ex retento semine bene olentibus vulua non inungenda, lib. 7. 151
- Præfocatis facies bene olentibus non est aspergenda, lib. 7. 154
- Præfocatis facies frigida non aspergenda, lib. 7. 153

I N D E X.

Præfocatis pauxillum vini concedendum, sed malevolentia naribus non apponenda, lib. 7.	156
Præfocatis quando etiam in paroxismo secari potest vena, lib. 7.	163
Præfocatis quando non licet secare venâ, lib. 7.	164
Præfocatis vino facies non attluenda lib. 7.	155
Pregnâibus clysteres non frequenter indantur, lib. 3.	20
Pregnantibus grandiori sætu clysteres quantitate non excedant, lib. 3.	21
Præpinguibus , & sensu exquisito præditis intestinis clysteres non indantur multum calentes, lib. 3.	13
Principio morbi cur aliquando tenuissimè cibandum lib. 2.	16
Ptissana ex quo genere bordei paretur, lib. 2.	40
Ptissana ut condidatur quæ addenda, quando, & quomodo, lib. 2.	43
Ptissana ut paretur quomodo bordeum præparabimus, lib. 2.	41
Puelli in applicatione cauendus sudor, lib. 7.	7
Puelli in applicatione cauenda pollutio nocturna, lib. 7.	8
Pueris ante decimumquartum annum euacuationis gratia aliquando secari potest venam, lib. 4.	8
Pueris ante septennium præstat hirundinibus sanguinem mittere, & cur, lib. 4.	10
Pueris , & adolescentibus plus concedendum quam senibus, lib. 2.	7
Pueris nunquam concedenda narcotica, lib. 3.	46
Pueris pro reuulsione secari omninò vena debet, lib. 4.	9
Pulveres , & electuaria, quæ etiam soluant in morbo gallico conuenire, lib. 7.	198
Pulvisculi cardiaci non cum cibis, sed cum potionibus ieiunis dandi, lib. 5.	55

I N D E X.

Fargamenta muliebria non semper frigida, nec calidis curanda, lib. 7. 149

Purgandū agrum interrogare oportet quomodo alias ab assumpto pharmaco se gesserit, lib. 3. 2

Purgandum in principio in peste. Disputatio, lib. 5. 47

Purgandum interrogare oportet an alio sit lubrica, an dura, lib. 3. 3

Purgandum in vera declinatione, lib. 3. 35

Purgandum non semper in declinatione febrium putridarum, lib. 3. 53

Purgandum quando in declinatione febrium putridarum, lib. 3. 34

Purgantia debilia repetita in quotidianis conueniunt, lib. 5. 22

Purgantia sint leuiora in febris, quàm in alijs morbis, & cur, lib. 5. 23

Purgantia valenter apud Galenum in febris raro in usum veniunt, lib. 5. 21

Purgatione in peste utendum, lib. 5. 46

Purgantia valida in peste non conueniunt, lib. 5. 49

Purgatio in podagrosis si facienda statim facienda, lib. 7. 177

Turulentis non tentanda est euacuatio materia per secessum medicamento, lib. 6. 127

Putrida non omnis materia coquenda, lib. 5. 47

Q*uartana laborantibus victus in principio variandus, & quomodo, lib. 5.* 25

Quartana laborantibus salsamenta concedenda, sed parca manu, lib. 5. 126

Quartana laborantibus dum secatur vena presentia medici necessaria, lib. 5. 28

Quartana laborantibus quando è dextro brachio extrahendus sanguis, lib. 5. 31

I N D E X.

Quartanis vene sectio quando conuenit,	lib. 5.	27
Quartanarijs dum sanguis mittitur non statim suppressendus etiamsi bonus,	lib. 5.	29
Quartanarijs sanguis ubi extrahitur etiamsi optimus sinendus aliquando,	lib. 5.	30
Quibus maxime in acutis os coluendum,	lib. 2.	47
Quotidiana in febre ab initio vomitus utilis, & qualis,	lib. 5.	17
Quotidiana in febre quomodo Gal. comendarit vomitum validum post signa concoctionis,	lib. 5.	17
Quotidianis in febribus tenuius etiam quam in statu alendum est in principio,	lib. 5.	15

R

R efrigerantia insigniter quæ capita non ferant,	lib. 6.	6
Remedijs in multis quomodo procedendum,	lib. 3.	36
Remedium præstantissimum ad menses superfluos,	lib. 7.	229
Renibus inflammatis post sectam venam brachij, ea etiam secanda est quæ in talo,	lib. 7.	113
Renibus inflammatis rhabarbari usus suspectus,	lib. 7.	116
Renibus laborantibus clysteres quantitate parua,	lib. 3.	22
Renibus laborantibus quæ vena secanda,	lib. 7.	112
Renibus laborantibus inflammatione clysteres sint leuis quantitatis,	lib. 7.	114
Renibus ulceratis lactis administrandi ratio sit varia,	lib. 7.	120
Renum in inflammatione non purgandum, sed leniendum blandè,	lib. 7.	115
Renum in inflammatione in principio impensè refrigerantia mala,	lib. 7.	117
Renum calculo laborantibus lenientia ab initio sæpè		non

non

non sufficiunt, lib.7.	122
Renum calculo laborantes in initio medicamento vero purgandi, lib.7.	122
Renum in ulceribus validè exsiccantia mala, lib.7.	119
Renum ulcera quamprimum cicatrizanda, lib.7.	118
Repellentia in cholera quomodo, & quando in usum ducenda, lib.7.	25
Repellentia in podagra suspecta, lib.7.	180
Repellentia in palpitatione cordis dum mittitur sanguis reg. cordis applicanda, lib.6.	176
Repellentibus solis in doloribus in principio quando non vitendum, lib.3.	42
Repetita sanguinis missio quādo eadem die, & quando altero, lib.4.	16
Repetitio sanguinis missionis reuulsivæ, quāvis dicat Gal. quod non debet fieri eadem die, sæpè tamen eodem die repetenda, & cur, & quando, lib.4.	17
Reuulsio per sectam venam quando requirat restitutionem partium, & quando consensum venarum, lib.4.	18
Rhabarbari infusio in vino exhibita febres æstuentes excitat, lib.3.	15
Rhabarbari usus in æstuosis febribus suspectus, & quomodo, lib.5.	5
Rhabarbari usus in spūto sanguinis sæpè suspectus, lib.6.	157
Rhabarbari usus dysentericis suspectus, lib.7.	93
Rhabarbaro quando vii possimus pro purganda bile, etiam in æstuosis febribus, lib.5.	8
Rhabarbarum hydropicis inutile, lib.7.	59
Rhabarbarum in dolore inflammatorio ventriculi sumendum, lib.7.	2
Rhabarbarum in inflammatione renum suspectum, lib.7.	116

Rha-

- Rhabarbarum in mensibus superfluis noxium,
lib. 7. 143
- Rhabarbarum pro purganda bile, & in declinatione
astuantium febrium malum, & cur, lib. 5. 7
- Rhabarbarum phreniticis non multum utendum,
lib. 6. 25
- Rhabarbarum suspectum in intemperie calida hepa-
tis, lib. 7. 24
- Rhabarbarum torrefactum in dysenteria reijciendum
lib. 7. 94
- Rubificantia quousque cui adharere debeant,
lib. 6. 77

S

- Sacchari rosati exhibitio post purgatum corpus
in ardentibus febribus non multum probanda,
lib. 5. 12
- Sal clysteribus non ita frequenter indendus, lib. 3.
caut. 29
- Sal oleum quomodo falsum reddat, si oleo non liqua-
tur, lib. 7. 184
- Salzæ decocto portio guaiaci cur indenda, lib. 7. 210
- Salzæ decoctum æstate cum maiori quantitate aquæ
parandum, ut longiori tempore coctio perduret,
lib. 7. 211
- Salzæ pariliæ mirabile decoctum ad tabidos ex gal-
lico morbo, lib. 7. 213
- Sanguine malo secta vena exente minor quantitas
illius euacuanda, lib. 4. 2
- Sanguinis in colore mutatio in euacuatiua euacuatio-
ne non reuulsiva non expectanda, lib. 4. 3
- Sanguinis in colore mutatio nec in reuulsione etiam
perpetuò expectanda, lib. 4. 4
- Sanguinis in colore mutatio quomodo intelligenda,
lib. 4. 5

I N D E X.

- Sanguinis in colore mutatio in reuulsione à longin-
quis non expectanda, lib. 4. 6*
- Sanguinis in colore mutatio in Pleuritide non est ex-
pectanda in parte humore, lib. 6. 119*
- Sanguinis missioni non semper præmitenda alui leni-
tio, lib. 4. 1*
- Sanguinis missio ad animi deliquium raro in usum
ducenda, à quibus, & cur, lib. 4. 19*
- Sanguinis missio per se à centro ad circumferentiam
trahit, & quomodo, lib. 5. 35*
- Sanguinis missio per accidens ubi copiosa sit trahit
ad centrum, lib. 5. 33*
- Sanguinis missionem quando præcedere debeat æ-
rum subductio, lib. 4. 20*
- Sanguinis minus detrahendum ijs, qui artes laborio-
sas exercent, lib. 4. 14*
- Sanguinis repetita euacuatio quomodo facienda,
lib. 4. 15*
- Sanguinem reiectantibus cucurbitula parti affixa
quando conueniat, lib. 6. 150*
- Sanguinis sputo ex relictis mensibus quæ vena se-
canda, lib. 6. 148*
- Saponaria decoctum pro pauperibus pro morbo gal-
lico, lib. 7. 214*
- Scammonij usus in æstuosis febris suspectus, & quo-
modo eo utendum, lib. 5. 9*
- Scarificatio crurum in peste saluberrima, lib. 5. 38*
- Scarificatio quando profunda facienda, & quando le-
uiter, lib. 4. 25*
- Sectio venæ in talo ad mouendos menses melis fit
sub noctem, lib. 7. 135*
- Seminis in curando profluuium diuersa ratio seruanda
pro varietate magnæ occasionis, lib. 7. 127*
- Serîe lacte segregandi vera medica regula, lib. 3. 58*
- Serî**

Oxymellis parandi ratio, lib. 2. 52
Oxirrhodina applicata ne siccetur, aut ex crassa ma-
teria applicentur, lib. 6. 2

Oxirrhodina in capitis dolore magis proficere si ex
alto decidunt, lib. 6. 7. 52

Oxirrhodina narcotica vix admittenda, lib. 6. 53

P

Panatella an semper ex pane dato, lib. 2. 44

Panatella quomodo paranda in aculeis, lib. 2. 43

Paralytici quando ab initio purgandi, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, quando, et quatenus ap-
plicanda, lib. 6. 7. 52

Paralytici si oleum bibant, optima, lib. 6. 74

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Paralytici si oleum bibant, si oleum bibant, lib. 6. 73

Peste

Peste laborantibus nunquam mittendus sanguis ad
animi deliquium, lib. 5. 33

Peste laborantibus sanguis secta vena euacuari po-
test, in qua peste, & quando, lib. 5. 32

Peste laborantibus solum in principio sanguis mit-
ti potest, & cur, lib. 5. 34

Pestis materia ab initio purganda, lib. 5. 47

Pestis materia cruda dici non potest, lib. 5. 47

Pestis materia maiori ex parteurgens, lib. 5. 47

Pestilentes febres licet per acuta non requirunt de-
missimum remedium, lib. 5. 49

Resistentes febres sine peste rationem exposcunt
materia, nec in principio in ijs purgandum, lib. 5. 49

Pestilenti in febre maculis & bubulis ex eruptis
oculis sanguis secta vena potest euacuari, & quan-
do, & quomodo, lib. 5. 49

Pharmaca glacie, vel aliter refrigerata pessima &
quibusdam conceduntur, lib. 5. 49

Pharmaca que miscentur non fiunt ex ijs que dispari
tempore operantur, lib. 5. 49

Pharmaco assumpto non dormiendum, & in quibus,
& quando, lib. 5. 49

Pharmaco assumpto gula, aut regioni ventriculi ca-
lida non sunt applicanda, lib. 5. 49

Pharmaco non euacuante, non semper post tres ho-
ras iuscula propinanda, lib. 5. 49

Pharmaco non euacuante, clyfma non indendum, &
quid tunc faciendum, lib. 5. 49

Pharmacorum validorum extracta per vinum, aut
aqua vite periculi plena, lib. 5. 49

Phrenitici in principio purgandi, lib. 6. 24

Phreniticis acetum in oxirrhodinis parce adhibendu
lib. 6. 28

I N D E X.

<i>Præfocatis pauxillum vini concedendum, sed male</i>	
<i>olentia naribus sunt apponenda, lib. 7.</i>	156
<i>Præfocatis quando etiam in paroxismo secari potest</i>	
<i>vena, lib. 7.</i>	162
<i>Præfocatis quando non licet secare venâ, lib. 7.</i>	164
<i>Præfocatis vino facies non attluenda, lib. 7.</i>	155
<i>Pregnâribus clysteres non frequenter indantur, lib. 3.</i>	20
<i>Pregnantibus grandiori fœtu clysteres quantitate</i>	
<i>non excedant, lib. 3.</i>	21
<i>Præpinguibus, & sensu exquisito præditis intestinis</i>	
<i>clysteres non indantur multum calentes, lib. 3.</i>	13
<i>Principio morbi cur aliquando tenuissimè cibandum</i>	
<i>lib. 2.</i>	16
<i>Ptissana ex quo genere bordei paretur, lib. 2.</i>	40
<i>Ptissana ut condidatur quæ addenda, quando, & quo-</i>	
<i>modo, lib. 2.</i>	43
<i>Ptissana ut paretur quomodo bordeum præparabi-</i>	
<i>mus, lib. 2.</i>	41
<i>Puelli in applicatione cauendus sudor, lib. 7.</i>	7
<i>Puelli in applicatione cauenda pollutio nocturna,</i>	
<i>lib. 7.</i>	8
<i>Pueris ante decimumquartum annum euacuationis</i>	
<i>gratia aliquando secari potest venam, lib. 4.</i>	8
<i>Pueris ante septennium præstat birundinibus san-</i>	
<i>guinem mittere, & cur, lib. 4.</i>	10
<i>Pueris, & adolescentibus plus concedendum quàm</i>	
<i>senibus, lib. 2.</i>	7
<i>Pueris nunquam concedenda narcotica, lib. 3.</i>	46
<i>Pueris pro reuulsione secari omninò vena debet,</i>	
<i>lib. 4.</i>	9
<i>Pulveres, & electuaria, quæ etiam soluant in morbo</i>	
<i>gallico conuenire, lib. 7.</i>	198
<i>Pulvisculi cardiaci non cum cibis, sed cum potioni-</i>	
<i>bus ieiunis dandi, lib. 5.</i>	55

I N D E X.

Purgantia muliebria non semper frigida, nec calidis curanda, lib. 7. 149

Purgandū agrum interrogare oportet quomodo alias ab assumpto pharmaco se gesserit, lib. 3. 2

Purgandum in principio in peste. Disputatio, lib. 5. 47

Purgandum interrogare oportet an aluo sit lubrica, an dura, lib. 3. 3

Purgandum in vera declinatione, lib. 3. 55

Purgandum non semper in declinatione febrium putridarum, lib. 3. 53

Purgandum quando in declinatione febrium putridarum, lib. 3. 54

Purgantia debilia repetita in quotidianis conueniunt, lib. 5. 22

Purgantia sint leuiora in febribus, quàm in alijs morbis, & cur, lib. 5. 25

Purgantia valenter apud Galenum in febribus raro in usum veniunt, lib. 5. 21

Purgatione in peste utendum, lib. 5. 46

Purgantia valida in peste non conueniunt, lib. 5. 49

Purgatio in podagrosis si facienda statim facienda, lib. 7. 177

Purulentis non tentanda est euacuatio materie per secessum medicamento, lib. 6. 127

Putrida non omnis materia coquenda, lib. 5. 47

Q*uartana laborantibus victus in principio variandus, & quomodo, lib. 5.* 25

Quartana laborantibus salsamenta concedenda, sed parca manu, lib. 5. 26

Quartana laborantibus dum secatur vena presentia medici necessaria, lib. 5. 28

Quartana laborantibus quando è dextro brachio extrahendus sanguis, lib. 5. 31

I N D E X.

<i>Quartanis venæ sectio quando conuenit,</i>	<i>lib. 5.</i>	27
<i>Quartanarijs dum sanguis mittitur non statim sup-</i>		
<i>primendus etiamsi bonus,</i>	<i>lib. 5.</i>	29
<i>Quartanarijs sanguis ubi extrahitur etiamsi optimus</i>		
<i>sinendus aliquando,</i>	<i>lib. 5.</i>	30
<i>Quibus maxime in acutis os coluendum,</i>	<i>lib. 2.</i>	47
<i>Quotidiana in febre ab initio vomitus utilis, & qua-</i>		
<i>lis,</i>	<i>lib. 5.</i>	17
<i>Quotidiana in febre quomodo Gal. comendarit vo-</i>		
<i>mitum validum post signa concoctionis,</i>	<i>lib. 5.</i>	17
<i>Quotidianis in febribus tenuius etiam quam in statu</i>		
<i>alendum est in principio,</i>	<i>lib. 5.</i>	15
R		
<i>R</i> efrigerantia insigniter quæ capita non ferant,	<i>lib. 6.</i>	6
<i>Remedijs in multis quomodo procedendum,</i>	<i>lib. 3.</i>	36
<i>Remedium præstantissimum ad menses superfluos,</i>		
<i>lib. 7.</i>		229
<i>Renibus inflammatis post sectam venam brachij, ea</i>		
<i>etiam secanda est quæ in talo,</i>	<i>lib. 7.</i>	113
<i>Renibus inflammatis rhabarbari usus suspectus,</i>		
<i>lib. 7.</i>		116
<i>Renibus laborantibus clysteres quantitate parua,</i>		
<i>lib. 3.</i>		22
<i>Renibus laborantibus quæ vena secanda,</i>	<i>lib. 7.</i>	112
<i>Renibus laborantibus inflammatione clysteres sint le-</i>		
<i>uis quantitatis,</i>	<i>lib. 7.</i>	114
<i>Renibus ulceratis lactis administrandi ratio sit va-</i>		
<i>ria,</i>	<i>lib. 7.</i>	120
<i>Renum in inflammatione non purgandum, sed lenien-</i>		
<i>dum blandè,</i>	<i>lib. 7.</i>	115
<i>Renum in inflammatione in principio impensè refri-</i>		
<i>gerantia mala,</i>	<i>lib. 7.</i>	117
<i>Renum calculo laborantibus lenientia ab initio sæpè</i>		
<i>non</i>		

non sufficiunt, lib.7.	122
Renum calculo laborantes in initio medicamento ve- ro purgandi, lib.7.	122
Renum in ulceribus valide exsiccatia mala, lib.7.	119
Renum ulcera quamprimū cicatrizanda, lib.7.	118
Repellentia in cholera quomodo, & quando in usum ducenda, lib.7.	25
Repellentia in podagra suspecta, lib.7.	180
Repellentia in palpitatione cordis dum mittitur san- guis reg. cordis applicanda, lib.6.	176
Repellentibus solis in doloribus in principio quando non vitendum, lib.3.	42
Repetita sanguinis missio quādo eadem die, & quan- do altero, lib.4.	16
Repetitio sanguinis missionis reuulsiva, quāvis dicat Gal. quod non debet fieri eadem die, sæpè tamen eodem die repetenda, & cur. & quando, lib.4.	17
Reuulsio per sectam venam quando requirat rectitu- dinem partium, & quando consensum venarum, lib.4.	18
Rhabarbari infusio in vino exhibita febres æstuentes excitat, lib.3.	15
Rhabarbari usus in æstuosis febribus suspectus, & quomodo, lib.5.	5
Rhabarbari usus in sputo sanguinis sæpè suspectus, lib.6.	157
Rhabarbari usus dysentericis suspectus, lib.7.	93
Rhabarbaro quando vii possimus pro purganda bile, etiam in æstuosis febribus, lib.5.	8
Rhabarbarum hydropicis inutile, lib.7.	59
Rhabarbarum in dolore inflammatorio ventriculi su- giendum, lib.7.	2
Rhabarbarum in inflammatione renum suspectum, lib.7.	116

Rha-

I N D E X.

Morbus cum ignoratur attenuandus victus cur, & quomodo, lib. 2.	13
Moschus in umbilici cauitate prefocationem gignit, lib. 7.	160
Mulsa alia cruda, alia cocta, lib. 2.	50
Mulsa alia pro medicamento, alia pro potu, lib. 2.	50
Mulsa alia meracissima, alia mediocris, alia diluta, lib. 2.	50
Mulsa ex saccharo optima quomodo paretur, lib. 2.	51
Mulsa, vel melicrati distinctio, & consiciendi ratio, lib. 2.	50

N

Narcotica in capitis dolore ratione doloris vix adhibenda, sed aliquando ratione vigiliarum, lib. 6.	4
Narcotica in dolore capitis per se vix per os concedenda, lib. 6.	5
Narcotica in dysenteria etiam in principio quando conueniunt, lib. 7.	99
Narcoticis in dysenteria parce utendum, lib. 7.	100
Narcotica nunquam applicanda futuris capitis, lib. 3.	44
Narcotica nunquam auribus immittenda, lib. 3.	45
Narcotica nunquam in pueris in usum ducenda, lib. 3.	46
Narcoticis raro utendum, & quando, lib. 3.	43
Nausea laborantes quando purgandi, & quando non, lib. 7.	31
Nausea presente, vomitu excitato in eo non multum insistentium, lib. 7.	10

O

Obstetricibus aut asserentibus, aut negantibus graviditatem medico non temere credendum, lib. 7.	169
--	-----

Ob.

INDEX.

Obstetricibus temerè non credendum cùm assertum
factum esse mortuum, vi excludendum esse.

lib. 7. 170

Olea in colicis data adiuuanda cum abstergentibus,
vel purgantibus, lib. 7. 74

Olea stillata in usum non veniant, nisi alijs allegata
lib. 6. 72

Oleis cur cera addenda, lib. 6. 72

Oleum amygdalinum à partu, neque semper, neq; quib-
usvis conuenit, lib. 7. 174

Oleum per os sumptum quando in colicis optimum
presidium, lib. 7. 73

Oleum rosatum pro oxirrhodinis sit recens, lib. 6. 10

Ophthalmia in curanda opj usus neque minus, ne-
que frequens, lib. 6. 93

Ophthalmia in curanda qua lentorem habent incom-
moda, lib. 6. 95

Ophthalmicis paucissima externa remedia adhiben-
da, lib. 6. 99

Opiata, ut in alijs ventriculi affectibus fugienda, ita
in dolore inflammatorio eiusdem concedenda, &
quomodo, lib. 7. 175

Opj usus frequens in lippitudine malus, lib. 6. 93

Os coluendum antequam agræ cibum sumat, lib. 2. 47

Oximel nostrum imbecille ad crassa incidenda,
lib. 2. 55

Oximel nostrum in acutis febribus non satis accom-
modatum, lib. 2. 56

Oximel quandiu excoquendum, lib. 2. 52

Oximel seplasiariorum diuersum à Galenico, & Gra-
corum, lib. 2. 52

Oximel seplasiariorum simplex non est potus, sed
sorbitio, lib. 2. 54

Oximel seplasiariorum non humectat, lib. 2. 54

I 3 Oxi-

Oxymellis parandi ratio, lib. 2. 152
Oxirrhodina applicata ne siccentur, aut ex crassa ma-
teria applicentur, lib. 6. 2

Oxirrhodina in capitis dolore magis proficere si ex
alto decident, lib. 6. 7. 153

Oxirrhodina narcotica rix admiscenda, lib. 6. 153

P

Panatella an semper lex paranda, lib. 2. 44

Panatella quomodo paranda in aceto, lib. 2. 44

Paralytici quando ab initio purgandi, lib. 6. 157

Paralytici si oleum tithum quando, quatenus ap-
plicande, lib. 6. 158

Paralytici si inter se optima, lib. 6. 159

Paralytici si oleum illud quod sola in uilia, lib. 6. 159

Paralytici si oleum nimis calidum, lib. 6. 159

Paralytici si oleum quodammodo conveniunt, lib. 6. 159

Paralytici si sudorifera non multum commoda,
lib. 6. 159

Paralytici si vesicantia utilia, lib. 6. 159

Purabonum quodammodo proacibus paracurientium,
lib. 6. 159

Partu in difficili raro exhibenda promouentia se-
cundum, lib. 6. 159

Peste odorata in praesentia ex semine rei,
lib. 6. 159

Peste affecti medicamento purgandi, lib. 5. 159

Peste laborantibus delenda exuperantia contagium de-
mitti sanguis, lib. 5. 159

Peste laborantibus ex aeris corruptione raro mis-
cendus sanguis, lib. 5. 159

Peste laborantibus ex annonae penuria sanguis non
mittendus, lib. 5. 159

Peste laborantibus non semper conveniunt purgatio,
et sanguinis missio, lib. 5. 159

Peste

- Peste laborantibus nunquam mittendus sanguis ad
animi deliquium, lib. 5. 33
- Peste laborantibus sanguis secta vena euacuari po-
test, in qua peste, & quando, lib. 5. 32
- Peste laborantibus solum in principio sanguis mit-
ti potest, & cur, lib. 5. 34
- Pestis materia ab initio purganda, lib. 5. 47
- Pestis materia cruda dici non potest, lib. 5. 47
- Pestis materia maiori ex parteurgens, lib. 5. 47
- Pestilentes febres licet per acutae non requirunt re-
missimum, lib. 5. 47
- Residentes febres sine peste conditionem exposcunt, &
materia, nec in principio in ijs purgandum, lib. 5. 47
- Pestilenti in febre maculis & erupitionibus exuuntur
oculis sanguis secta vena potest euacuari, & quan-
do, & quomodo, lib. 5. 47
- Pharmaca glacie, vel aliter refrigerata pessime a-
quibusdam conceduntur, lib. 5. 47
- Pharmaca que miscentur non fiunt ex ijs, que dispari-
tempore operantur, lib. 5. 47
- Pharmaco assumpto non dormiendum, & in quibus,
& quando, lib. 5. 47
- Pharmaco assumpto gula, aut regioni ventriculi ca-
lida non sunt applicanda, lib. 5. 47
- Pharmaco non euacuante, non semper post tres ho-
ras iuscula propinanda, lib. 5. 47
- Pharmaco non euacuante, clyσμα non indendum, &
quid tunc faciendum, lib. 5. 47
- Pharmacorum validorum extracta per vinum, aut
aqua vite periculi plena, lib. 5. 47
- Phrenitici in principio purgandi, lib. 6. 28
- Phrenitici acetum in oxirrhodinis parce adhibendu
lib. 6. 28

I N D E X.

<i>Phreniticis cucurbitulis apposis quid faciendum.</i>	
lib. 6.	23
<i>Phreniticis in curandis non diu frigidissimis, aut narcoticis utendum.</i>	lib. 6.
	27
<i>Phreniticis in curandis repellentia etiam sola ultra principium conveniunt.</i>	lib. 6.
	26
<i>Phreniticis non est mittendus sanguis ad animi usque deliquium.</i>	lib. 6.
	21
<i>Phreniticis si in brachio secari vena non potest, non secanda ea, quæ in fronte.</i>	lib. 6.
	20
<i>Phreniticis statim vena secanda.</i>	lib. 6.
	19
<i>Phthysi laborantes lacte assumpto dormire debent.</i>	lib. 6.
	163
<i>Phthysi laborantibus blande alius mollienda.</i>	lib. 6.
	164
<i>Pilule in Gallico morbo laborantibus purgandis in sine præferenda.</i>	lib. 7.
	198
<i>Pilule in tussi, & capitis affectibus male dantur post cenam.</i>	lib. 6.
	166
<i>Pilule pro capite expurgando maiores, pro ventriculo minores.</i>	lib. 3.
	17
<i>Pilule pro capite purgando à cena non dandæ.</i>	lib. 6.
	15
<i>Pilule quando magnæ, & quando parvæ sunt adhibendæ.</i>	lib. 3.
	17
<i>Pilule validissima forma non sint magnæ, & cur.</i>	lib. 3.
	18
<i>Tijuita salsa quotidianam producente plenius nutriendum in principio, sed à ventriculo deturbanda est materia.</i>	lib. 5.
	16
<i>Pleuriticis cessante fomentis dolore non confestim desistendum à veris remedijs.</i>	lib. 6.
	123
<i>Pleuriticis dolore ascendente foci sunt humidi.</i>	lib. 6.
	121
<i>Pleuriticis dolore descendente in sectione vena non est</i>	

INDEX.

- est expectanda coloris sanguinis mutatio, lib. 6. 117
 Pleuriticis dolore descendente sicci foci esse possunt, lib. 6. 121
 Pleuriticis quando fomenta anodina conveniunt, & quibus, lib. 6. 129
 Pleuriticis sacculi fontes ex levi materia, lib. 6. 122
 Pleuriticis viribus imbecilibus non expectanda coloris in sanguine mutatio, lib. 6. 118
 Pleuriticorum reliquia omnino absumenda, lib. 6. 125
 Pleuriticorum tria præclarissima remedia, lib. 6. 126
 Podagra laborantibus raro repellentia conveniunt, lib. 7. 180
 Podagra laborantibus an ab initio medicamentum purgans dandum controuersia conciliata, lib. 7. 176
 Podagra laborantibus quando mittendus est sanguis, & quando non, lib. 7. 178
 Podagra laborantibus frequenter secunda raro vena, lib. 7. 179
 Podagrosis inunctio ex oleo salito ante declinationem mala, lib. 7. 182
 Podagrosis non solum oleo salito inungendi, sed etiam perfricandi, lib. 7. 183
 Podagrosis oleum salitum in declinatione optimum, lib. 7. 181
 Potulenta in hydropse ascite sæpe suspecta, lib. 7. 52
 Potus acutarum febriam quis, & qualis, lib. 2. 48
 Præfocatis bene olentia coxis applicanda, lib. 7. 152
 Præfocatis ex flatu cucurbitula magna ventri inferiori applicita præstantissimum remedium, lib. 7. 165
 Præfocatis ex retento semine bene olentibus vulua non inungenda, lib. 7. 151
 Præfocatis facies bene olentibus non est aspergenda, lib. 7. 154
 Præfocatis facies frigida non aspergenda, lib. 7. 153

I N D E X.

Præfocatis pauxillum vini concedendum, sed male	
olentia naribus sunt apponenda, lib. 7.	156
Præfocatis quando etiam in paroxismo secari potest	
vena, lib. 7.	162
Præfocatis quando non licet secare venâ, lib. 7.	164
Præfocatis vino facies non attluenda, lib. 7.	155
Pregnâibus clysteres non frequenter indantur, lib. 3.	20
Pregnantibus grandiori fœtu clysteres quantitate	
non excedant, lib. 3.	21
Præpinguibus, & sensu exquisito præditis intestinis	
clysteres non indantur multum calentes, lib. 3.	13
Principio morbi cur aliquando tenuissimè cibandum	
lib. 2.	16
Psissana ex quo genere bordei paretur, lib. 2.	40
Psissana ut condidatur quæ addenda, quando, & quo-	
modo, lib. 2.	43
Psissana ut paretur quomodo bordeum præparabi-	
mus, lib. 2.	41
Puelli in applicatione cauendus sudor, lib. 7.	7
Puelli in applicatione cauenda pollutio nocturna,	
lib. 7.	8
Pueris ante decimumquartum annum euacuationis	
gratia aliquando secari potest venam, lib. 4.	8
Pueris ante septennium præstat hirundinibus san-	
guinem mittere, & cur, lib. 4.	10
Pueris, & adolescentibus plus concedendum quàm	
senibus, lib. 2.	7
Pueris nunquam concedenda narcotica, lib. 3.	46
Pueris pro reuulsione secari omninò vena debet,	
lib. 4.	9
Pulveres, & electuaria, quæ etiam soluant in morbo	
gallico conuenire, lib. 7.	198
Pulvisculi cardiaci non cum cibus, sed cum potioni-	
bus ieiunis dandi, lib. 5.	55

I N D E X.

P urgamentū muliebria non semper frigida, nec calidis curanda, lib. 7.	149
P urgandū agrum interrogare oportet quomodo alias ab assumpto pharmaco se gesserit, lib. 3.	2
P urgandum in principio in peste. Disputatio, lib. 5.	47
P urgandum interrogare oportet an alio sit lubrica, an dura, lib. 3.	3
P urgandum in vera declinatione, lib. 3.	55
P urgandum non semper in declinatione febrium putridarum, lib. 3.	53
P urgandum quando in declinatione febrium putridarum, lib. 3.	54
P urgantia debilia repetita in quotidianis conueniunt, lib. 5.	22
P urgantia sint leuiora in febribus, quàm in alijs morbis, & cur, lib. 5.	23
P urgantia valentius apud Galenum in febribus raro in usum veniunt, lib. 5.	21
P urgatione in peste utendum, lib. 5.	46
P urgantia valida in peste non conueniunt, lib. 5.	49
P urgatio in podagrosis si facienda statim facienda, lib. 7.	177
P urulentis non tentanda est euacuatio materie per secessum medicamento, lib. 6.	127
P utrida non omnis materia coquenda, lib. 5.	47
Q	
Q uartana laborantibus victus in principio variandus, & quomodo, lib. 5.	25
Q uartana laborantibus salsamenta concedenda, sed parca manu, lib. 5.	26
Q uartana laborantibus dum secatur vena presentia medici necessaria, lib. 5.	28
Q uartana laborantibus quando è dextro brachio extrahendus sanguis, lib. 5.	31

- Quartanis venæ sectio quando convenit, lib. 5. 27
 Quartanarijs dum sanguis mittitur non statim sup-
 primendus etiamsi bonus, lib. 5. 29
 Quartanarijs sanguis ubi extrahitur etiamsi optimus
 sinendus aliquando, lib. 5. 30
 Quibus maximè in acutis os coluendum, lib. 2. 47
 Quotidiana in febre ab initio vomitus utilis, & qua-
 lis, lib. 5. 17
 Quotidiana in febre quomodo Gal. comendarit vo-
 mitum validum post signa concoctionis, lib. 5. 17
 Quotidianis in febribus tenuius etiam quam in statu
 alendum est in principio, lib. 5. 15
- R
- Refrigerantia insigniter quæ capita non ferant,
 lib. 6. 6
 Remedijs in multis quomodo procedendum, lib. 3. 36
 Remedium præstantissimum ad menses superfluos,
 lib. 7. 229
 Renibus inflammatis post sectam venam brachij, ea
 etiam secanda est quæ in talo, lib. 7. 113
 Renibus inflammatis rhabarbari usus suspectus,
 lib. 7. 116
 Renibus laborantibus clysteres quantitate parva,
 lib. 3. 22
 Renibus laborantibus quæ vena secanda, lib. 7. 112
 Renibus laborantibus inflammatione clysteres sint le-
 nis quantitatis, lib. 7. 114
 Renibus ulceratis lactis administrandi ratio sit va-
 ria, lib. 7. 120
 Renum in inflammatione non purgandum, sed lenien-
 dum blandè, lib. 7. 115
 Renum in inflammatione in principio impensè refri-
 gerantia mala, lib. 7. 117
 Renum calculo laborantibus lenientia ab initio sæpè
 non

non sufficiunt, lib.7.	122
Renum calculo laborantes in initio medicamento vero purgandi, lib.7.	122
Renum in ulceribus valide exsiccantia mala, lib.7.	119
Renum ulcera quamprimum cicatrizanda, lib.7.	118
Repellentia in cholera quomodo, & quando in usum ducenda, lib.7.	25
Repellentia in podagra suspecta, lib.7.	180
Repellentia in palpitatione cordis dum mittitur sanguis reg. cordis applicanda, lib.6.	176
Repellentibus solis in doloribus in principio quando non vitendum, lib.3.	42
Repetita sanguinis missio quādo eadem die, & quando altero, lib.4.	16
Repetitio sanguinis missionis reuulsivæ, quāvis dicat Gal. quod non debet fieri eadem die, sæpè tamen eodem die repetenda, & cur, & quando, lib.4.	17
Reuulsio per sectam venam quando requirat restitutionem partium, & quando consensum venarum, lib.4.	18
Rhabarbari infusio in vino exhibita febres æstuentes excitat, lib.3.	15
Rhabarbari usus in æstuosis febribus suspectus, & quomodo, lib.5.	5
Rhabarbari usus in sputo sanguinis sæpè suspectus, lib.6.	157
Rhabarbari usus dysentericis suspectus, lib.7.	93
Rhabarbaro quando vii possimus pro purganda bile, etiam in æstuosis febribus, lib.5.	8
Rhabarbarum hydropicis inutile, lib.7.	59
Rhabarbarum in dolore inflammatorio ventriculi suffragandum, lib.7.	2
Rhabarbarum in inflammatione renum suspectum, lib.7.	116

Rha-

- Rhabarbarum in mensibus superfluis noxium,
lib.7. 143
- Rhabarbarum pro purganda bile, & in declinatione
astuantium febrium malum, & cur, lib.5. 7
- Rhabarbarum phreniticis non multum utendum,
lib.6. 25
- Rhabarbarum suspectum in intemperie calida hepatis,
lib.7. 24
- Rhabarbarum torrefactum in dysenteria rejciendum
lib.7. 94
- Rubificantia quousque cuti adharere debeant,
lib.6. 77
- S**acchari rosati exhibitio post purgatum corpus
in ardentibus febribus non multum probanda,
lib.5. 12
- Sal clysteribus non ita frequenter indendus,
lib.3. 29
caut.
- Sal oleum quomodo falsum reddat, si oleo non liquatur,
lib.7. 184
- Salzæ decocto portio guaiaci cur indenda, lib.7. 210
- Salzæ decoctum æstate cum maiori quantitate aque
parandum, ut longiori tempore coctio perduret,
lib.7. 211
- Salzæ pariliæ mirabile decoctum ad tabidos ex gallico morbo,
lib.7. 213
- Sanguine malo secta vena exeunte minor quantitas
illius euacuanda, lib.4. 2
- Sanguinis in colore mutatio in euacuatiua euacuatione
non reuulsiva non expectanda, lib.4. 3
- Sanguinis in colore mutatio nec in reuulsione etiam
perpetuo expectanda, lib.4. 4
- Sanguinis in colore mutatio quomodo intelligenda,
lib.4. 5

I N D E X.

- Sanguinis in colore mutatio in reuulsione à longin-
quis non expectanda, lib. 4. 6
- Sanguinis in colore mutatio in Pleuritide non est ex-
pectanda impacto in parte humore, lib. 6. 119
- Sanguinis missioni non semper præmitenda alui leni-
tio, lib. 4. 1
- Sanguinis missio ad animi deliquium raro in sum-
ducenda, à quibus, & cur, lib. 4. 19
- Sanguinis missio per se à centro ad circumferentiam
trahit, & quomodo, lib. 5. 35
- Sanguinis missio per accidens ubi copiosa sit trahit
ad centrum, lib. 5. 35
- Sanguinis missionem quando præcedere debeat æ-
rum subductio, lib. 4. 20
- Sanguinis minus detrahendum ijs, qui artes laborio-
sas exercent, lib. 4. 14
- Sanguinis repetita euacuatio quomodo facienda,
lib. 4. 15
- Sanguinem reiectantibus cucurbitula parti affixa
quando conueniat, lib. 6. 150
- Sanguinis sputo ex retentis mensibus quæ uena se-
canda, lib. 6. 148
- Saponaria decoctum pro pauperibus pro morbo gal-
lico, lib. 7. 214
- Scammony usus in astuosis febris suspectus, & quo-
modo eo utendum, lib. 5. 9
- Scarificatio crurum in peste saluberrima, lib. 5. 38
- Scarificatio quando profunda facienda, & quando le-
uiter, lib. 4. 25
- Sectio venæ in talo ad mouendos menses melis fit
sub noctem, lib. 7. 135
- Seminis incurando profluuio diuersa ratio seruanda
pro varietate magnæ occasionis, lib. 7. 127
- Serè lacte segregandi vera medica regula, lib. 3. 58
- Seri

I N D E X.

Seri quantitas variè à varijs tradita quomodo concilianda , lib. 3.	51
Siccantibus valenter in sputo sanguinis emplastrica miscenda , lib. 6.	162
Siti in magna ex aestu, & bilioso humore frigida bibenda , lib. 7.	19
Siti in magna ex salsa pituita calida bibenda , lib. 7.	19
Situ quali ponendi agri dum cibum assumunt , lib. 2.	46
Somnus in principio accessionum aliquandò concedendus, & qua occasione , lib. 2.	61
Somnus modum excedens in acutis febribus quando permittendus , lib. 2.	62
Somnifera in peruigilio qua hora exhibenda , lib. 6.	39
Somnifera danda non nisi post parcam cœnam , lib. 6.	43
Somnifera non danda in principio paroxysmi , lib. 6.	44
Somnifera parcius in pueris usurpanda , lib. 6.	41
Somnifera repleto corpore, vel capite non administranda , lib. 6.	42
Somniferorum usus non multum frequens esse debet, lib. 6.	40
Splene obstructo validis attenuantibus, & resolventibus non utendum ab initio , lib. 7.	56
Splene obstructo, & duro prius emolliendum mox resolvendum , lib. 7.	57
Splene obstructo alternis molliendum, resolvendum, & repetendum , lib. 7.	58
Splen per latium expurgari vix potest, lib. 7.	61
Spleneticis laxantibus etiam adstringentia miscenda contra Mercur. lib. 7.	60

Sple-

INDEX.

<i>Spleneticis mollientia resolventibus, & attenuantibus non miscenda, lib. 7.</i>	59
<i>Sputo sanguinis curando quando valenter siccantia conueniunt, lib. 6.</i>	158
<i>Sputo sanguinis laborantibus quæ vena secanda, lib. 6.</i>	148
<i>Sputo sanguinis laborantes ex acri sanguine statim purgandi, lib. 6.</i>	154
<i>Sputo sanguinis laborantibus topica sæpè mutanda, lib. 6.</i>	160
<i>Sputo sanguinis valida medicamentis non conueniunt, lib. 5.</i>	155
<i>Sputo nimis ad os affluente cum periculo suffocationis quid faciendum in perunctis, lib. 7.</i>	230
<i>Sternutatoria in apoplexia quando admittenda, lib. 6.</i>	69
<i>Sternutatoria in oculorum morbis fugienda, lib. 6.</i>	91
<i>Stibij virum in peste pessimum, lib. 5.</i>	50
<i>Sudores in peste quando promouendi, & quando non, lib. 5.</i>	52
<i>Sudores non statim ab assumpto sudorifero arte proliciendi, lib. 7.</i>	208
<i>Sudoribus in proliciendis quæ cautio adhibenda, lib. 7.</i>	205
<i>Sudorifera alexipharmaca non assumenda antè inunctiones contra communem usum etiam doctissimorum virorum, & cur, lib. 7.</i>	226
<i>Sudorifera alexipharmaca post inunctiones optima, lib. 7.</i>	227
<i>Sudoris in peste provocatio in principio pessima, lib. 5.</i>	52
<i>Suffitus ex cinnabari in cura morbi gallici quando præferendi, lib. 7.</i>	218
<i>Suffumigia antequam fiant in corpore calor excitandus,</i>	

- duſ* ; lib. 7. 212
Suffumigia etiam ore ſepè excipienda ; lib. 7. 212
Suffumigia lenia Fallopij, & Mercati in morbo gal-
lico inuſita ; lib. 7. 219
Suffumigiꝝ una formula pro curatione vniuſuſque
lib. 7. 220
Suppuratiſ diuretica conueniunt ; quod materiam
per urinam aliquandò expurget natura ; lib. 6. 228
Suppuratiſ quomodo vomitus excitandus ; lib. 6. 231
Suppuratiſ vomitus periculofus ; lib. 6. 230
Symptomaticè natura operante quid à medico mol-
liendum ; lib. 3. 260
Symptomaticè natura operante cauſe agendum ;
lib. 3. 261
Synocha laborantibus quando eibus offerendus ;
lib. 2. 30
Syrupi acetofi parandi ratio ; lib. 2. 32
Syrupus, & mel roſ. ſolut. quando in principio con-
cedenda ; lib. 3. 50
Syrupus ex cicorea cum rhabarbaro Guglielmi in
dysenteria admittendus ; lib. 7. 93
Syrupis pro morbi Gallici materia paranda alexi-
pharmaca miſcenda ; lib. 7. 195
Syrupus roſ. ſolut. inter lenientia non connumcran-
dus, ſed inter ſoluentia ; lib. 3. 49
Syrupi ſoluentes in curâ morbi gallici commendan-
di ; lib. 7. 197

T

- T**enuiſſimo victu in ſtatu acutorum vtendum
ſemper i. aphor. 8. veriſſimum ſi de ſtatu eſſen-
tia, & ſymptomatum loquamur ; lib. 2. 18
Tenuiſſimo victu vtendum in per acutis omnibus
exceptis peſilentibus ; lib. 2. 19
Tertiaria in febre ante coctionem quandoque pur-
gandum ;

- gaudum, & quando, lib. 5. 4
 Terciana in febre etiam intermissionis die victus
 à Gal & alijs institutus apud nostrates periculo-
 sus, lib. 5. 13
 Tertianis & ardentibus in febribus chysteres vix re-
 doperentes indendi, lib. 5. 3
 Theriaca in peste quando utendum, & quomodo, &
 quando abstinendum, lib. 5. 53
 Tinnitu aurium ex morbo gallico valentia remedia
 non applicanda, lib. 5. 106
 Tinnitui aurium ex morbo gallico remedium præ-
 stantissimum, lib. 5. 106
 Trullationes uteri in præfocatis ex semine regien-
 di, lib. 7. 57
 Turgens materia quomodo raro, & in peste sæpe tur-
 gere, lib. 5. 47
 Tussi laborantibus quando, & quatenus vigilandum,
 lib. 6. 165
- V
- Vena in ferienda, quæ cautiones ratione illius
 sunt habende, lib. 4. 22
 Vena sectio in melancholicis sit ampla, lib. 6. 86
 Vena sectio in brachio mensibus suppressis quando
 administranda, lib. 7. 131
 Vena secta in talo in sanguinis sputo affatim sangui-
 nem esse detrahendum, lib. 6. 149
 Ventriculi in dolore à frigida, & crassa materia pur-
 gans aliquod medicamentum hiera aliquando ad-
 dendum, lib. 7. 5
 Ventriculi in imbecillitate in puellis, aut catellis
 ventriculi regioni applicandis cauendum ne som-
 nus interrumpatur, lib. 7. 6
 Ventriculo dolente ob inflammationem purgantia su-
 gienda, lib. 7. 1

I N D E X.

<i>Ventriculo dolente ob inflammationem frigida potus, & extra appositio quando conueniat,</i>	lib. 7.	4
<i>Ventriculo inflammato præfente bile quibus vacuandum,</i>	lib. 7.	1
<i>Vermes enecantibus dum vitimur quid præstandum,</i>	lib. 7.	106
<i>Vermes enecantibus dulcia miscenda,</i>	lib. 7.	107
<i>Vermes enecantibus emplastris clysteres dulces præponendi,</i>	lib. 7.	108
<i>Vermes enecantibus sumptis per os quid faciendum</i>	lib. 7.	110
<i>Vermibus pro enecandis emplastra ubi applicanda,</i>	lib. 7.	109
<i>Vertiginosis sternutatoria, & caput purgia fugienda</i>	lib. 6.	47
<i>Vesicantia etiam super caput applicata in vehemētissimis doloribus optima,</i>	lib. 8.	118
<i>Vesicantia in febre pestilentiali sine peste in usum duci non debent,</i>	lib. 5.	43
<i>Vesicantia in febre pestilentiali in lethargo optima,</i>	lib. 5.	44
<i>Vesicantia hydropicorum cruribus applicata noxia,</i>	lib. 7.	55
<i>Vesicantia in lethargo optima, & quibus partibus applicanda,</i>	lib. 6.	35
<i>Vesicantia in peste aliquandò in usum duci possunt, & quando,</i>	lib. 5.	42
<i>Vesicantia in pestiferis cum extra corpus alget, utilia,</i>	lib. 5.	43
<i>Vesicantia in pestilentibus pessimè passim usurpata,</i>	lib. 3.	49
<i>Vesicantia in principio febrium pestilentialium non conueniunt,</i>	lib. 5.	44
<i>Vitæ crassus in acutis reijciendus,</i>	lib. 2.	39

Vitæ

I N D E X.

<i>Viſtus forma in acutis mutanda reſpectu regionis ,</i>	
lib. 2.	12
<i>Viſtus forma in acutis paſſim corrupta, lib. 2.</i>	12
<i>Viſtus humidus febricitantibus conſert , humidus</i>	
<i>actu , & potentia , lib. 2.</i>	28
<i>Viſtus immutandus ratione temperamentorum , &</i>	
<i>quomodo , lib. 2.</i>	3
<i>Viſtus immutandus ratione habitus corporis ,</i>	
lib. 2.	4
<i>Viſtus immutandus ratione temperamentis ventri-</i>	
<i>culi , lib. 2.</i>	5
<i>Viſtus mutandus in acutis ob ante actam vitam ,</i>	
lib. 2.	14
<i>Viſtus ratio pro varietate conſuetudinis , & regio-</i>	
<i>nis mutanda , lib. 2.</i>	8
<i>Viſtus tenuis pro acutis antiquis quatuorplex , & quid</i>	
<i>nobis recipiuntur , lib. 2.</i>	38
<i>Viſtus tenuis in acutis cur , lib. 2.</i>	1
<i>Vinculum laxandum ſecta vena in melancholicis ,</i>	
lib. 7.	87
<i>Vinum in acutis per ſe nunquam concedendum ,</i>	
lib. 2.	58
<i>Vinum in acutis quando concedendum , lib. 2.</i>	58
<i>Vinum Inſubrium ineptum pro potu acutè febricitan-</i>	
<i>tium , lib. 2.</i>	59
<i>Vini medicati formula præſtantiffima pro aliqua ſpe-</i>	
<i>cie morbi gallici , lib. 7.</i>	203
<i>Vinum nunquam ne quidem cum ſignis coctionis in</i>	
<i>febris acutis concedendum apud Inſubres ,</i>	
lib. 2.	59
<i>Vinum optima materia pro parandis aliquando</i>	
<i>decoctis pro morbo gallico , lib. 7.</i>	203
<i>Vino tertiana laborantes apud noſtrates per totum</i>	
<i>morbum interdicens , lib. 5.</i>	37.
<i>Virtute</i>	

I N D E X.

<i>Virtute per se debili victus augendus, & in forma,</i> <i>si vi morbi solum quantitate, lib. 2.</i>	1
<i>Virtute debili ob aggrauationem parum, & raro, ob</i> <i>resolutionem parum, & sæpe, lib. 2.</i>	2
<i>Vitis institutum mutat formam victus in acutis,</i> <i>lib. 2.</i>	13
<i>Vomendum à cibo crassis in ventriculo existentibus</i> <i>humoribus, lib. 7.</i>	16
<i>Vomendum quando ieiuno ventriculo, & quando re-</i> <i>pleto; lib. 7.</i>	15
<i>Vomitório ab assumpto quandiu à vomitu abstinend-</i> <i>dum, lib. 7.</i>	18
<i>Vomitus frequentior fugiendus, sed semel, aut bis</i> <i>in mense, lib. 7.</i>	9
<i>Vomitus in mense determinati non habeant diem</i> <i>statutum, lib. 7.</i>	13
<i>Vomitus potius repetendus, quam diu in eo insisten-</i> <i>dum, lib. 7.</i>	11
<i>Vomitus quibus noxas afferat incmendabiles,</i> <i>lib. 3.</i>	12
<i>Vomitus repetiti quales esse debeant, lib. 7.</i>	12
<i>Vomitus quomodo frequentius hyeme promouendi,</i> <i>& quomodo rariùs, & in quibus casibus,</i> <i>lib. 3.</i>	10
<i>Vomitus tabidis inimicus, lib. 3.</i>	11
<i>Vomitui qui abstinendi, lib. 7.</i>	14
<i>Vomituri non debent nimium cibo repleri,</i> <i>lib. 7.</i>	17
<i>Vomitória in cholera sint ex leuioribus, lib. 7.</i>	21
<i>Vomitória in cholera varianda pro varietate ma-</i> <i>terix, lib. 7.</i>	22
<i>Vomitória in cholera non sint multæ quantitatis,</i> <i>lib. 7.</i>	24
<i>Vomitui in colicis quando utendum, lib. 7.</i>	76

Vm-

I N D E X.

Vmbilicus aliquandò muniendus in applicatione cucurbitulae, lib.7. 78

Vnguenti ex hydrargiro prestare multam quantitatem parare, & cautio ante illius usum, lib.7. 225

Vteri regio fouenda attenuantibus ante sanguinis missionem ex talo, lib.7. 138

LAUS DEO, DEIPARÆQ. VIRGINI.

Imprimatur.

Iacobus Terragn. Vic. Gen.

P.M. Ant. Palumb. Dep. vid.

